

No. :

Test Booklet Code

வினாத்தான் தொகுப்பு குறியீடு

# HAKAN

This Booklet contains 24+44 pages.

இவ்வினாத்தான் தொகுப்பு 24+44 பக்கங்களை கொண்டது.

**E4**

**Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.**

இந்த வினாத் தொகுப்பை திறக்கும்படி கண்காணிப்பாளர் கூறும் வரையில் திறக்கக் கூடாது.

**Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.**

வினாத் தொகுப்பிற்கு பின் பக்கமுள்ள அறிவுரைகளை கவனமாக படிக்கவும்.

## **Important Instructions :**

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on **side-1** and **side-2** carefully with **blue/black ball point pen** only.
2. The test is of **3 hours** duration and Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
4. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
6. The CODE for this Booklet is **E4**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.

## **முக்கிய அறிவுரைகள் :**

1. இந்த வினாத் தொகுப்பிற்குள் விடைத்தாள் உள்ளது. வினாத் தொகுப்பை திறக்க அறிவுறுத்தப்படும் பொழுது விடைத்தாளை எடுத்து பக்கம் 1 மற்றும் பக்கம் 2 இல் கேட்கப்பட்டுள்ள விபரங்களை கவனமாக **நீலம்/கருப்பு** பந்துமுனைப் பேனா மட்டுமே பயன்படுத்தி நிரப்பவும்.
2. இந்த தேர்வு **3 மணி** நேரமாகும் மற்றும் வினாத்தாள் தொகுப்பு **180** வினாக்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு வினாவுக்கு **4** மதிப்பெண்கள். ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கு தேர்வு எழுதுபவருக்கு **4** மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும். மொத்த மதிப்பெண்களிலிருந்து ஒவ்வொரு தவறான விடைக்கும் **ஒரு மதிப்பெண் கழிக்கப்படும்**. அதிகப்தச மதிப்பெண்கள் **720** ஆகும்.
3. இந்த பக்கத்தில் எழுதுவதற்கும்/விடைகளைக் குறிப்பதற்கும் **நீலம்/கருப்பு** பந்துமுனைப் பேனா மட்டும் உபயோகிக்க வேண்டும்.
4. வினாத்தாள் தொகுப்பில் கொடுக்கப்பட்ட இடத்தில் மட்டும் சரி பார்த்தலுக்கு (Rough work) பயன்படுத்த வேண்டும்.
5. தேர்வு முடிந்தவுடன், தேர்வு எழுதுபவர் விடைத்தாளை அறை/ஹாலிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு முன், அறை தேர்வுக் கண்காணிப்பாளரிடம் கொடுக்க வேண்டும். தேர்வு எழுதுபவர்கள் வினாத்தாள் தொகுப்பை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்க படுகிறார்கள்.
6. இந்த வினாத்தாள் தொகுப்பின் குறியீடு **E4**, விடைத்தாளின் பக்கம் 2-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடும் இந்த வினாத்தாள் தொகுப்பின் குறியீடும் ஒன்று தான் என்று உறுதி செய்யவும். ஏதாவது முரண்பாடு இருந்தால், தேர்வு எழுதுபவர் உடனடியாக அறை கண்காணிப்பாளரிடம் தெரிவித்து, மாற்று வினாத்தாள் தொகுப்பையும் மற்றும் விடைத்தாளையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
7. தேர்வு எழுதுபவர்கள் விடைத்தாள் மடங்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். விடைத்தாளில் எந்த விதமான தேவையற்ற குறிப்புகளும் செய்யக்கூடாது. வினாத்தாள் தொகுப்பு/விடைத்தாளில் கொடுக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட இடத்தை தவிர எந்த இடத்திலும் தேர்வு எழுதுபவர் அவரது பதிவு எண்ணை எழுத கூடாது.
8. விடைத்தாளில் வெள்ளை தீரவத்தில் அழித்து திருத்தங்கள் செய்ய அனுமதியில்லை.

**In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.**

வினா மொழி பெயர்ப்பில் ஏதாவது சர்ச்சை இருந்தால், ஆங்கில பிரதியே முடிவானது.

Name of the Candidate (in Capitals) : \_\_\_\_\_

தேர்வு எழுதுபவரின் பெயர் : \_\_\_\_\_

Roll Number : in figures \_\_\_\_\_

பதிவு எண் : எண்ணில் \_\_\_\_\_

: in words \_\_\_\_\_

: எழுத்தில் \_\_\_\_\_

Centre of Examination (in Capitals) : \_\_\_\_\_

தேர்வு மையம் : \_\_\_\_\_

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_

Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

தேர்வு எழுதுபவரின் கையொப்பம்:

கண்காணிப்பாளரின் கையொப்பம்:

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : \_\_\_\_\_

**1. சரியற்ற கூற்றை கண்டறியவும்.**






- (1) நீரில்  $\text{Fe}^{2+}$  ( $d^6$ ) -யை காட்டிலும்  $\text{Cr}^{2+}$  ( $d^4$ ) ஒரு வலிமை மிகு ஒடுக்கும் காரணியாகும்.
- (2) இடைநிலை உலோகங்களும் மற்றும் அதன் சேர்மங்களும் பல்வேறு ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றிருக்கும் திறன் வாய்ந்ததாலும் மற்றும் அணைவுகளை உருவாக்குவதாலும் அவை சிறந்த வினையூக்கி பண்பைப் பெற்றுள்ளன.
- (3) உலோகங்களின் படிக கூட்டில் சிறு அனுக்களான H, C அல்லது N உள்ளிணுக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டு வதே இடையூட்டுச் சேர்மங்களாகும்.
- (4)  $\text{CrO}_4^{2-}$  மற்றும்  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ -இல் குரோமியத் தின் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகள் ஒத்ததாக இருக்காது.

**2. சுக்ரோசின் நீராற்பகுத்தல், கீழ்கண்ட வினையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.**

சுக்ரோஸ் +  $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons$  குளுகோஸ் + ப்ரக்டோஸ்  
 300 K-இல் சமநிலை மாறிலியானது ( $K_c$ )  $2 \times 10^{13}$  எனில், அதே வெப்பநிலையில்  $\Delta_r G^\ominus$  மதிப்பானது :

- (1)  $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (2)  $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (3)  $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- (4)  $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(4 \times 10^{13})$

**3. கீழ்கண்ட வினைத் தொடரில் உருவாகும் சேர்மம் X-யை கண்டறியவும்.**



**4. சரியாக பொருந்தாதவற்றை கண்டறியவும்.**

**பெயர்   IUPAC அதிகார-  
பூர்வமான பெயர்**

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| (a) Unnilunium  | (i) மெண்டலீவியல்       |
| (b) Unniltrium  | (ii) லாரான்சியம்       |
| (c) Unnilhexium | (iii) ஸீபோர்ஜியம்      |
| (d) Unununniun  | (iv) டார்ம்ஸ்டாட்டியம் |
- 
- (1) (a), (i)
  - (2) (b), (ii)
  - (3) (c), (iii)
  - (4) (d), (iv)

5. கீழ்கண்டவற்றில் கார்பன்மோனாக்சைடு குறித்து எது சரியற்றது ?
- அது கார்பாக்ஸி ஹீமோகுளோபினை உருவாக்கும்
  - அது இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் கடத்தும் திறனை குறைக்கின்றது.
  - கார்பாக்ஸி ஹீமோகுளோபின் (ஹீமோ-குளோபின் CO உடன் இணைந்த அமைப்பு) ஆக்ஸி ஹீமோகுளோபினைக் காட்டிலும் குறைந்த நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது
  - முழுமையடையாத எரிதலினால் உற்பத்தியாகின்றது
6. உர்ட்ஸ் வினையில் கீழ்கண்ட எந்த ஆல்கோன்-ஐ பெருமளவில் தயாரிக்க இயலாது ?
- n-ஹெக்சேன்
  - 2,3-டைமெத்தில் ப்ரூட்டேன்
  - n-ஹெப்டேன்
  - n-ப்ரூட்டேன்
7. தாள் / காகித வண்ணப்பிரிகை எதற்கான எடுத்துக்காட்டு ?
- பரப்புக் கவர்ச்சி வண்ணப்பிரிகை
  - பங்கீடு வண்ணப்பிரிகை
  - மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை
  - பத்தி வண்ணப்பிரிகை
8. கீழ்கண்டவற்றுள் சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- 4% கார்பன் உடைய மெல்லிரும்பு தூய்மையற்றது.
  - $\text{CO}_2$  வெளிவருவதால் கொப்பளக் காப்பரானது கொப்பளத்தேற்றத்தை கொண்டுள்ளது.
  - வான் - ஆர்க்கல் முறையில் நிக்கல் ஆவி அழுத்த தூய்மையாக்கல் செய்யப்படுகிறது.
  - தேனிரும்பு பல்வேறு அமைப்புகளாக வார்ப்பு செய்யப்படுகிறது.
9. அணைவுச் சேர்மங்கள் உருவாவதில் ஈனிகளின் புல வலிமையின் சரியான ஏறு வரிசை கீழ்கண்டவற்றில் எது ?
- $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
  - $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
  - $\text{F}^- < \text{SCN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
  - $\text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{SCN}^- < \text{F}^-$

10. ஷுரியா நீருடன் வினைபுரிந்து A -வை தருகின்றது, அது சிதைவடைந்து B -யை தரும். B -யை ஆழ்ந்த நீலம் நிறமடைய  $\text{Cu}^{2+}$  (aq) கரைசலினுள் செலுத்தும் போது C -யை தருகின்றது. கீழ்கண்டவற்றுள் C -யின் வாய்பாடு என்ன ?
- $\text{CuSO}_4$
  - $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
  - $\text{Cu}(\text{OH})_2$
  - $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$
11.  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{MgCl}_2$  மற்றும்  $\text{NaCl}$  கரைசலினுள்  $\text{HCl}$  செலுத்தப்படுகின்றது. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்தசேர்மம்/களில் ஒன்று படிகமாகும் ?
- $\text{MgCl}_2$  மற்றும்  $\text{CaCl}_2$  இரண்டுமே
  - $\text{NaCl}$  மட்டும்
  - $\text{MgCl}_2$  மட்டும்
  - $\text{NaCl}$ ,  $\text{MgCl}_2$  மற்றும்  $\text{CaCl}_2$
12.  $\text{Cr}^{2+}$  அயனியின் கணக்கிடப்பட்ட சுழற்சி காந்ததிருப்புத்திறனானது :
- 3.87 BM
  - 4.90 BM
  - 5.92 BM
  - 2.84 BM
13. கீழ்கண்டவற்றை பொருத்தி சரியான விடையை கண்டறியவும்.
- |   |   |
|---|---|
| (a) $\text{CO(g)} + \text{H}_2(\text{g})$ | (i) $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ |
| (b) தற்காலிக கடின நீர்                    | (ii) ஒரு எலக்ட்ரான் குறை வைட்டரை                            |
| (c) $\text{B}_2\text{H}_6$                | (iii) தொகுப்பு வாயு   |
| (d) $\text{H}_2\text{O}_2$                | (iv) தளமற்ற அமைப்பு   |
- | (a)       | (b)   | (c)  | (d)  |
|-----------|-------|------|------|
| (1) (iii) | (i)   | (ii) | (iv) |
| (2) (iii) | (ii)  | (i)  | (iv) |
| (3) (iii) | (iv)  | (ii) | (i)  |
| (4) (i)   | (iii) | (ii) | (iv) |
14.  $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2(\text{g})$  வினையில், சரியான விடையானது :
- $\Delta_r\text{H} > 0$  மற்றும்  $\Delta_r\text{S} > 0$
  - $\Delta_r\text{H} > 0$  மற்றும்  $\Delta_r\text{S} < 0$
  - $\Delta_r\text{H} < 0$  மற்றும்  $\Delta_r\text{S} > 0$
  - $\Delta_r\text{H} < 0$  மற்றும்  $\Delta_r\text{S} < 0$


15. ஒரு சிலின்டரில்  $N_2$  மற்றும் Ar வாயுக்கள் கொண்ட ஒரு கலவை உள்ளது. அதில் 7 g  $N_2$  மற்றும் 8 g Ar உள்ளது. சிலின்டரில் உள்ள வாயு கலைவயின் மொத்த அழுத்தம் 27 bar எனில்,  $N_2$ -வின் பகுதி அழுத்தம் :  
[ $N = 14$ ,  $Ar = 40$  ( $g\ mol^{-1}$  -ல்) : அணுநிறைகளை பயன்படுத்துக]  
 (1) 9 bar  
 (2) 12 bar  
 (3) 15 bar  
 (4) 18 bar
16. பிளாட்டினம் (Pt) மின் முனையை பயன்படுத்தி நீர்த்த சல்டூரிக் அமிலத்தை மின்னாற்ற பகுக்கும் போது, நேர்மின்முனையில் கிடைக்கும் விளைபொருள் :  
 (1) வைட்ரஜன் வாயு  
 (2) ஆக்ஸிஜன் வாயு  
 (3)  $H_2S$  வாயு  
 (4)  $SO_2$  வாயு
17. ஒரு முவினைய பியூடைல் கார்பன் நேர் அயனி, ஒரு ஈரினைய பியூடைல் கார்பன் நேர் அயனியைவிட அதிக நிலைப்புத்தன்மையை கொண்டிருப்பதற்கு கீழ்கண்டவற்றுள் எது, காரணமாகிறது ?  
 (1)  $-CH_3$  தொகுதிகளின்  $-I$  விளைவு  
 (2)  $-CH_3$  தொகுதிகளின்  $+R$  விளைவு  
 (3)  $-CH_3$  தொகுதிகளின்  $-R$  விளைவு  
 (4) பினைப்பில்லா உடனிசைவு/குறை பினைப்பு
18. கீழ்கண்ட எந்த உலோக அயனி பல நொதிகளை தூண்டி குளுகோசின் ஆக்ஸிஜனேன்ற நிலை பங்கேற்று, ATP -யை உற்பத்தி செய்து மற்றும்  $Na^-$  வுடன் நரம்பு சைகை பரிமாற்றத்திற்கு காரணமாக அமைகிறது ?  
 (1) இரும்பு  
 (2) காப்பர்  
 (3) கால்சியம்  
 (4) பொட்டாசியம்
19. உருகிய  $CaCl_2$  -வில் இருந்து 20 g கால்சியம் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவைப்படும் பாரடேக்களின் (F) எண்ணிக்கை :  
(Ca -ன் அணு நிறை =  $40\ g\ mol^{-1}$ )  
 (1) 1  
 (2) 2  
 (3) 3  
 (4) 4

20. சுக்ரோஸை நீரால் பகுத்தால் கிடைப்பது :  
 (1)  $\beta$ -D-குளுகோஸ் +  $\alpha$ -D-ப்ரக்டோஸ்  
 (2)  $\alpha$ -D-குளுகோஸ் +  $\beta$ -D-குளுகோஸ்  
 (3)  $\alpha$ -D-குளுகோஸ் +  $\beta$ -D-ப்ரக்டோஸ்  
 (4)  $\alpha$ -D-ப்ரக்டோஸ் +  $\beta$ -D-ப்ரக்டோஸ்
21. ஒரு முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலி  $4.606 \times 10^{-3}\ s^{-1}$  ஆகும். 2.0 g வினைபடு பொருள் 0.2 g ஆக குறைவதற்கு தேவைப் படும் நேரம் :  
 (1) 100 s  
 (2) 200 s  
 (3) 500 s  
 (4) 1000 s
22. அனிசோலை, HI உடன் பிளத்தல் வினைக்கு உட்படுத்தும் போது கிடைப்பது :
- (1)
- 
- (2)
- 
- (3)
- 
- (4)
- 
23. நீர்த்த தீக்காலி மூன்னிலையில் பென்சால்டிலைடு மற்றும் அசிட்டோபீனோன் இடையிலான வினை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது ?  
 (1) ஆல்டால் குறுக்கம்  
 (2) கானிசரோ வினை  
 (3) குறுக்க கானிசரோ வினை  
 (4) குறுக்க ஆல்டால் குறுக்கம்

24. கீழ்கண்டவற்றில் எந்த ஒன்று கார அமினோ அமிலம் ஆகும் ?
- சிரென்
  - அலனென்
  - டைரோசின்
  - ஸெலசின்
25. 2-புரோமோ பென்டேன் நீக்கவினையில் ஈடுபட்டு பென்ட-2-ன் உருவாகும் போது நிகழும் வினை எது ?
- பி-நீக்க வினை
  - செயிட்செவ் விதியை பின்பற்றுகிறது
  - ஹெட்ரஜன் ஹாலஜன் நீக்கவினை
  - நீர் நீக்க வினை
- (a), (b), (c)
  - (a), (c), (d)
  - (b), (c), (d)
  - (a), (b), (d)
26. ஒரு வினையின் வினைபடு பொருள்களின் செறிவு அதிகரிப்பதனால் கீழ்கண்ட எது மாறுபடும் ?
- கிளர்வுகொள் ஆற்றல்
  - வினை வெப்பம்
  - பயன் தொடக்க ஆற்றல்/குறைந்த பட்ச இயக்க ஆற்றல்
  - மோதல் அதிர்வெண்
27.  $^{175}_{71}\text{Lu}$  உள்ள புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை முறையே :
- 71, 104 மற்றும் 71
  - 104, 71 மற்றும் 71
  - 71, 71 மற்றும் 104
  - 175, 104 மற்றும் 71
28. கீழ்கண்ட வினையில் கார்பனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன ?
- $$\text{CH}_4(\text{g}) + 4\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CCl}_4(\text{l}) + 4\text{HCl}(\text{g})$$
- + 4 இல் இருந்து + 4
  - 0 இல் இருந்து + 4
  - 4 இல் இருந்து + 4
  - 0 இல் இருந்து - 4

29. கீழ்கண்டவற்றை பொருத்துக.
- | ஆக்ஷைடு                            | தன்மை            |
|------------------------------------|------------------|
| (a) CO                             | (i) கார          |
| (b) BaO                            | (ii) நடுநிலை     |
| (c) Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | (iii) அமில       |
| (d) Cl <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | (iv) ஈரியல்புள்ள |
- கீழ்கண்டவற்றுள் சரியான விடை எது ?
- | (a)       | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----------|-------|-------|-------|
| (1) (i)   | (ii)  | (iii) | (iv)  |
| (2) (ii)  | (i)   | (iv)  | (iii) |
| (3) (iii) | (iv)  | (i)   | (ii)  |
| (4) (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)   |
30. கீழ்கண்ட அமீனில் எவை கார்பலமைன் சோதனையை தருகின்றது ?
- (1)
- 
- (2)
- 
- (3)
- 
- (4)
- 
31. வெப்பம் மாறா நிபந்தனையின் கீழ், ஒரு நல்லியல்பு வாயு வெற்றிட விரிவாக்கம் அடைவதற்குரிய சரியான தெரிவானது :
- $q = 0, \Delta T = 0$  மற்றும்  $w = 0$
  - $q = 0, \Delta T < 0$  மற்றும்  $w > 0$
  - $q < 0, \Delta T = 0$  மற்றும்  $w = 0$
  - $q > 0, \Delta T > 0$  மற்றும்  $w > 0$
32. எந்த ஒரு மூலக்கூறு உருவாகாது என்பதனை கண்டறியவும்.
- He<sub>2</sub>
  - Li<sub>2</sub>
  - C<sub>2</sub>
  - O<sub>2</sub>

33. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று இயற்கை பலபடி?
- சில்-1,4- பாலிஜோசோபீன்
  - பாலி (ப்யூட்டாடையீன்-ஸ்டெரீன்)
  - பாலி ப்யூட்டாடையீன்
  - பாலி (ப்யூட்டாடையீன்-அக்ரேலோ-நைட்ரேல்)
34. ஒரு ஆல்க்கீன் ஓச்சோனேற்றத்தின் போது மெத்தனல் -ஐ ஒரு விளை பொருளாகத் தருகின்றது. அதன் அமைப்பானது :



35. கீழ்கண்ட மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பில் எது பூஜ்ய இருமுனை திருப்புத்திறனை கொண்டுள்ளது?
- அம்மோனியா, பெரிலியம்டைபுனூரைடு, நீர், 1,4-டை குளோரோ பென்சீன்
  - போரான் ட்ரை புனூரைடு, ஹெட்ரஜீன் புனூரைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, 1,3-டை குளோரோ பென்சீன்
  - நைட்ரஜீன் ட்ரை புனூரைடு, பெரிலியம் டை புனூரைடு, நீர், 1,3-டை குளோரோ பென்சீன்
  - போரான் ட்ரை புனூரைடு, பெரிலியம் டை புனூரைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, 1,4-டை குளோரோ பென்சீன்

36. பென்சீனின் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலியின் ( $K_f$ ) மதிப்பு  $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$ . மின்பகுளி அல்லாத கரைபொருளை கொண்ட 0.078 m மோலாலிட்டி பென்சீன் கரைசலின் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலி :
- (இரண்டு தசம புள்ளி வரை முழுமையாக்கவும்)
- 0.20 K
  - 0.80 K
  - 0.40 K
  - 0.60 K
37. ரெளவட் விதியிலிருந்து நேர்விலக்கம் காண்டிக் கும் கலவையானது :
- எத்தனால் + அசிட்டோன்
  - பென்சீன் + டொலுவீன்
  - அசிட்டோன் + குளோரோபார்ம்
  - குளோரோ ஈத்தேன் + புரோமோ ஈத்தேன்
38. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று அதிகப்பட்ச எண்ணிக்கையிலான அணுக்களை கொண்டுள்ளது ?
- 1 g Ag(s) [Ag -யின் அணுநிறை = 108]
  - 1 g Mg(s) [Mg -யின் அணுநிறை = 24]
  - 1 g O<sub>2</sub>(g) [O -யின் அணுநிறை = 16]
  - 1 g Li(s) [Li -யின் அணுநிறை = 7]
39. கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து சரியான கூற்றுகளை கண்டறியவும்.
- ஐஸ்கிரீம் மற்றும் உறைந்த உணவிற்கு CO<sub>2</sub>(g) குளிருட்டியாக பயன்படுகிறது.
  - C<sub>60</sub> அமைப்பானது பன்னிரெண்டு ஆறு கார்பன் கொண்ட வளையத்தையும் மற்றும் இருபது ஐந்து கார்பன் கொண்ட வளையத்தையும் கொண்டது.
  - ZSM-5, ஜீயோலைட்டின் ஒரு வகை, ஆல்கஹால்களை பெட்ரோலாக மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது.
  - CO நிறமற்ற மற்றும் மணமற்ற வாயுவாகும்.
- (a), (b) மற்றும் (c) மட்டும்
  - (a) மற்றும் (c) மட்டும்
  - (b) மற்றும் (c) மட்டும்
  - (c) மற்றும் (d) மட்டும்

40. கூழ்ம கரைசலின் எந்த பண்பினை நிர்ணயிப்பதற்கு ஜீட்டாதிறன் அளவீடு பயன்படுகின்றது ?
- பாகுத்தன்மை
  - கரைதிறன்
  - கூழ்மத்துகள்களின் நிலைப்புத்தன்மை
  - கூழ்மத்துகள்களின் உருவ அளவு
41. பொருள் மைய கனச்சதூர (bcc) அமைப்புடைய ஒரு தனிமத்தின் கூடுவிளிம்பின் மதிப்பு 288 pm எனில், அதன் அணு ஆரமானது :
- $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
  - $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
  - $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
  - $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
42. கீழ்கண்டவற்றுள் நேர் அயனி அழுக்குநீக்கி எது ?
- சோடியம் லாரைல் சல்போட்
  - சோடியம் ஸ்டேரேட்
  - சீடைல்ட்ரைமெத்தில் அம்மோனியம் புரோமைடு
  - சோடியம் டோடெக்கைல் பென்சீன் சல்போனேட்
43. அசிட்டோன் மற்றும் மெத்தில் மெக்னீசியம் ஆகியவை வினைபுரிந்து பின் அதன் தொடர்ச்சியாக நீராற்படுத்தால் கிடைக்கும் வினைபொருள் :
- ஐசோபுரப்பைல் ஆல்கஹால்
  - ஈரினைய் பியூட்டைல் ஆல்கஹால்
  - முவினைய பியூட்டைல் ஆல்கஹால்
  - ஐசோபியூட்டைல் ஆல்கஹால்
44. 0.1 M NaOH இல்  $\text{Ni(OH)}_2$  -வின் கரைதிறனை கண்டறியவும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள  $\text{Ni(OH)}_2$  -வின் அயனிப் பெருக்கமானது  $2 \times 10^{-15}$ .
- $2 \times 10^{-13} \text{ M}$
  - $2 \times 10^{-8} \text{ M}$
  - $1 \times 10^{-13} \text{ M}$
  - $1 \times 10^8 \text{ M}$

45. கீழ்கண்ட சல்பரின் அமில ஆக்சைடுகளில் எவை –O–O– பினைப்பை கொண்டுள்ளது ?
- $\text{H}_2\text{SO}_3$ , சல்பூரஸ் அமிலம்
  - $\text{H}_2\text{SO}_4$ , சல்பூரிக் அமிலம்
  - $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ , பெர்ஆக்சோடை சல்பூரிக் அமிலம்
  - $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ , பைரோ சல்பூரிக் அமிலம்
46. உடற்குழியற்ற மற்றும் இருபக்க சமச்சீர் கொண்ட விலங்குகளின் தொகுதி எது ?
- மேனோஃபோரா
  - தட்டை புழுக்கள்
  - அஸ்கெலமிந்தஸ்
  - அன்னலிடா
47. கீழ்கண்டவற்றுள் விதை உறக்கத்தை தடை செய்யும் பொருள் எதுவல்ல ?
- ஐப்ரல்லிக் அமிலம்
  - அப்சிசிக் அமிலம்
  - பினாலிக் அமிலம்
  - பாரா – அஸ்கார்பிக் அமிலம்
48. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.
- | தொகுதி - I         | தொகுதி - II      |       |      |
|--------------------|------------------|-------|------|
| (a) பிளாசன்டா      | (i) ஆன்டிரஜன்    |       |      |
| (b) சோனா           | (ii) மனித        |       |      |
|                    | பெல்லுசிடா       |       |      |
|                    | கோரியானிக்       |       |      |
|                    | கொனடோ-           |       |      |
|                    | புரோபின்         |       |      |
| (c) பல்போ          | (iii) அண்டத்தின் |       |      |
|                    | யுரேத்திரல்      |       |      |
|                    | சுரப்பிகள்       |       |      |
| (d) லெடிக் செல்கள் | (iv) பீனிஸை      |       |      |
|                    | வழவழப்-          |       |      |
|                    | பாக்குதல்        |       |      |
| (a)                | (b)              | (c)   | (d)  |
| (1)                | (iv)             | (iii) | (i)  |
| (2)                | (i)              | (iv)  | (ii) |
| (3)                | (iii)            | (ii)  | (iv) |
| (4)                | (ii)             | (iii) | (i)  |
49. எந்த தொழில் நுட்பத்தில் கருவற இயலாத் பெண்களுக்கு மகப்பேறுக்காக கரு மாற்றம் செய்யப்படுகிறது ?
- ZIFT மற்றும் IUT
  - GIFT மற்றும் ZIFT
  - ICSI மற்றும் ZIFT
  - GIFT மற்றும் ICSI

50. S.L. மில்லர் தன் சோதனைகளில் முடிய குடுவையில் இருந்து எவற்றைக் கலப்பதின் மூலம் அமினோஅமிலங்களைத் தோற்று-வித்தார்?

- (1)  $800^{\circ}\text{C}$ -ல்  $\text{CH}_4, \text{H}_2, \text{NH}_3$  மற்றும் நீராவி
- (2)  $800^{\circ}\text{C}$ -ல்  $\text{CH}_3, \text{H}_2, \text{NH}_4$  மற்றும் நீராவி
- (3)  $600^{\circ}\text{C}$ -ல்  $\text{CH}_4, \text{H}_2, \text{NH}_3$  மற்றும் நீராவி
- (4)  $600^{\circ}\text{C}$ -ல்  $\text{CH}_3, \text{H}_2, \text{NH}_3$  மற்றும் நீராவி

51. கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) கார்டைஉறுப்பு
- (b) காக்ஸியா
- (c) ஷஸ்டெசியன்
- (d) ஸ்டேபிள்

**(a) (b) (c) (d)**

- (1) (ii) (iii) (i) (iv)
- (2) (iii) (i) (iv) (ii)
- (3) (iv) (ii) (i) (iii)
- (4) (i) (ii) (iv) (iii)

52. கொடுக்கப்பட்ட நோய்கள் மற்றும் நோய்க் காரணிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) டைஃபாய்டு
- (b) நிமோனியா
- (c) பைலாரியா
- (d) மலேரியா

**(a) (b) (c) (d)**

- (1) (i) (iii) (ii) (iv)
- (2) (iii) (iv) (i) (ii)
- (3) (ii) (i) (iii) (iv)
- (4) (iv) (i) (ii) (iii)

53. கடத்தியில் இணைக்கப்பட்ட DNA -வின் படி எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் தொடர்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன :

- (1) தெரிவுசெய்யக்கூடிய குறியீடு
- (2) Ori தளம்
- (3) பாலின்ட்ரோம் தொடர்
- (4) உணர்தல் தளம்

54. புருஸ் விளிம்பு நுண் வில்லைகளை கொண்ட கன சதுர வடிவ எபிதீவியம் எங்கு காணப்படும்?

- (1) குடலின் உட்படலம்
- (2) உமிழ் நீர் சுரப்பியின் நாளங்கள்
- (3) நெங்.ப்ரானின் அன்மை சுருள் நுண்குழல்கள்
- (4) ஷஸ்டேலியன் குழாய்

55. அரை கீழ்மட்ட சூலகப்பை இதில் உள்ளது :

- (1) கத்தரி
- (2) கடுகு
- (3) சூரியகாந்தி
- (4) பிளம்

56. ஒளி வினையின் போது எலெக்ட்ரான்கள் இவற்றிலிருநு கடத்தப்படுவதை பிளாஸ்டோ குயினோன் துணை புரிகிறது :

- (1) PS-II -விலிருந்து  $\text{Cytb}_{6f}$  கூட்டமைப்பு
- (2)  $\text{Cytb}_{6f}$  கூட்டமைப்பிலிருந்து PS-I
- (3) PS-I -விருந்து  $\text{NADP}^{+}$
- (4) PS-I -விருந்து ATP சிந்தேஸ்

57. சரியற்ற கூற்றை கண்டறிக.

- (1) வைரக் கட்டை நீரைக் கடத்துவதில்லை ஆனால் உறுதித் தன்மையை அளிக்கிறது.
- (2) சாற்றுக் கட்டை நீர் மற்றும் தனிமங்களை வேரிலிருந்து இலைக்கு கடத்துவதில் பங்கேற்கிறது.
- (3) சாற்றுக் கட்டையானது இரண்டாம் நிலை சைலத்தின் உட்பகுதி மற்றும் அது வெளிர் நிறத்தில் காணப்படும்.
- (4) வைரக் கட்டையானது டானின்கள், ரெசின்கள், எண்ணெய்கள் மற்றும் பல படிவதால் அடர்ந்த நிறத்தில் உள்ளது.

58. புல் சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உணவூட்ட நிலைகளுடன் சரியான சிற்றின உதாரணங்களைப் பொருத்தவும்.
- நான்காம் உணவூட்ட (i) காகம் நிலை
  - இரண்டாம் உணவூட்ட (ii) கழுகு நிலை
  - முதலாம் உணவூட்ட (iii) முயல் நிலை
  - மூன்றாம் உணவூட்ட (iv) புல் நிலை
- சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.**
- | (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii)  | (iii) | (iv)  |
| (2) | (iii) | (ii)  | (i)   |
| (3) | (iv)  | (iii) | (ii)  |
| (4) | (i)   | (ii)  | (iii) |
59. கரும்புப் பயிரின் மீது தெளிக்கும் போது தண்டின் நீளத்தை அதிகரித்து கரும்பின் விளைச்சலை அதிகரிக்கும் தாவர வளர்ச்சி ஊக்கியின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.
- சைட்டோகெனின்
  - ஜிப்ரல்லின்
  - எத்திலீன்
  - அப்சிசிக் அமிலம்
60. கரப்பான் பூச்சியின் தலையை நீக்கினால், அது சிறிது காலம் வாழும். எதனால்?
- கரப்பான் பூச்சியின் உணவு பாதை மேல் நரம்பனுத்திறள் வயிற்றின் கீழ் பகுதியில் அமைந்துள்ளது
  - கரப்பான் பூச்சியில் நரம்பு மண்டலம் காணப்படாது
  - தலையில் நரம்பு மண்டலத்தின் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமள்ளது. மீதமுள்ளவை உடலின் வயிற்றுப் பகுதியில் உள்ளது
  - தலையில் 1/3 நரம்பு மண்டலம் உள்ளது. மீதமுள்ளவை உடலின் முதுகு புறத்தில் உள்ளது
61. படியெடுத்தவில் டி.என்.ஏ. ஹெலிக்ஷை திறக்க உதவும் நொதி எது?
- டி.என்.ஏ. ஸெகேஸ்
  - டி.என்.ஏ. ஹெலிக்கேஸ்
  - டி.என்.ஏ. பாலிமரேஸ்
  - ஆர்.என்.ஏ. பாலிமரேஸ்

62. கதிர் சிறுமலர்களில் காணப்படுகிறது :
- கீழ்மட்ட குலகப்பை
  - மேல்மட்ட குலகப்பை
  - ஷஹப்போகெனஸ் குலகப்பை
  - அரைகீழ்மட்ட குலகப்பை
63. கீழ்கண்டவற்றுள் விராம்டுகள் குறித்த சரியானது எது?
- அவை புரத உறையுடன் RNA கொண்டுள்ளவை
  - அவை புரத உறையற்று தனித்த RNA கொண்டுள்ளவை
  - அவை புரத உறையுடன் DNA கொண்டுள்ளவை
  - அவை புரத உறையற்று தனித்த DNA கொண்டுள்ளவை
64. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் உள்ளடக்கப் பொருட்கள் குறித்த எது சரியானதல்ல?
- எந்த சவ்வாலும் சூழப்படவில்லை.
  - உணவுத் துகள்களின் உள் விழுங்குதலில் ஈடுபடுகின்றன.
  - சைட்டோபிளாசத்தில் தனித்து உள்ளவை.
  - அவை சைட்டோபிளாசத்தில் இருப்புப் பொருளாக உள்ளவை.
65. சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு.
- குருக்கோகார்டிகாய்டுகள் குருக்கோ நியோ ஜெனிசிஸ்ஸை தூண்டுகிறது.
  - குருக்ககான ஷஹப்போ கிளைசீமியா வோடு தொடர்புடையது.
  - இன்சலின் கணைய செல்கள் மற்றும் அடிப்போசைட்டுகளுடன் செயல் படுகிறது.
  - இன்சலின் உயர் கிளைசீமியாவோடு தொடர்புடையது.
66. பேசில்லஸ் தூரின்ஜியன்சிஸ்ஸின் நக்க ஜீனை உட்செலுத்தி உருவாக்கப்பட்ட Bt பஞ்ச வகை எதற்கு எதிர்ப்பு?
- பூச்சி தீவ்குயிரிகள்
  - பூஞ்சை நோய்கள்
  - தாவர நெமட்டோடுகள்
  - பூச்சி கொன்று திண்ணிகள்

67. கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- |                                       |       |             |       |
|---------------------------------------|-------|-------------|-------|
| (a) ஈசினோ-                            | (i)   | தடைகாப்பு   |       |
| ஃபில்கள்                              |       | துலங்கல்    |       |
| (b) பேசோஃபில்கள்                      | (ii)  | செல்        |       |
|                                       |       | விழுங்குதல் |       |
| (c) நியூட்ரோ-                         | (iii) | ஹிஸ்டமினேஸ் |       |
| ஃபில்கள்                              |       | அழிக்கும்   |       |
|                                       |       | நொதிகளை     |       |
|                                       |       | விடுவித்தல் |       |
| (d) லிம்போ-                           | (iv)  | ஹிஸ்டமின்   |       |
| சைட்டுகள்                             |       | கொண்ட       |       |
|                                       |       | துகள்களை    |       |
|                                       |       | விடுவித்தல் |       |
| <b>(a)      (b)      (c)      (d)</b> |       |             |       |
| (1) (iii)                             | (iv)  | (ii)        | (i)   |
| (2) (iv)                              | (i)   | (ii)        | (iii) |
| (3) (i)                               | (ii)  | (iv)        | (iii) |
| (4) (ii)                              | (i)   | (iii)       | (iv)  |

**தொகுதி - II**

68. ஒரு தாவரப் பகுதியின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் கீழ்கண்ட உள்ளமைப்பு பண்புகள் காணப்படுகின்றன :

- கற்றை உறையால் சூழப்பட்ட அதிக எண்ணிக்கையிலான வாஸ்குலார் கற்றைகள் சிதறிக் காணப்படும்.
- பெரிய அளவிலான, தெறிவான பாரன் கைமாவாலான தளத் திசு.
- வாஸ்குலார் கற்றைகள் ஒருங்கமைந்தவை மற்றும் மூடியவை.
- புளோயம் பாரன்கைமா காணப்படவில்லை.

தாவரத்தின் வகையினையும் அதன் பகுதியையும் கண்டறிக.

- இருவித்திலைத்தாவரத் தண்டு
- இருவித்திலைத்தாவர வேர்
- இருவித்திலைத்தாவரத் தண்டு
- இருவித்திலைத்தாவர வேர்

69. பெண்குவின் மற்றும் டால்ஃபினின், ஃபினிப்பர்கள். இதற்கு எடுத்துக்காட்டு :

- தழுவிப்பரவல்
- குவி பரிணாமம்
- தொழிற்சாலை மெலானின் ஆக்கம்
- இயற்கைத் தேர்வு

70. EcoRI கண்டறியும் பாலின்டுரோமிக் வரிசை எது ?

- 5' - GAATTC - 3'
- 3' - CTTAAG - 5'
- 5' - GGAACC - 3'
- 3' - CCTTGG - 5'
- 5' - CTTAAG - 3'
- 3' - GAATTC - 5'
- 5' - GGATCC - 3'
- 3' - CCTAGG - 5'

71. ஒரு இயல்பு ECG - யில் QRS கூட்டமைப்பு எதனைக்குறிக்கின்றது ?

- ஆரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க மீட்சி
- ஆரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க நீக்கம்
- வெண்டிரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க நீக்கம்
- வெண்டிரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க மீட்சி

72. ராபர்ட் மே -இன் கருத்தின்படி புவியின் சிற்றினப் பன்மயம் சுமார் :

- 1.5 மில்லியன்
- 20 மில்லியன்
- 50 மில்லியன்
- 7 மில்லியன்

73. சில பகுப்புறும் செல்கள் செல் சுழற்சியில் இருந்து விடுபட்டு செயலற் ற வளர்வடக்க நிலைக்கு செல்கின்றன. இதற்கு அமைதி நிலை ( $G_0$ ) என அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்வு எதன் முழுவில் நடைபெறும் ?

- $M$  நிலை
- $G_1$  நிலை
- $S$  நிலை
- $G_2$  நிலை

74. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) கூட்டமாக வாழும், (i) ஆஸ்டெ-  
அனைத்துண்ணும் ர்யாஸ்  
தீங்குயிரி
- (b) நிறையுயிரி அரசமச்சீர் (ii) தேள்  
கொண்டவை  
இளவுயிரி  
இருபக்க சமச்சீர்  
கொண்டவை
- (c) புத்தக நூரை யீரல் (iii) மேனோ-  
பிளானா
- (d) உயிர் ஒளி (iv) லோகஸ்டா  
**(a)   (b)   (c)   (d)**  
(1) (i) (iii) (ii) (iv)  
(2) (iv) (i) (ii) (iii)  
(3) (iii) (ii) (i) (iv)  
(4) (ii) (i) (iii) (iv)

75. புற்களின் இலை நுனியில் நீர் தீரவ நிலையில் இரவிலும் அதிகாலையிலும் வடிவதற்கு காரணமான நிகழ்வு எது ?

- (1) நீராவிப்போக்கு
- (2) வேர் அழுத்தம்
- (3) உள்ளிர்த்தல்
- (4) பிளாஸ்மா சிதைவு

76. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) மிதக்கும் விலா (i) இரண்டு மற்றும்  
எலும்புகள் ஏழாவது விலா  
எலும்புகளி-  
டையில்  
அமைந்துள்ளது
  - (b) ஆக்ரோமியான் (ii) ஹியூமரஸின்  
தலை பகுதி
  - (c) ஸ்கேப்புலா (iii) கிளாவிக்கிள்
  - (d) கிளீனாய்டு குழி (iv) ஸ்பெர்னத்-  
தோடு  
இணைந்திராது
- 
- (a)   (b)   (c)   (d)**
- 
- (1) (ii) (iv) (i) (iii)
  - (2) (i) (iii) (ii) (iv)
  - (3) (iii) (ii) (iv) (i)
  - (4) (iv) (iii) (i) (ii)

77. பயறுவகைத் தாவரங்களின் வேர் முண்டுகளில் நெட்ரோஜினேஸ் மூலமாக வினையூக்கப்பட்ட வேதி வினையின் விளைப் பொருள்(கள்) :

- (1) அம்மோனியா மட்டும்
- (2) நெட்ரேட் மட்டும்
- (3) அம்மோனியா மற்றும் ஆக்ஸிஜன்
- (4) அம்மோனியா மற்றும் ஹெட்ரஜன்

78. அடி தண்டிலிருந்து தோன்றும் வேர்கள் :

- (1) சல்லி வேர்கள்
- (2) முதல் நிலை வேர்கள்
- (3) தூண் வேர்கள்
- (4) பக்கவாட்டு வேர்கள்

79. கீழ்கண்ட எது காற்றற்ற சிலட்ஜ் டெஜஸ்டாரில் சேர்க்கப்பட்டு தொடர்ந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிகழ்த்தப்படுகிறது ?

- (1) முதல் நிலை சிலட்ஜ்
- (2) மிதக்கும் டெபரிஸ்கள்
- (3) முதல் நிலை சுத்திகரிப்புக்குப்பின் உள்ள கழிவுநீர்
- (4) செயல்படுத்தப்பட்ட சிலட்ஜ்

80. கீழ்கண்டவற்றுள் தவறான கூற்று எது ?

- (1) மனிதனில் இன்கலின் ஒரு முன்-இன்க-லினாக உருவாக்கப்படுகிறது
- (2) முன் இன்கலினில் ஒரு கூடுதல் பெப்படைடு, C-பெப்படைடு உள்ளது
- (3) செயல்படு இன்கனில், A மற்றும் B சங்கிலி ஹெட்ரஜன் பினைப்புகளால் இணைந்திருக்கும்
- (4) மரபு பொறியியல் மூலம் ஈ-கோலையில் இன்கலின் உருவாக்கப்படுகிறது

81. ஆக்சிஜன் கடத்தல் குறித்த தவறான கூற்று எது ?

- (1) ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினோடு இணைவது ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தத் தோடு தொடர்புடையது.
- (2) கார்பன் டை ஆக்சைடின் பகுதி அழுத்தம் ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினோடு இணைத்தலில் தலையிடும்.
- (3) நுண்ணறையில் உயர்  $H^+$  அடர்வு ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் உருவாதலுக்கு உதவுகிறது.
- (4) நுண்ணறையில் குறை  $pCO_2$  அக்சி ஹீமோகுளோபின் உருவாதலுக்கு உதவிகிறது.

82. கீழ்கண்டவற்றுள் பூமியின் எப்பகுதிகளில் அதிக அளவில் சிற்றினப் பன்மயம் காணப் படுகிறது ?
- இந்தியாவின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை
  - மடகாஸ்கர்
  - இமய மலை
  - அமேசான் காடுகள்
83. குன்றல் பகுப்பு குறித்த கீழ்கண்டவற்றைப் பொருத்துக.
- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| (a) சைகோன்      | (i) முடிவடைதல்             |
| (b) பாக்கைண்    | (ii) கையாஸ்மாக்கள்         |
| (c) டிப்ளோஷன்   | (iii) குறுக்கெதிர் மாற்றம் |
| (d) டையாகைனசிஸ் | (iv) சினாப்சிஸ்            |
- கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து **சரியான** விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- | (a)       | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----------|-------|-------|-------|
| (1) (iii) | (iv)  | (i)   | (ii)  |
| (2) (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)   |
| (3) (i)   | (ii)  | (iv)  | (iii) |
| (4) (ii)  | (iv)  | (iii) | (i)   |
84. தாவரத்தின் பாகங்கள், ஒன்றின் உள் மற்றொன்று என இரு தலைமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது :
- |   |
|---|
| (a) மகரந்தப்பையின் உள்ளே மகரந்தத் துகள்கள்                |
| (b) இரண்டு ஆண் கேமீட்டுகள் உடைய முளைத்த மகரந்தத் துகள்கள் |
| (c) கனியின் உள்ளே விதை                                    |
| (d) சூவின் உள்ளே சூவிப்பை                                 |
- |                          |
|--------------------------|
| (1) (a) மட்டும்          |
| (2) (a), (b) மற்றும் (c) |
| (3) (c) மற்றும் (d)      |
| (4) (a) மற்றும் (d)      |
85. கிராஃபியன் பாலிக்கிளிலிருந்து அண்ட செல் வெளியாதலுக்கு ஹார்மோனின் எந்த நிலை உதவுகிறது ?
- எஸ்டிரஜனின் உயர் அடர்வு
  - புரோஜெஸ்டிரானின் உயர் அடர்வு
  - LH – இன் குறை அடர்வு
  - FSH – இன் குறை அடர்வு

86. கொடுக்கப்பட்டவைகளுள் கார அமினோ அமிலம் எது ?
- தெரோசின்
  - குளுட்டாமிக் அமிலம்
  - லைசின்
  - வாலென்
87. மனித செரிமான மண்டலம் குறித்த **சரியான** கூற்று எது ?
- இலியம் சிறு குடலில் திறக்கிறது
  - உணவு பாதையின் உள் படலம் செரோசா என்பது
  - இலியம் என்பது மிகுந்த சருங்கிய பகுதி
  - குடல் வால் டியோஷனத்திலிருந்து தோன்றுகிறது
88. வளர்ச்சி நிலை அதிகமாக இருப்பது எப்போது ?
- அடுக்கேற்றப் பருவம்
  - ஓடுக்கப் பருவம்
  - முதிர்ந்து உதிர்தல்
  - உறக்க நிலை
89. சூவின் உடலம் பிழுனிகிளில் இணைந்து காணப்படும் பகுதி :
- ஹெலம் (சூல் தழும்பு)
  - சூல் துளை
  - நிழுசெல்லஸ் (சூல் திசு)
  - சலாசா
90. சினாப்டினிமல் தொகுப்பு எந்த நிலையில் கலைந்து கரையத் தொடங்குகிறது ?
- பாக்கிடன்
  - சைக்கோட்டன்
  - டிப்ளோட்டன்
  - லெப்டோடன்
91. உட்சவாசம் நிகழ்வுகளில் **சரியானவை** எவை ?
- உதிர விதானம் சருங்கல்
  - வெளி விலா எலும்பிடைத்தசைகள் சுருங்குதல்
  - நுரையீரல் கொள்ளளவு குறைதல்
  - நுரையீரலிடை அழுத்தம் அதிகரிக்தல்
- |                          |
|--------------------------|
| (1) (a) மற்றும் (b)      |
| (2) (c) மற்றும் (d)      |
| (3) (a), (b) மற்றும் (d) |
| (4) (d) மட்டும்          |

92. விலங்குகளில் அதிக அளவு காணப்படும் புரதம் எது?
- வீமோகுளோபின்
  - கொல்லாஜன்
  - லெக்டின்
  - இன்ஸ்லின்
93. வறையறு நொதிகள் குறித்து தவறான கூற்று எது?
- ஒவ்வொரு வறையறு நொதியும் டி.என்.ஏ. -வின் முழு நீளத்தை ஆராய்கிறது.
  - பாலின்ட்ரோமிக் பகுதிகளில் டி.என்.ஏ. இழைகளை அவை வெட்டுகிறது.
  - மரபு பொறியியலில் அவை பயன் படுகிறது.
  - ஒட்டும் முனைகள் டி.என்.ஏ. வைகேஸ் மூலம் இணைக்கப்படுகிறது.
94. அண்டார்ஷிகா பகுதியில் பனிக்-குருடு ஏற்படுவது எதனால்?
- குறைந்த வெப்ப நிலையில் கண்ணில் உள்ள திரவங்கள் உறைவதால்
  - அதிக அளவிலான UV-B கதிர்வீச்சின் காரணமாக கருவிழி வீக்கமடைவதால்
  - பனிக்கட்டியிலிருந்து ஒளி அதிக அளவில் பிரதிபலிக்கப் படுவதால்
  - அகச்சிவப்பு கதிர்களால் விழித்திரை பாதிக்கப் படுவதால்
95. மனிதர்கள் செயல்பாட்டால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் கீழ்கண்ட எவற்றில் பரிணாமமடைந்தன?
- காலபகோஸ் தீவில் உள்ள டார்வின் சிட்டுக் குருவிகள்
  - களைச் செடிகளில் களைகொல்லி எதிர்ப்பு
  - ஆகோரியோட்டுகளில் மருந்துப் - பொருளுக்கு எதிர்ப்பு
  - மனிதன் உருவாக்கிய நாய்கள் போன்ற வீட்டு விலங்கின வகைகள்
- (a) மட்டும்
  - (a) மற்றும் (c)
  - (b), (c) மற்றும் (d)
  - (d) மட்டும்

96. கூழ்ம மின் ஆற்றலால் பகுப்பின் மூலம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட DNA துண்டங்களை இதன் உதவியுடன் பார்க்க முடியும்:
- பிரகாசமான நீல ஒளியில் அசிடோ-கார்மைன்
  - UV கதிர்வீச்சில் எத்திடியம் புரோமைடு
  - UV கதிர்வீச்சில் அசிடோகார்மைன்
  - அகச் சிவப்புக் கதிர்வீச்சில் எத்திடியம் புரோமைடு
97. கீழ்கண்ட வற்றைப் பொருத்துக்
- வினையுக்கசெயல் (i) ரிசின் பாடுகளை தடுப்பவை
  - பெப்படைடுபினைப் (ii) மெலோ- புகளைக் கொண்டவை னேட்
  - பூஞ்சைகளில் செல்- (iii) கைட்டின் சுவர் பொருள்
  - இரண்டாம் நிலை (iv) கொல- வளர்ச்சிதைப்பொருட்கள் லோஜின் கீழ்கண்ட வற்றிலிருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- | (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii)  | (iv)  | (iii) |
| (2) | (iii) | (i)   | (iv)  |
| (3) | (iii) | (iv)  | (i)   |
| (4) | (ii)  | (iii) | (i)   |
98. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.
- | தொகுதி - I |            | தொகுதி - II |                                       |
|------------|------------|-------------|---------------------------------------|
| (a)        | Bt பருத்தி | (i)         | ஜீன் சிகிச்சை                         |
| (b)        | அடினேசைன்  | (ii)        | செல் வகை டிஅமினேஸ் தற்காப்பு குறைபாடு |
| (c)        | ஆர்.என்.ஏ. | (iii)       | ஹெச் ஜி வி இடையீடு தொற்றை கண்டறிதல்   |
| (d)        | பி.சி.ஆர். | (iv)        | பேசில்லஸ் துரின் ஜியன்சிஸ்            |
- | (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (iv)  | (i)   | (ii)  |
| (2) | (iii) | (ii)  | (i)   |
| (3) | (ii)  | (iii) | (iv)  |
| (4) | (i)   | (ii)  | (iii) |

99. உபிரியுடன் அது தொடர்பான உயிர்நுட்பத்தில் அதன் பயனைப் பொருத்துக.

- |                     |                              |                        |
|---------------------|------------------------------|------------------------|
| (a) பாசில்லஸ்       | (i) குளோனிங் துரின்ஜியன்சிஸ் | கடத்தி                 |
| (b) தெர்மஸ்         | (ii) முதல் rDNA அக்ருவாடிகஸ் | மூலக்கூறை உருவாக்குதல் |
| (c) அக்ரோபா-க்ஸியம் | (iii) DNA இமிபேசியன்ஸ்       | பாலிமரேஸ்              |
| (d) சால்மோனெல்லா    | (iv) Cry புரதங்கள்           | டைபிழுரியம்            |

**சரியான விடையை கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்வு செய்யவும்.**

- | (a)                     | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (ii) (iv) (iii) (i) |     |     |     |
| (2) (iv) (iii) (i) (ii) |     |     |     |
| (3) (iii) (ii) (iv) (i) |     |     |     |
| (4) (iii) (iv) (i) (ii) |     |     |     |

100. கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து **சரியான இணையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.**

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| (1) ஸலகேஸ்கள்   | -இரு DNA மூலக்கூறு-களை இணைக்கின்றன |
| (2) பாலிமரேஸ்கள்                                      | -DNA -வை துண்டங்களாக உடைக்கின்றன   |
| (3) நியூகிளியேஸ்கள்-DNA -ன்இரு இழை-களைப் பிரிக்கின்றன |                                    |
| (4) எக்ஸோநியூக்ளி- -DNA -வில் குறிப் யேஸ்கள்          | பிட்ட இடங்களில் வெட்டுகின்றன       |

101. நீர்த்த சிறுநீர் உருவாதலை தடுக்கும் காரணி எது?

- |   |  |
|---|--|
| (1) குறைவான ADH சுரக்கப்படுவதால் அதிக நீர் மீள உறிஞ்சப்படல்                                   |  |
| (2) ஆல்டோஸ்டிரோன் விளைவால் சிறு நீர் குழல்களில் $\text{Na}^+$ மற்றும் நீர் மீள உறிஞ்சப்படுதல் |  |
| (3) ஏட்ரியல் நாட்ரியூர்ட்டிக் காரணி இரத்த நாள் சருக்கியாக செயல்படுகிறது                       |  |
| (4) JG செல்கள் ரெனின் சுரத்தலை குறைக்கிறது  |  |

102. ஹிசார்டேல் என்ற புதிய வகை செம்மறி ஆடு பிக்கானரி ஈவுகள் மற்றும் மரினோ ராம்களை எவ்வகை கலப்பு மேற்கொண்டு உருவாக்கப் பட்டது?

- (1) வெளி கலப்பு
- (2) திசர் மாற்ற கலப்பு
- (3) குறுக்கு கலப்பு
- (4) உள் கலப்பு

103. கிளைகோசைடிக் பிணைப்பு மற்றும் பெப்படைடு பிணைப்பு ஆகியவற்றை அவற்றின் அமைப்பில் முறையே கொண்ட பொருட்களை கண்டறிக.

- (1) கைடின், கொலஸ்ட்ரால்
- (2) கிளிசரால், ட்ரிப்சின்
- (3) செல்லுலோஸ், லெசித்தின்
- (4) இனுவின், இன்சலின்

104. கீழ்கண்டவற்றுள் ஓர் இனத் தொகையுடன் தொடர்பில்லாதது எது?

- (1) பால் விகிதம்
- (2) பிறப்பு வீதம்
- (3) இறப்பு வீதம்
- (4) சிற்றினங்களின் உறவு முறை

105. பிளாஸ்மோடியத்தின் தொற்று ஏற்படுத்தும் எந்த நிலை மனித உடலினுள் நுழைகிறது?

- (1) டிரோஃபோசைட்டுகள்
- (2) ஸ்போரோசைட்டுகள்
- (3) பெண் காமிட்டோசைட்டுகள்
- (4) ஆண் காமிட்டோசைட்டுகள்

106. ABO இரத்த வகையை கட்டுப்படுத்தும் 'I' ஜின் குறித்த தவறான கூற்று எது?

- (1) ஜின் 'I' மூன்று அலீல்கள் கொண்டுள்ளது.
- (2) ஒரு நபரிடத்தில் மூன்றில் இரண்டு அலீல்கள் மட்டும் காணப்படும்.
- (3) ' $I^A$ ' மற்றும் ' $I^B$ ' இரண்டும் இருந்தால், ஒரே வகையான சர்க்கரையை வெளிபடுத்துகிறது.
- (4) 'I' அலீல் எந்த சர்க்கரையையும் உருவாக்குவதில்லை.

107. கீழ்கண்ட இணைகளில் ஒருசெல் அல்காக்களின் இணை எது?

- (1) லாமினோரியா மற்றும் சர்காசம்
- (2) ஜெலிடியம் மற்றும் கிராசிலேரியா
- (3) அனபீனா மற்றும் வால்வாக்ஸ்
- (4) குளோரெல்லா மற்றும் ஸ்டைர்லினா

- 108.** நோய் தடைக்காப்பு குறித்த தவறான கூற்று எது?
- உயிர் அல்லது செயலிழந்த ஆண்டிஜென்கள் ஓம்புயிரியில் செலுத்தப்பட்டால் அவை ஆண்டிபாடிகளை உருவாக்கும். இது ஆற்றல் மிகு நோய் தடைகாப்பாகும்.
  - ஆண்டிபாடிகளை நேரடியாக செலுத்துதல் மந்தமான நோய் தடைகாப்பாகும்.
  - ஆற்றல் மிகு நோய் தடைகாப்பு உடனடியாகவும் முழு துலங்கலை கொடுக்கும்.
  - வளர் கரு தாயிடமிருந்து ஆண்டிபாடிகளை பெற்றுக் கொள்ளும். இது மந்தமான நோய்தடைக்காப்புக்கு எடுத்துக் காட்டு.
- 109.** கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.
- | <b>தொகுதி - I</b>   | <b>தொகுதி - II</b>                                |            |            |
|---------------------|---|------------|------------|
| (a) கிளாஸ்டிரீடியம் | (i) சைக்ளோஸ் பூட்டிலிக்கம்                        |            |            |
| (b) டிரைக்கோடெர்மா  | (ii) பியூட்ரிக் பாலிஸ்போரம்                       |            |            |
| (c) மோனாஸ்கஸ்       | (iii) சிட்ரிக் அமிலம் பர்டுரியஸ்                  |            |            |
| (d) ஆஸ்பார்ஜில்லஸ்  | (iv) இரத்த ஸ்ரைக்கர் கொலஸ்டிரால் குறைக்கும் காரணி |            |            |
| <b>(a)</b>          | <b>(b)</b>  | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1) (iii)           | (iv)  | (ii)       | (i)        |
| (2) (ii)            | (i)   | (iv)       | (iii)      |
| (3) (i)             | (ii)  | (iv)       | (iii)      |
| (4) (iv)            | (iii)   | (ii)       | (i)        |
- 110.** இரண்டாம் நிலை அண்ட செல்லில் குன்றல் பகுப்பு எந்த நிலையில் நிறைவடைகிறது?
- அண்ட வெளியாதலுக்கு முன்
  - புணர்ச்சி நடை பெறும் நேரத்தில்
  - கரு உருவான பிறகு
  - விந்தனு மற்றும் அண்ட செல் இணையும் நேரத்தில்
- 111.** ஒரு எதிரிடைப் பண்புக் கூறு தவிர்த்து ஏனையவை ஒத்த எத்தனை ஜோடிப் பண்புகளை மென்டல் தனித்த தூயவழி பட்டாணித் தாவர வகைகளில் தேர்ந்தெடுத்தார்?
- 4
  - 2
  - 14
  - 8
- 112.** தொகுதி கார்டேட்டா பற்றிய சரியான கூற்றுகள் யாது?
- வால் நாணிகளில் முதுகுநான் தலை முதல் வால் வரை வாழ்காலம் முழுவதும் காணப்படும்.
  - முதுகெலும்புகளில் முதுகு நாண் கருவளர்ச்சிக் காலத்தில் மட்டும் காணப்படும்.
  - மைய நரம்புத் தொகுதி முதுகுபறத்தில் உள்ளீட்றறி நரம்பினை கொண்டது.
  - கார்டேட்டா மூன்று துணை தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது; அரை நாணிகள், மேலினிக்கேட்டா மற்றும் தலை நாணிகள்.
- (d) மற்றும் (c)
  - (c) மற்றும் (a)
  - (a) மற்றும் (b)
  - (b) மற்றும் (c)
- 113.** பாரம்பரியத்திற்கான குரோமோசோம் கோட்பாட்டின் சோதனை சரிபார்ப்பு இவரால் நடத்தப்பட்டது:
- மெண்டல்
  - சட்டன்
  - பொவேரி
  - மார்கான்
- 114.** படிபெயர்த்தவின் முதல் நிலையாவது:
- ரைபோசோம் mRNA உடன் இணைதல்
  - DNA மூலக்கூறை கண்டறிதல்
  - tRNA -வின் அமைனோ அசைல் சேர்த்தல்
  - எதிர் குறியீடினை கண்டறிதல்
- 115.** தாவரங்களில் இன்றியமையாத மூலங்கள் மற்றும் அவற்றின் செயல்கள் குறித்த கீழ்கண்டவற்றை பொருத்துக.
- இரும்பு (i) ஓளிசார் நீர் பகுப்பு
  - துத்தநாகம் (ii) மகரந்தத்துகள் முளைத்தல்
  - போரான் (iii) குளோரோபில் உயிர்ம வழி உருவாக்கத்தில் தேவைப் படுவது
  - மாங்களீசு (iv) IAA உயிர்மவழி உருவாக்கம்
- சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும்.**
- | <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
|------------|------------|------------|------------|
| (1) (ii)   | (i)        | (iv)       | (iii)      |
| (2) (iv)   | (iii)      | (ii)       | (i)        |
| (3) (iii)  | (iv)       | (ii)       | (i)        |
| (4) (iv)   | (i)        | (ii)       | (iii)      |

116. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) 6 - 15 இணைகள் (i) டிரைகான் செவுள் பிளவுகள்
  - (b) ஹெட்டிரோ- (ii) வட்ட வாய்கள் செர்கள் வால் துடுப்பு
  - (c) காற்று பை (iii) காண்டிரிக்டீஸ்
  - (d) நூச் கொடுக்கு (iv) ஆஸ்மேக்டீஸ்
- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1)        | (ii)       | (iii)      | (iv)       |
| (2)        | (iii)      | (iv)       | (i)        |
| (3)        | (iv)       | (ii)       | (iii)      |
| (4)        | (i)        | (iv)       | (iii)      |

**தொகுதி - II**

117. உணவு பாதையிலுள்ள கோப்பை வடிவ செல்கள் எவற்றிலிருந்து மாறியிருக்கிறது ?

- (1) கட்டை வடிவ எபிதீவிய செல்கள்
- (2) தூண்வடிவ எபிதீவிய செல்கள்
- (3) காண்ட்ரோ செக்டு
- (4) கூட்டு எபிதீவிய செல்கள்

118. இரண்டு கார இணைகளுக்கிடையில் உள்ள தூரம்  $0.34 \text{ nm}$  மற்றும் இயல்பு பாலூட்ட செல்லின் மொத்த கார இணைகள்  $6.6 \times 10^9 \text{ bp}$  எனில், டி.என்.ஏ. -வின் நீளம் தோராயமாக எது ?

- (1) 2.0 மீட்டர்கள்
- (2) 2.5 மீட்டர்கள்
- (3) 2.2 மீட்டர்கள்
- (4) 2.7 மீட்டர்கள்

119. சிட்ரிக் அமில சமூர்ச்சியின் ஒரு சமூலின் போது தளப் பொருள் பாஸ்பாரிகரணம் நடைபெறுவதன் எண்ணிக்கை :

- (1) பூஜ்ஞியம்
- (2) ஓன்று
- (3) இரண்டு
- (4) மூன்று

120. மெய்யுட்கரு செல்களில் கிளைகோ புரதங்கள் மற்றும் கிளைகோலிபிடுகள் உருவாகும் முக்கியமான இடம் எது ?

- (1) எண்டோபிளாச் வலை
- (2) பெராக்சிசோம்கள்
- (3) கோல்கை உடலங்கள்
- (4) பாலிசோம்கள்

121. ஸ்ட்ரோபைலஸ்கள் அல்லது கூம்புகள் இவற்றில் காணப்படுகின்றன :

- (1) சால்வீனியா
- (2) டெரிஸ்
- (3) மார்கான்ஷியா
- (4) ஈக்குவிசிட்டம்

122. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) பிட்யூட்டரி (i) கிரேவிஸ் நோய் சுரப்பி
  - (b) தெராய்டு சுரப்பி (ii) டையாபிட்டிஸ் மெல்லிட்டாஸ்
  - (c) அட்ரீனல் சுரப்பி (iii) டையாபிட்டிஸ் இன்சிபிடாஸ்
  - (d) கணையம் (iv) அட்டிசன் நோய்
- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1)        | (iv)       | (iii)      | (i)        |
| (2)        | (iii)      | (ii)       | (i)        |
| (3)        | (iii)      | (i)        | (iv)       |
| (4)        | (ii)       | (i)        | (iv)       |

**தொகுதி - II**

123. சிறுநீரில் கீழ்கண்ட எந்த பொருள் காணப்பட்டால், டயாபிட்டிஸ் மெல்லிட்டாஸிற்கு அறிகுறியாகும் ?

- (1) யுரேமியா மற்றும் கீட்டோனூரியா
- (2) யுரேமியா மற்றும் சிறுநீர் கற்கள்
- (3) கீட்டோனூரியா மற்றும் கிளைகோகூரியா
- (4) சிறுநீர் கற்கள் மற்றும் உயர் கிளைகோ-கூரியா

124. சரியாக பொருத்தியுள்ளது எது ?

- |   |   |
|---|---|
| (1) ஹீமோஃபீலியா - Y பிணைப்பு  | (2) ஃபீனையில் - உடல் குரோமோ சோமில் உள்ள ஓலகிய பண்பு |
| (3) அரிவாள் - உடல் குரோமோ இரத்தச் சோகை சோமில் உள்ள ஓடுங்கிய பண்பு, குரோ-மோசோம்-11 | (4) தலாசீமியா - X பிணைப்பு                          |


- 125.** ஃபுளோரிடியன் தரசம் இதற்கு இணையான அமைப்பைக் கொண்டது.
- (1) தரசம் மற்றும் செல்லுலோஸ்
  - (2) அமைலோ பெக்டின் மற்றும் கிளை-கோஜன்
  - (3) மான்னிடால் மற்றும் ஆல்ஜின்
  - (4) லாமினாரின் மற்றும் செல்லுலோஸ்
- 126.** ஒரு சூழ்நிலை மண்டலத்தின் மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் மற்றும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் ஆகியவை தொடர்பு-டைய கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் **சரியானது** எது ?
- (1) நிகர முதல்நிலை உற்பத்தித்திறனை விட, மொத்த முதல்நிலை உற்பத்தித்திறனை எப்போதும் குறைவாக உள்ளது.
  - (2) மொத்த முதல்நிலை உற்பத்தித்திறனை எப்போதும் நிகர முதல்நிலை உற்பத்தித் திறனை விட அதிகமாக உள்ளது.
  - (3) மொத்த முதல்நிலை உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நிகர முதல்நிலை உற்பத்தித்திறன் ஆகியவை ஒன்றேயாகும்.
  - (4) மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித்திறன் ஆகியவற்றின் இடையே எந்தத் தொடர்பும் இல்லை.
- 127.** கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் எது **சரியானது** ?
- (1) அடினைன் இரு H-பிணைப்புகள் மூலம் தைமைன் உடன் இணைந்துள்ளது.
  - (2) அடினைன் ஒரு H-பிணைப்பின் மூலம் தைமைன் உடன் இணைந்துள்ளது.
  - (3) அடினைன் மூன்று H-பிணைப்புகளின் மூலம் தைமைன் உடன் இணைந்துள்ளது.
  - (4) அடினைன் தைமைனுடன் இணைவதில்லை.
- 128.** இன்டர்ஃபேஸ் நிலையின் G<sub>1</sub> நிலை குறித்த சரியான கூற்று எது ?
- (1) டி.என்.ஏ. உருவாக்கம் மற்றும் இரட்டிப் பாதல் நடைபெறுகிறது
  - (2) செல் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்தும் மறு ஒருங்கமைதல் அடைகிறது
  - (3) செல்லில் வளர்ச்சிதை மாற்ற செயல்கள் நடைபெற்று, செல் வளர்கிறது; ஆனால் டி.என்.ஏ. இரட்டிப்படையாது
  - (4) உட்கரு பிரிவு நடைபெறுகிறது

- 129.** என்டிரோகைனேஸ் என்ற நொதி எதன் மாற்றத்திற்கு உதவுகிறது ?
- (1) புரதம் → பாலிப்பெப்படைடு
  - (2) டிரிப்சினோஜன் → டிரிப்சின்
  - (3) கெசினோஜன் → கெசீன்
  - (4) பெப்சினோஜன் → பெப்சின்
- 130.** எதனைக் கட்டுப்படுத்த 1987-ல் மான்ட்ரியல் பிரகடனம் கையொப்பமிடப்பட்டது ?
- (1) மரபு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்களை ஒரு நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டிற்கு கொண்டு செல்லுதல்
  - (2) ஓசோனை அழிக்கும் பொருட்களின் வெளியீடு
  - (3) பசுமை இல்ல வாயுக்களின் வெளியீடு
  - (4) மின்னணு கழிவுகளை அகற்றுதல்
- 131.** ஆகாயத் தாமரை மற்றும் நீர் அல்லி ஆகியவற்றில் மகரந்தச் சேர்க்கை இவற்றின் மூலம் நடைபெறுகிறது.
- (1) பூச்சிகள் அல்லது காற்று
  - (2) நீர் ஓட்டங்கள் மட்டும்
  - (3) காற்று மற்றும் நீர்
  - (4) பூச்சிகள் மற்றும் நீர்
- 132.** முழுவதும் பால் வினை நோய்கள் அடங்கியது எது ?
- (1) கொனோரியா, சி.பி.விலிஸ், ஜெனிட்டல் ஹெர்பிஸ்
  - (2) கொனோரியா, மலேரியா, ஜெனிட்டல் ஹெர்பிஸ்
  - (3) எய்ட்ஸ், மலேரியா, ஃபைலேரியா
  - (4) புற்றுநோய், எய்ட்ஸ், சி.பி.விலிஸ்
- 133.** ஒளிக்வாசத்தில் RuBisCo நொதியின் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிகழ்வால் தோன்றுவது :
- (1) 2 மூலக்கூறுகள் 3-கார்பன் பொருள்
  - (2) 1 மூலக்கூறு 3-கார்பன் பொருள்
  - (3) 1 மூலக்கூறு 6-கார்பன் பொருள்
  - (4) 1 மூலக்கூறு 4-கார்பன் பொருள்
  - (5) 1 மூலக்கூறு 2-கார்பன் பொருள்

- 134.** நிகோடின், ஸ்டரிக்னென், மற்றும் கேஃபைன் போன்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிதைப் பொருட்கள் தாவரங்களால் இதற்காக உற்பத்தி செய்யப் படுகின்றன :
- ஊட்டச் சத்துக் குறிய திறன்
  - வளர்ச்சி பிரதிபலிப்பு
  - பாதுகாப்புச் செயல்
  - இனப்பெருக்கத்தின் மீதுள்ள செயற்பாடு
- 135.** பரினாமம் குறித்த கருவியல் சான்றினை தவறேன நிரூபித்தவர் :
- கார்ல் எர்ன்ஸ்ட் வான் பேர்
  - ஆல்பிரட் வாலஸ்
  - சார்லஸ் டார்வின்
  - ஓபாரின்
- 136.** ஓர் p-n சந்தி டயோடினது இயக்கமில்லாப் பகுதியின் அகலம் அதிகரிப்பது என்பது இதனால் ஏற்படுகிறது :
- முன்னோக்குச் சார்பு மட்டும்
  - பின்னோக்குச் சார்பு மட்டும்
  - முன்னோக்குச் சார்பு மற்றும் பின்னோக்குச் சார்பு ஆகிய இரண்டும்
  - முன்னோக்கு மின்னோட்ட அதிகரிப்பு
- 137.** பயன்தொடக்க அதிர்வெண்ணின் 1.5 மடங்கு அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி, ஒரு ஒளி உணர்வு நுட்ப பொருள்மீது விழுகிறது. அதிர்வெண் பாதியாகவும், செறிவு இரட்டிப்பாகவும் ஆக்கப்படும்போது, ஒளி மின்னோட்டம் என்னவாகும் ?
- இரட்டிப்பாகும்
  - நான்கு மடங்காகும்
  - நான்கில் ஒரு பங்காகும்
  - சுழியாகும்
- 138.** ஒரு மீட்டர் சமன்சுற்றின் இடது இடைவெளியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதொரு மின்தடைக்கம்பி, வலது இடைவெளியில் உள்ள  $10 \Omega$  மின்தடையோடு சமன் செய்து கொள்ளும் புள்ளி, சமன்சுற்றுக் கம்பியினை,  $3 : 2$  என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கிறது. மின்தடை கம்பியின் நீளம்,  $1.5 \text{ m}$  எனில், மின்தடை கம்பியின்  $1 \Omega$  - மிற்கான நீளம் என்பது :
- $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$
  - $1.0 \times 10^{-1} \text{ m}$
  - $1.5 \times 10^{-1} \text{ m}$
  - $1.5 \times 10^{-2} \text{ m}$
- 139.** DNA -வில் உள்ள பினைப்பு ஒன்றினை முறிக்க தேவையான ஆற்றல்,  $10^{-20} \text{ J}$  ஆகும். eV-யில் இதன் மதிப்பு, ஏறக்குறைய :
- 6
  - 0.6
  - 0.06
  - 0.006
- 140.** சீரிசை இயக்கத்திலுள்ள துகள் ஒன்றின் இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் முடுக்கம் ஆகியவற்றிற் கிடையிலான கட்ட வேறுபாடு என்பது :
- $\pi \text{ rad}$
  - $\frac{3\pi}{2} \text{ rad}$
  - $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
  - சுழி
- 141.** கோபுரம் ஒன்றின் உச்சியிலிருந்து, ஒரு பந்து,  $20 \text{ m/s}$  எனும் திசை வேகத்தில் கீழ்நோக்கி செங்குத்தாக எறியப்படுகிறது. அது, சிறிது நேரத்திற்குப்பிறகு  $80 \text{ m/s}$  என்ற திசை வேகத்தில் தரையைத் தொடுகிறது, எனில் கோபுரத்தின் உயரம் : ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )
- 360 m
  - 340 m
  - 320 m
  - 300 m
- 142.** ஒரு சிறிய மின் இருமுனை,  $16 \times 10^{-9} \text{ C m}$  எனும் இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றுள்ளது. இருமுனை அச்சோடு  $60^\circ$  எனும் கோணத்தினை மேற்கொண்டுள்ள ஒரு கோட்டில், இருமுனை மையத்திலிருந்து  $0.6 \text{ m}$  தூரத்தில் அமைந்துள்ளதொரு புள்ளியில் இருமுனையினால் ஏற்படும் மின்னழுத்த மதிப்பு என்பது :  $\left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$
- 50 V
  - 200 V
  - 400 V
  - சுழி

143. 599 எனும் ஏற்புத்திறனுடைய ஓர் இரும்புத் தண்டு,  $1200 \text{ A m}^{-1}$  எனும் காந்தமாக்கு புலத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. தண்டு செய்யப்பட்ட பொருளின் உட்புகுதிறன் என்பது : ( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ )
- $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
  - $8.0 \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
  - $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
  - $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
144. சம கொள்ளலாவு பெற்றுள்ள இரு உருளைகள் A மற்றும் B, ஒன்றோடொன்று ஓர் அடைப்பான் வழியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. A, திட்ட வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில், நல்லியல்பு வாயு ஒன்றினைக் கொண்டுள்ளது. B, முழுவதுமாக காலியாக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பு முழுவதும் வெப்பக்காப்பிடப் பட்டுள்ளது. அடைப்பான், விரைவாக திறக்கப் படுகிறது. இந்த நிகழ்வு, இந்த வகையைச் சார்ந்தது :
- மாறா வெப்பநிலை
  - வெப்ப மாற்றீடற்றது
  - மாறா பருமம்
  - மாறா அழுத்தம்
145. சீராகப் பரப்பப்பட்டுள்ள  $3.2 \times 10^{-7} \text{ C}$  எனும் மின்சமையினை,  $10 \text{ cm}$  ஆரம் கொண்டதொரு கோள் வடிவு கடத்தி பெற்றுள்ளது. கோளத்தின் மையத்திலிருந்து,  $15 \text{ cm}$  தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியில் உள்ள மின்புலத்தின் எண் மதிப்பு யாது ?  $\left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$
- $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
  - $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
  - $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
  - $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
146. மூலக்கூறு விட்டம், d மற்றும் எண் அடர்த்தி n கொண்ட வாயு ஒன்றின் சராசரி மோதலிடை தூரத்தினை இவ்வாறு வெளிப்படுத்த முடியும் :
- $\frac{1}{\sqrt{2} n\pi d}$
  - $\frac{1}{\sqrt{2} n\pi d^2}$
  - $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi d^2}$
  - $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$

147. காட்டப்பட்டுள்ள வாதியல் மின்சுற்றிற்கான மெய் அட்டவணை என்பது :



(1)	A	B	Y
	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1
(2)	A	B	Y
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	1
(3)	A	B	Y
	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0
(4)	A	B	Y
	0	0	1
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	0

148. ஒரு பொருளது  $0.5 \text{ g}$ -ற்கான ஆற்றல் சமன் என்பது :

- $4.5 \times 10^{16} \text{ J}$
- $4.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- $1.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- $0.5 \times 10^{13} \text{ J}$

149.  $20 \text{ W/cm}^2$  எனும் சராசரி பாய அடர்த்தி கொண்ட ஒளி,  $20 \text{ cm}^2$  பரப்பளவு உடைய எதிரொளிப் பற்ற பரப்பின் மீது செங்குத்து வீழ்வில் விழுகிறது. 1 நிமிட கால இடைவெளியில், பரப்பால் ஏற்கப்பட்ட ஆற்றல் என்பது :

- $10 \times 10^3 \text{ J}$
- $12 \times 10^3 \text{ J}$
- $24 \times 10^3 \text{ J}$
- $48 \times 10^3 \text{ J}$

150. (A எனும் முப்பட்டக்கோணம் கொண்ட) ஒரு குறுங்கோண முப்பட்டகத்தின் ஒரு பரப்பில், ஓர் ஒளிக்கதிரானது, i எனும் வீழ்கோணத்தில் விழுகிறது. மேலும் அது எதிர்ப்பக்க பரப்பு வழியாக செங்குத்தாக வெளியேறுகிறது. முப்பட்டக பொருளின் ஒளி விலகல் எண், μ, எனில், வீழ் கோணம் ஏற்க்குறைய சமமாக இருப்பது :

- (1)  $\frac{A}{2\mu}$
- (2)  $\frac{2A}{\mu}$
- (3)  $\mu A$
- (4)  $\frac{\mu A}{2}$

151. எதிர்க்குறி வெப்ப மின்தடை எண் கொண்ட திண்மங்கள் என்பன :

- (1) உலோகங்கள்
- (2) மின்காப்புப் பொருட்கள் மட்டும்
- (3) குறைகடத்திகள் மட்டும்
- (4) மின்காப்புப் பொருட்கள் மற்றும் குறைகடத்திகள்

152.  $^{235}_{92}\text{U}$  எனும் யுரோனிய ஐஸோடோப், நியூட்ரான் கொண்டு தாக்கப்படும் போது,  $^{89}_{36}\text{Kr}$  மற்றும் மூன்று நியூட்ரானோடு உருவாக்கப்படுவது :

- (1)  $^{144}_{56}\text{Ba}$
- (2)  $^{91}_{40}\text{Zr}$
- (3)  $^{101}_{36}\text{Kr}$
- (4)  $^{103}_{36}\text{Kr}$

153. r ஆரம் கொண்டதாரு நுண்துளை குழாய், நீரில் அமிழ்த்தப் படுகிறது. அதில் நீரானது, h உயரம் எழும்புகிறது, நுண்துளையிலுள்ள நீரது நிறை, 5 g ஆகும். 2r, ஆரம் கொண்ட மற்றொரு நுண்துளைகுழாய் நீரில் அமிழ்த்தப் படுகிறது. இந்தக்குழாயில் எழும்பக் கூடிய நீரது நிறை என்பது :

- (1) 2.5 g
- (2) 5.0 g
- (3) 10.0 g
- (4) 20.0 g

154.  $0.2 \text{ m}^3$  பருமன் கொண்டதொரு குறிப்பிட்ட வெளிப்பகுதியில், எங்கும், 5 V மின்னழுத்தம் காணப்படுகிறது. இப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மின்புலமதிப்பானது :

- (1) சமி
- (2) 0.5 N/C
- (3) 1 N/C
- (4) 5 N/C

155. 50 cm நீளமும், 100 சுற்றுகளையும் உடையதொரு நீள்வரிச்சருள், 2.5 A மின்னோட்டத் திணை தாங்கிச் செல்கிறது. நீள் வரிச்சருளின் மையத்தில் உள்ள காந்தப்புலம் என்பது : ( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ )

- (1)  $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
- (2)  $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$
- (3)  $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$
- (4)  $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$

156. ஒரு விண்மீனிலிருந்து, 600 nm அலைநீளம் கொண்ட ஒளி வருகிறது என அனுமானிக்க. 2 m விட்டம் கொண்ட பொருளாருகு வில்லையை கொண்ட தொலைநோக்கியினது பகுதிரன் வரம்பு என்பது :

- (1)  $3.66 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (2)  $1.83 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (3)  $7.32 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (4)  $6.00 \times 10^{-7} \text{ rad}$

157. V வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு இடையே, ஓர் எலக்ட்ரான் ஓய்விலிருந்து முடுக்கப்படுகிறது. எலக்ட்ரானது டெ-ப்ராக்கி அலை நீளம்,  $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$  எனில், மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது :

- (1) 10 V
- (2)  $10^2 \text{ V}$
- (3)  $10^3 \text{ V}$
- (4)  $10^4 \text{ V}$

158. தகைவு என்பதன் பரிமாணங்கள் :

- (1)  $[\text{MLT}^{-2}]$
- (2)  $[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$
- (3)  $[\text{ML}^0\text{T}^{-2}]$
- (4)  $[\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]$

159. காற்றினை ஊடகமாகப் பெற்றுள்ள ஓர் இணைத்தட்டு மின்தேக்கியினது, மின்தேக்குதிறன்,  $6 \mu\text{F}$  ஆகும். மின்கடத்தாப்பொருள் ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்துவதால், அதன் மின்தேக்குதிறன்,  $30 \mu\text{F}$  என்று ஆகிறது. ஊடகத்தின் அனுமதிதிறனானது :

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

- (1)  $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (2)  $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (3)  $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (4)  $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

160. ஒரு மின்காந்த அலையினது செறிவுக்கு, அதன் மின்புல மற்றும் காந்தப்புலக் கூறுகள் அளிக்கும் பங்களிப்புகளின் விகிதமானது :

(c=EM அலையினது வேகம்)

- (1)  $c : 1$
- (2)  $1 : 1$
- (3)  $1 : c$
- (4)  $1 : c^2$

161. போர் மாதிரி, பின்வருவனவற்றில் எதற்கு பொருந்தமற்றதாக அமையும் ?

- (1) வைட்ரஜன் அணு
- (2) ஒற்றை அயனியாக்கமடைந்த ஹீலியம் அணு ( $\text{He}^+$ )
- (3) ட்ரூடிரான் அணு
- (4) ஒற்றை அயனியாக்கமடைந்த நியான் அணு ( $\text{Ne}^+$ )

162.  $249 \text{ kPa}$ , அழுத்தம் மற்றும்  $27^\circ\text{C}$  வெப்பநிலையிலுள்ள வைட்ரஜன் வாயுவினை, ஒரு உருளை கொண்டுள்ளது. அதன் அடர்த்தி என்பது : ( $R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )

- (1)  $0.5 \text{ kg/m}^3$
- (2)  $0.2 \text{ kg/m}^3$
- (3)  $0.1 \text{ kg/m}^3$
- (4)  $0.02 \text{ kg/m}^3$

163. டிரான்சிஸ்டரது செயல்பாட்டிற்கு, பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது ?

- (1) அடிவாய், உமிழ்வாய் மற்றும் ஏற்பி பகுதிகள் சமமான மாசுப்பொருள் அடர்த்திகளோடு அமைய வேண்டும்.
- (2) அடிவாய், உமிழ்வாய் மற்றும் ஏற்பி பகுதிகள் சமமான உருவளவினை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- (3) உமிழ்வாய் சந்தி மற்றும் ஏற்பி சந்தி ஆகிய இரண்டும் முன்னோக்கு சார்பினை பெற்றிருக்கும்.
- (4) அடிவாய் பகுதி மிக மெல்லியதாகவும், மிதமான மாசுமட்டும் அமைய வேண்டும்.

164. ஓர் இடைமுகத்திம் ப்ரஸ்டர் கோணம்,  $i_b$  அமையவேண்டிய மதிப்பு :

- (1)  $0^\circ < i_b < 30^\circ$
- (2)  $30^\circ < i_b < 45^\circ$
- (3)  $45^\circ < i_b < 90^\circ$
- (4)  $i_b = 90^\circ$

165. ஒற்றையணு வாயு ஒன்றின் சராசரி வெப்பவியல் ஆற்றல், என்பது : ( $k_B$  என்பது போல்ஸ்ட்மென் மாறிலி மற்றும்  $T$ , தனி வெப்பநிலை)

- (1)  $\frac{1}{2} k_B T$
- (2)  $\frac{3}{2} k_B T$
- (3)  $\frac{5}{2} k_B T$
- (4)  $\frac{7}{2} k_B T$


166. தனிச்சிறப்பு மிக்க இலக்கங்களை கருத்தில் கொள்ளுகையில்,  $9.99 \text{ m} - 0.0099 \text{ m}$  என்பதன் மதிப்பு யாது ?

- (1)  $9.9801 \text{ m}$
- (2)  $9.98 \text{ m}$
- (3)  $9.980 \text{ m}$
- (4)  $9.9 \text{ m}$

167. ஒரு திருகு அளவி,  $0.01 \text{ mm}$  எனும் மீச்சிற்றளவினையும், மேலும் தனது வட்ட அளவுகோலில் 50 பிரிவுகளையும் பெற்றுள்ளது. அத்திருகு அளவியின், புரி என்பது :

- (1)  $0.01 \text{ mm}$
- (2)  $0.25 \text{ mm}$
- (3)  $0.5 \text{ mm}$
- (4)  $1.0 \text{ mm}$

168. பின் வரும் வரைபடங்களில், தாமிரத்தின் மின்தடையெண் ( $\rho$ ) வெப்பநிலை ( $T$ ) -யோடு அடையும் வேறுபாட்டை உணர்த்துவது எது?




169.  $2\hat{k}$  m என்ற ஆர் வெக்டர் கொண்ட துகள் ஒன்றின் மீது, மூலத்தைப் பொருத்த  $3\hat{j}$  N என்றதொரு விசை செயல்படும் போதுள்ள திருப்புவிசையைக் காண்க.

- (1)  $6\hat{i}$  N m
- (2)  $6\hat{j}$  N m
- (3)  $-6\hat{i}$  N m
- (4)  $6\hat{k}$  N m

170. ஒரு தொடர் LCR மின்சுற்று, ஓர் ac மின்னமுத்த மூலத்தோடு இணைக்கப் பட்டுள்ளது. மின்சுற்றிலிருந்து, L விலக்கப்படும் போது, மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னமுத்தத் திற்கிடையிலான கட்டவேறுபாடு,  $\frac{\pi}{3}$  ஆகும். இதற்கு பதிலாக, C மின்சுற்றிலிருந்து விலக்கப்படின், மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னமுத்தத்திற்கிடையிலான கட்டவேறுபாடு, மீண்டும்  $\frac{\pi}{3}$  என்றமைகிறது. மின்சுற்றினது திறன் காரணி என்பது:

- (1) சமி
- (2) 0.5
- (3) 1.0
- (4) -1.0

171. ஒரு நிறையில்லா கம்பியின் முனைகளில் 4 kg மற்றும் 6 kg நிறை கொண்ட இரு பொருட்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. கம்பி கடந்துசெல்லும் இழுவை (pulley), உராய்வற்று. (படத்தில் காண்க). புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தினை (g) பொருந்த, ஒருங்கினது முடுக்கம் என்பது:



- (1) g  
(2) g/2  
(3) g/5  
(4) g/10

172.  $r_1$  மற்றும்  $r_2$  ( $r_1 = 1.5 r_2$ ) ஆரங்கள் கொண்ட இரு திண்ம தாமிர கோளங்களின் வெப்பநிலையினை, 1 K என்றளவில் உயர்த்துவதற்கு தேவைப்படும் வெப்பளவுகளின் தகவு என்பது :

- (1)  $\frac{27}{8}$   
(2)  $\frac{9}{4}$   
(3)  $\frac{3}{2}$   
(4)  $\frac{5}{3}$

173. ஒரு  $40 \mu F$  மின்தேக்கி, 200 V மற்றும் 50 Hz ac மின் அளிப்பானோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சுற்றிலுள்ள மின்னோட்டத்தினது rms மதிப்பு ஏற்குறையை :


- (1) 1.7 A  
(2) 2.05 A  
(3) 2.5 A  
(4) 25.1 A

174. புவியினது பரப்பில், ஒரு பொருள், 72 N என்ற எடையைப் பெற்றுள்ளது. புவியினது ஆரத்தின் பாதிக்குச் சமமான உயரத்தில், அதன் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை, யாது?

- (1) 48 N  
(2) 32 N  
(3) 30 N  
(4) 24 N

175. 1 m நீளம் கொண்ட, ஒதுக்கத்தக்க நிறை கொண்ட திட தண்டு ஒன்றின் இரு முனைகளில், முறையே 5 kg மற்றும் 10 kg நிறை கொண்ட இரு துகள்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 5 kg துகளிலிருந்து, ஒருங்கிணது நிறை மையம் அமைந்துள்ள தொலைவு, (ஏறக்குறைய) :
- 33 cm
  - 50 cm
  - 67 cm
  - 80 cm
176. யங்கினது இரட்டைப் பிளவுச் சோதனையில், ஓரியல்பு மூலங்களுக்கிடையிலான இடைவெளி பாதியாக்கப்பட்டு, ஓரியல்பு மூலங்களிலிருந்து திரையினது தொலை இரட்டிப்பாக்கப் படுகிறது எனில், பட்டைவரி அகலம் :
- இரட்டிப்பாகும்
  - பாதியாகும்
  - நான்கு மடங்காகும்
  - நான்கில் ஒரு பங்காகும்
177.  $3 \times 10^{-10} \text{ Vm}^{-1}$  மதிப்புடைய மின்புலத்தில்,  $7.5 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$  எனும் நகர்வு திசைவேகமுடைய ஒரு மின்னாட்டப்பட்ட துகள் பெறும் நகர்வு திறன்,  $\text{m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$  என்ற அலகில் :
- $2.25 \times 10^{15}$
  - $2.5 \times 10^6$
  - $2.5 \times 10^{-6}$
  - $2.25 \times 10^{-15}$

178. ஒரு மின்தடையினது நிறக்குறியீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



மின்தடை மற்றும் சகிப்புத்தன்மை ஆகியவற்றின் மதிப்புகள், முறையே :

- $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- $470 \Omega, 5\%$

179. நிலையாக பொருத்தப்பட்டுள்ள தாங்கி ஒன்றில், L நீளம் மற்றும் A, குறுக்குவெட்டு பரப்பு கொண்ட கம்பி ஒன்று தொங்கவிடப் பட்டுள்ளது. M எனும் நிறை, அதன் கட்டற்ற முனையிலிருந்து தொங்கவிடப்படும் போது, கம்பியின் நீளம், L<sub>1</sub> என்று மாறுகிறது எனில், யங்கின் குணகத்திற்கான கோவை என்பது :

- $$\frac{\text{MgL}_1}{\text{AL}}$$
- $$\frac{\text{Mg(L}_1 - \text{L})}{\text{AL}}$$
- $$\frac{\text{MgL}}{\text{AL}_1}$$
- $$\frac{\text{MgL}}{\text{A(L}_1 - \text{L})}$$

180. ஒரே பொருளாலான, கிடார் ஒன்றின் A மற்றும் B ஆகிய இரு நரம்புகள் சிறிதளவு சுருதியில் வேறுபடுகின்றன மற்றும் அவை 6 Hz, அதிர்வெண் கொண்ட விம்மல்களை ஏற்படுத்துகின்றன. B -யில் உள்ள இழுவிசை சிறிதளவு குறைக்கப்படும் போது, விம்மல் அதிர்வெண் 7 Hz ஆக அதிகரிக்கிறது. A -யினது அதிர்வெண், 530 Hz எனில், B -யினது தொடக்க அதிர்வெண் மதிப்பு என்பது :

- 523 Hz
- 524 Hz
- 536 Hz
- 537 Hz

**Space For Rough Work / இதர வேலைக்கான காலியிடம்**

No. :

Test Booklet Code

வினாத்தான் தொகுப்பு குறியீடு

# HAKAN

This Booklet contains 24+44 pages.

இவ்வினாத்தான் தொகுப்பு 24+44 பக்கங்களை கொண்டது.

**F4**

**Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.**

இந்த வினாத் தொகுப்பை திறக்கும்படி கண்காணிப்பாளர் கூறும் வரையில் திறக்கக் கூடாது.

**Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.**

வினாத் தொகுப்பிற்கு பின் பக்கமுள்ள அறிவுரைகளை கவனமாக படிக்கவும்.

## **Important Instructions :**

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on **side-1** and **side-2** carefully with **blue/black ball point pen** only.
2. The test is of **3 hours** duration and Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
4. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
6. The CODE for this Booklet is **F4**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.

## **முக்கிய அறிவுரைகள் :**

1. இந்த வினாத் தொகுப்பிற்குள் விடைத்தாள் உள்ளது. வினாத் தொகுப்பை திறக்க அறிவுறுத்தப்படும் பொழுது விடைத்தாளை எடுத்து பக்கம் 1 மற்றும் பக்கம் 2 இல் கேட்கப்பட்டுள்ள விபரங்களை கவனமாக **நீலம்/கருப்பு** பந்துமுனைப் பேனா மட்டுமே பயன்படுத்தி நிரப்பவும்.
2. இந்த தேர்வு **3 மணி** நேரமாகும் மற்றும் வினாத்தான் தொகுப்பு **180** வினாக்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு வினாவுக்கு **4** மதிப்பெண்கள். ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கு தேர்வு எழுதுபவருக்கு **4** மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும். மொத்த மதிப்பெண்களிலிருந்து ஒவ்வொரு தவறான விடைக்கும் **ஒரு மதிப்பெண் கழிக்கப்படும்**. அதிகப்ச மதிப்பெண்கள் **720** ஆகும்.
3. இந்த பக்கத்தில் எழுதுவதற்கும்/விடைகளைக் குறிப்பதற்கும் **நீலம்/கருப்பு** பந்துமுனைப் பேனா மட்டும் உபயோகிக்க வேண்டும்.
4. வினாத்தாள் தொகுப்பில் கொடுக்கப்பட்ட இடத்தில் மட்டும் சரி பார்த்தலுக்கு (Rough work) பயன்படுத்த வேண்டும்.
5. தேர்வு முடிந்தவுடன், தேர்வு எழுதுபவர் விடைத்தாளை அறை/ஹாலிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு முன், அறை தேர்வுக் கண்காணிப்பாளரிடம் கொடுக்க வேண்டும். தேர்வு எழுதுபவர்கள் வினாத்தான் தொகுப்பை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்க படுகிறார்கள்.
6. இந்த வினாத்தான் தொகுப்பின் குறியீடு **F4**, விடைத்தாளின் பக்கம் 2-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடும் இந்த வினாத்தான் தொகுப்பின் குறியீடும் ஒன்று தான் என்று உறுதி செய்யவும். ஏதாவது முரண்பாடு இருந்தால், தேர்வு எழுதுபவர் உடனடியாக அறை கண்காணிப்பாளரிடம் தெரிவித்து, மாற்று வினாத்தான் தொகுப்பையும் மற்றும் விடைத்தாளையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
7. தேர்வு எழுதுபவர்கள் விடைத்தாள் மடங்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். விடைத்தாளில் எந்த விதமான தேவையற்ற குறிப்புகளும் செய்யக்கூடாது. வினாத்தான் தொகுப்பு/விடைத்தாளில் கொடுக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட இடத்தை தவிர எந்த இடத்திலும் தேர்வு எழுதுபவர் அவரது பதிவு எண்ணை எழுத கூடாது.
8. விடைத்தாளில் வெள்ளை தீரவத்தில் அழித்து திருத்தங்கள் செய்ய அனுமதியில்லை.

**In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.**

வினா மொழி பெயர்ப்பில் ஏதாவது சர்ச்சை இருந்தால், ஆங்கில பிரதியே முடிவானது.

Name of the Candidate (in Capitals) : \_\_\_\_\_

தேர்வு எழுதுபவரின் பெயர் : \_\_\_\_\_

Roll Number : in figures \_\_\_\_\_

பதிவு எண் : எண்ணில் \_\_\_\_\_

: in words \_\_\_\_\_

: எழுத்தில் \_\_\_\_\_

Centre of Examination (in Capitals) : \_\_\_\_\_

தேர்வு மையம் : \_\_\_\_\_

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_

Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_


தேர்வு எழுதுபவரின் கையொப்பம்:

கண்காணிப்பாளரின் கையொப்பம்:

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : \_\_\_\_\_

1.  $r_1$  மற்றும்  $r_2$  ( $r_1 = 1.5 r_2$ ) ஆரங்கள் கொண்டிருத்தின்ம தாமிர கோளங்களின் வெப்பநிலையினை, 1 K என்றாலில் உயர்த்துவதற்கு தேவைப்படும் வெப்பளவுகளின் தகவு என்பது :
- $\frac{3}{2}$
  - $\frac{5}{3}$
  - $\frac{27}{8}$
  - $\frac{9}{4}$
2.  $2\hat{k} \text{ m}$  என்ற ஆர வெக்டர் கொண்ட துகள் ஒன்றின் மீது, மூலத்தைப் பொருத்த  $3\hat{j} \text{ N}$  என்றதொரு விசை செயல்படும் போதுள்ள திருப்புவிசையைக் காண்க.
- $-6\hat{i} \text{ N m}$
  - $6\hat{k} \text{ N m}$
  - $6\hat{i} \text{ N m}$
  - $6\hat{j} \text{ N m}$
3. டிரான்சிஸ்டரது செயல்பாட்டிற்கு, பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது ?
- உமிழ்வாய் சந்தி மற்றும் ஏற்பி சந்தி ஆகிய இரண்டும் முன்னோக்கு சார்பினை பெற்றிருக்கும்.
  - அடிவாய் பகுதி மிக மெல்லியதாகவும், மிதமான மாசுமட்டும் அமைய வேண்டும்.
  - அடிவாய், உமிழ்வாய் மற்றும் ஏற்பி பகுதிகள் சமமான மாசுப்பொருள் அடர்த்திகளோடு அமைய வேண்டும்.
  - அடிவாய், உமிழ்வாய் மற்றும் ஏற்பி பகுதிகள் சமமான உருவளவினை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
4. கோபுரம் ஒன்றின் உச்சியிலிருந்து, ஓரு பந்து, 20 m/s எனும் திசை வேகத்தில் கீழ்நோக்கி செங்குத்தாக எறியப்படுகிறது. அது, சிறிது நேரத்திற்குப்பிறகு 80 m/s என்ற திசை வேகத்தில் தரையைத் தொடுகிறது, எனில் கோபுரத்தின் உயரம் : ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )
- 320 m
  - 300 m
  - 360 m
  - 340 m

5. ஓர் இடைமுகத்திம் ப்ரூஸ்டர் கோணம்,  $i_b$  அமையவேண்டிய மதிப்பு :
- $45^\circ < i_b < 90^\circ$
  - $i_b = 90^\circ$
  - $0^\circ < i_b < 30^\circ$
  - $30^\circ < i_b < 45^\circ$
6. காட்டப்பட்டுள்ள வாதியல் மின்சுற்றிற்கான மெய் அட்டவணை என்பது :
- 
- | (1) | A | B | Y |
|-----|---|---|---|
| 0   | 0 | 1 |   |
| 0   | 1 | 1 |   |
| 1   | 0 | 1 |   |
| 1   | 1 | 0 |   |
- | (2) | A | B | Y |
|-----|---|---|---|
| 0   | 0 | 1 |   |
| 0   | 1 | 0 |   |
| 1   | 0 | 0 |   |
| 1   | 1 | 0 |   |
- | (3) | A | B | Y |
|-----|---|---|---|
| 0   | 0 | 0 |   |
| 0   | 1 | 0 |   |
| 1   | 0 | 0 |   |
| 1   | 1 | 1 |   |
- | (4) | A | B | Y |
|-----|---|---|---|
| 0   | 0 | 0 |   |
| 0   | 1 | 1 |   |
| 1   | 0 | 1 |   |
| 1   | 1 | 1 |   |
7. எதிர்க்குறி வெப்ப மின்தடை எண் கொண்ட திண்மங்கள் என்பன :
- குறைகடத்திகள் மட்டும்
  - மின்காப்புப் பொருட்கள் மற்றும் குறைகடத்திகள்
  - உலோகங்கள்
  - மின்காப்புப் பொருட்கள் மட்டும்
8. ஓர் p-n சந்தி டயோடினது இயக்கமில்லாப் பகுதியின் அகலம் அதிகரிப்பது என்பது இதனால் ஏற்படுகிறது :
- முன்னோக்குச் சார்பு மற்றும் பின்னோக்குச் சார்பு ஆகிய இரண்டும்
  - முன்னோக்கு மின்னோட்ட அதிகரிப்பு
  - முன்னோக்குச் சார்பு மட்டும்
  - பின்னோக்குச் சார்பு மட்டும்

9. தகைவு என்பதன் பரிமாணங்கள் :

- (1)  $[ML^0T^{-2}]$
- (2)  $[ML^{-1}T^{-2}]$
- (3)  $[MLT^{-2}]$
- (4)  $[ML^2T^{-2}]$

10. தனிச்சிறப்பு மிக்க இலக்கங்களை கருத்தில் கொள்ளுகையில்,  $9.99\text{ m} - 0.0099\text{ m}$  என்பதன் மதிப்பு யாது ?

- (1)  $9.980\text{ m}$
- (2)  $9.9\text{ m}$
- (3)  $9.9801\text{ m}$
- (4)  $9.98\text{ m}$

11. ஒரே பொருளாலான, கிடார் ஒன்றின் A மற்றும் B ஆகிய இரு நரம்புகள் சிறிதளவு சுருதியில் வேறுபடுகின்றன மற்றும் அவை  $6\text{ Hz}$ , அதிர்வெண் கொண்ட விம்மல்களை ஏற்படுத்துகின்றன. B -யில் உள்ள இழுவிசை சிறிதளவு குறைக்கப்படும் போது, விம்மல் அதிர்வெண்  $7\text{ Hz}$  ஆக அதிகரிக்கிறது. A -யினது அதிர்வெண்,  $530\text{ Hz}$  எனில், B -யினது தொடக்க அதிர்வெண் மதிப்பு என்பது :

- (1)  $536\text{ Hz}$
- (2)  $537\text{ Hz}$
- (3)  $523\text{ Hz}$
- (4)  $524\text{ Hz}$

12. (A எனும் முப்பட்டகக்கோணம் கொண்ட) ஒரு குறுங்கோண முப்பட்டகத்தின் ஒரு பரப்பில், ஓர் ஒளிக்கத்திரானது,  $i$  எனும் வீழ்கோணத்தில் விழுகிறது. மேலும் அது எதிர்ப்பக்க பரப்பு வழியாக செங்குத்தாக வெளியேறுகிறது. முப்பட்டக பொருளின் ஒளி விலகல் என்,  $\mu$ , எனில், வீழ் கோணம் ஏற்குறைய சமமாக இருப்பது :

- (1)  $\mu\text{A}$
- (2)  $\frac{\mu\text{A}}{2}$
- (3)  $\frac{\text{A}}{2\mu}$
- (4)  $\frac{2\text{A}}{\mu}$

13. காற்றினை ஊடகமாகப் பெற்றுள்ள ஓர் இணைதட்டு மின்தேக்கியினது, மின்தேக்குதிறன்,  $6\text{ }\mu\text{F}$  ஆகும். மின்கடத்தாப்பொருள் ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்துவதால், அதன் மின்தேக்குதிறன்,  $30\text{ }\mu\text{F}$  என்று ஆகிறது. ஊடகத்தின் அனுமதித்திறனானது :

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

- (1)  $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (2)  $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (3)  $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (4)  $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

14.  $1\text{ m}$  நீளம் கொண்ட, ஒதுக்கத்தக்க நிறை கொண்டதிட தண்டு ஒன்றின் இரு முனைகளில், முறையே  $5\text{ kg}$  மற்றும்  $10\text{ kg}$  நிறை கொண்ட இரு துகள்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.  $5\text{ kg}$  துகளிலிலிருந்து, ஒருங்கின்து நிறை மையம் அமைந்துள்ள தொலைவு, (ஏற்குறைய) :

- (1)  $67\text{ cm}$
- (2)  $80\text{ cm}$
- (3)  $33\text{ cm}$
- (4)  $50\text{ cm}$

15. ஒரு திருகு அளவி,  $0.01\text{ mm}$  எனும் மீச்சிற்றளவினையும், மேலும் தனது வட்ட அளவுகோலில்  $50$  பிரிவுகளையும் பெற்றுள்ளது. அத்திருகு அளவியின், புரி என்பது :

- (1)  $0.5\text{ mm}$
- (2)  $1.0\text{ mm}$
- (3)  $0.01\text{ mm}$
- (4)  $0.25\text{ mm}$

16. யங்கினது இரட்டைப் பிளவுச் சோதனையில், ஒரியல்பு மூலங்களுக்கிடையிலான இடைவெளி பாதியாக்கப்பட்டு, ஒரியல்பு மூலங்களிலிருந்து திரையினது தொலைஇரட்டிப்பாக்கப் படுகிறது எனில், பட்டைவரி அகலம் :

- (1) நான்கு மடங்காகும்
- (2) நான்கில் ஒரு பங்காகும்
- (3) இரட்டிப்பாகும்
- (4) பாதியாகும்


17. 599 எனும் ஏற்புத்திறனுடைய ஓர் இரும்புத் தண்டு,  $1200 \text{ A m}^{-1}$  எனும் காந்தமாக்கு புலத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. தண்டு செய்யப்பட்ட பொருளின் உட்புகுதிறன் என்பது : ( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ )
- $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
  - $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
  - $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
  - $8.0 \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
18. ஒரு மின்காந்த அலையினது செறிவுக்கு, அதன் மின்புல மற்றும் காந்தப்புலக் கூறுகள் அளிக்கும் பங்களிப்புகளின் விகிதமானது :
- $(c = EM)$
- அலையினது வேகம்)
- $1 : c$
  - $1 : c^2$
  - $c : 1$
  - $1 : 1$
19. சீரிசை இயக்கத்திலுள்ள துகள் ஒன்றின் இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் முடுக்கம் ஆகியவற்றிற் கிடையிலான கட்ட வேறுபாடு என்பது :
- $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
  - சுழி
  - $\pi \text{ rad}$
  - $\frac{3\pi}{2} \text{ rad}$
20. நிலையாக பொருத்தப்பட்டுள்ள தாங்கி ஒன்றில், L நீளம் மற்றும் A, குறுக்குவெட்டு பரப்பு கொண்ட கம்பி ஒன்று தொங்கவிடப் பட்டுள்ளது. M எனும் நிறை, அதன் கட்டற்ற முனையிலிருந்து தொங்கவிடப்படும் போது, கம்பியின் நீளம், L<sub>1</sub> என்று மாறுகிறது எனில், யங்கின் குணகத்திற்கான கோவை என்பது :
- $\frac{MgL}{AL_1}$
  - $\frac{MgL}{A(L_1 - L)}$
  - $\frac{MgL_1}{AL}$
  - $\frac{Mg(L_1 - L)}{AL}$

21. மூலக்கூறு விட்டம், d மற்றும் எண் அடர்த்தி n கொண்ட வாயு ஒன்றின் சராசரி மோதலிடை தூரத்தினை இவ்வாறு வெளிப்படுத்த முடியும் :
- $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi d^2}$
  - $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$
  - $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d}$
  - $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$
22. ஒரு பொருளது 0.5 g -ற்கான ஆற்றல் சமன் என்பது :
- $1.5 \times 10^{13} \text{ J}$
  - $0.5 \times 10^{13} \text{ J}$
  - $4.5 \times 10^{16} \text{ J}$
  - $4.5 \times 10^{13} \text{ J}$
23. V வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு இடையே, ஓர் எலக்ட்ரான் ஓய்விலிருந்து முடுக்கப்படுகிறது. எலக்ட்ரானது ஒ-ப்ராக்லி அலை நீளம்,  $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$  எனில், மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது :
- $10^3 \text{ V}$
  - $10^4 \text{ V}$
  - $10 \text{ V}$
  - $10^2 \text{ V}$
24. ஒரு சிறிய மின் இருமுனை,  $16 \times 10^{-9} \text{ C m}$  எனும் இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றுள்ளது. இருமுனை அச்சோடு  $60^\circ$  எனும் கோணத்தினை மேற்கொண்டுள்ள ஒரு கோட்டில், இருமுனை மையத்திலிருந்து 0.6 m தூரத்தில் அமைந்துள்ளதோரு புள்ளியில் இருமுனையினால் ஏற்படும் மின்னழுத்த மதிப்பு என்பது :  $\left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$
- 400 V
  - சுழி
  - 50 V
  - 200 V
25. ஒரு  $40 \mu\text{F}$  மின்தேக்கி, 200 V மற்றும் 50 Hz ac மின் அளிப்பானோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சுற்றிலுள்ள மின்னோட்டத்தினது rms மதிப்பு ஏற்குறைய :
- 2.5 A
  - 25.1 A
  - 1.7 A
  - 2.05 A

26. ஒற்றையனு வாயு ஓன்றின் சராசரி வெப்பவியல் ஆற்றல், என்பது : ( $k_B$  என்பது போல்ஸ்ட் மென் மாறிலி மற்றும்  $T$ , தனி வெப்பநிலை)

- (1)  $\frac{5}{2} k_B T$
- (2)  $\frac{7}{2} k_B T$
- (3)  $\frac{1}{2} k_B T$
- (4)  $\frac{3}{2} k_B T$

27. ஒரு நிறையில்லா கம்பியின் முனைகளில் 4 kg மற்றும் 6 kg நிறை கொண்ட இரு பொருட்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. கம்பி கடந்துசெல்லும் இழுவை (pulley), உராய்வற்று. (படத்தில் காண்க). புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தினை (g) பொருந்த, ஒருங்கிணது முடுக்கம் என்பது :




- (1)  $g/5$
- (2)  $g/10$
- (3)  $g$
- (4)  $g/2$

28. ஒரு விண்மீனிலிருந்து, 600 nm அலைநீளம் கொண்ட ஒளி வருகிறது என அனுமானிக்க. 2 m விட்டம் கொண்ட பொருளாருகு வில்லையை கொண்ட தொலைநோக்கியினது பகுதிற்கு வரம்பு என்பது :
- (1)  $7.32 \times 10^{-7}$  rad
  - (2)  $6.00 \times 10^{-7}$  rad
  - (3)  $3.66 \times 10^{-7}$  rad
  - (4)  $1.83 \times 10^{-7}$  rad

29. 249 kPa, அழுத்தம் மற்றும்  $27^\circ\text{C}$  வெப்பநிலையிலுள்ள கூஹ்ட்ரஜன் வாயுவினை, ஒரு உருளை கொண்டுள்ளது. அதன் அடர்த்தி என்பது : ( $R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )

- (1)  $0.1 \text{ kg/m}^3$
- (2)  $0.02 \text{ kg/m}^3$
- (3)  $0.5 \text{ kg/m}^3$
- (4)  $0.2 \text{ kg/m}^3$





30. ஒரு மின்தடையினது நிறக்குறியீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



மின்தடை மற்றும் சுகிப்புத்தன்மை ஆகிய-வற்றின் மதிப்புகள், முறையே :

- (1)  $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (2)  $470 \Omega, 5\%$
- (3)  $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (4)  $47 \text{ k}\Omega, 10\%$

31. பின் வரும் வரைபடங்களில், தாமிரத்தின் மின்தடையெண் ( $\rho$ ) வெப்பநிலை ( $T$ ) -யோடு அடையும் வேறுபாட்டை உணர்த்துவது எது ?



32. சம கொள்ளலுடைய பெற்றுள்ள இரு உருளைகள் A மற்றும் B, ஒன்றோடொன்று ஓர் அடைப்பான் வழியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. A, திட்ட வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில், நல்லியல்பு வாயு ஒன்றினைக் கொண்டுள்ளது. B, முழுவதுமாக காலியாக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பு முழுவதும் வெப்பக்காப்பிடப் பட்டுள்ளது. அடைப்பான், விரைவாக திறக்கப் படுகிறது. இந்த நிகழ்வு, இந்த வகையைச் சார்ந்தது :
- மாறா பருமம்
  - மாறா அழுத்தம்
  - மாறா வெப்பநிலை
  - வெப்ப மாற்றீடற்றது
33.  $^{235}_{92}\text{U}$  எனும் யுரேனிய ஐஸோடோப், நியூட்ரான் கொண்டு தாக்கப்படும் போது,  $^{36}_{36}\text{Kr}$  மற்றும் மூன்று நியூட்ரானோடு உருவாக்கப்படுவது :
- $^{101}_{36}\text{Kr}$
  - $^{103}_{36}\text{Kr}$
  - $^{144}_{56}\text{Ba}$
  - $^{91}_{40}\text{Zr}$
34. ஒரு மீட்டர் சமன்சுற்றின் இடது இடைவெளியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதொரு மின்தடைக்கம்பி, வலது இடைவெளியில் உள்ள  $10\ \Omega$  மின்தடையோடு சமன் செய்து கொள்ளும் புள்ளி, சமன்சுற்றுக் கம்பியினை,  $3 : 2$  என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கிறது. மின்தடை கம்பியின் நீளம்,  $1.5\ \text{m}$  எனில், மின்தடை கம்பியின்  $1\ \Omega$ -மிற்கான நீளம் என்பது :
- $1.5 \times 10^{-1}\ \text{m}$
  - $1.5 \times 10^{-2}\ \text{m}$
  - $1.0 \times 10^{-2}\ \text{m}$
  - $1.0 \times 10^{-1}\ \text{m}$
35.  $3 \times 10^{-10}\ \text{Vm}^{-1}$  மதிப்புடைய மின்புலத்தில்,  $7.5 \times 10^{-4}\ \text{m s}^{-1}$  எனும் நகர்வு திசைவேக-முடைய ஒரு மின்னுட்டப்பட்ட துகள் பெறும் நகர்வு திறன்,  $\text{m}^2\ \text{V}^{-1}\ \text{s}^{-1}$  என்ற அலகில் :
- $2.5 \times 10^{-6}$
  - $2.25 \times 10^{-15}$
  - $2.25 \times 10^{15}$
  - $2.5 \times 10^6$

36.  $20\ \text{W/cm}^2$  எனும் சராசரி பாய அடர்த்தி கொண்ட ஒளி,  $20\ \text{cm}^2$  பரப்பளவு உடைய எதிரொளிப் பற்ற பரப்பின் மீது செங்குத்து வீழலில் விழுகிறது. 1 நிமிட கால இடைவெளியில், பரப்பால் ஏற்கப்பட்ட ஆற்றல் என்பது :
- $24 \times 10^3\ \text{J}$
  - $48 \times 10^3\ \text{J}$
  - $10 \times 10^3\ \text{J}$
  - $12 \times 10^3\ \text{J}$
37. போர் மாதிரி, பின்வருவனவற்றில் எதற்கு பொருந்தமற்றதாக அமையும் ?
- ட்யூட்ரான் அணு
  - ஒற்றை அயனியாக்கமடைந்த நியான் அணு ( $\text{Ne}^+$ )
  - ஷெட்ரஜன் அணு
  - ஒற்றை அயனியாக்கமடைந்த ஹீலியம் அணு ( $\text{He}^+$ )
38. சீராகப் பரப்பப்பட்டுள்ள  $3.2 \times 10^{-7}\ \text{C}$  எனும் மின்சமையினை,  $10\ \text{cm}$  ஆரம் கொண்டதொரு கோள் வடிவு கடத்தி பெற்றுள்ளது. கோளத்தின் மையத்திலிருந்து,  $15\ \text{cm}$  தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியில் உள்ள மின்புலத்தின் எண் மதிப்பு யாது ?  $\left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9\ \text{N m}^2/\text{C}^2 \right)$
- $1.28 \times 10^6\ \text{N/C}$
  - $1.28 \times 10^7\ \text{N/C}$
  - $1.28 \times 10^4\ \text{N/C}$
  - $1.28 \times 10^5\ \text{N/C}$
39. DNA-வில் உள்ள பிணைப்பு ஒன்றினை முறிக்க தேவையான ஆற்றல்,  $10^{-20}\ \text{J}$  ஆகும். eV-யில் இதன் மதிப்பு, ஏற்குறைய :
- 0.06
  - 0.006
  - 6
  - 0.6
40.  $0.2\ \text{m}^3$  பருமன் கொண்டதொரு குறிப்பிட்ட வெளிப்பகுதியில், எங்கும்,  $5\ \text{V}$  மின்னழுத்தம் காணப்படுகிறது. இப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மின்புலமதிப்பானது :
- 1 N/C
  - 5 N/C
  - சமி
  - 0.5 N/C

41. 50 cm நீளமும், 100 சற்றுகளையும் உடையதொரு நீள்வரிச்சுருள்,  $2.5\text{ A}$  மின்னோட்டத் தினை தாங்கிச் செல்கிறது. நீள் வரிச்சுருளின் மையத்தில் உள்ள காந்தப்புலம் என்பது : ( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ )
- $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$
  - $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$
  - $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
  - $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$
42. பயன்தொடக்க அதிர்வெண்ணின் 1.5 மடங்கு அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி, ஒரு ஒளி உணர்வு நுட்ப பொருள்மீது விழுகிறது. அதிர்வெண் பாதியாகவும், செறிவு இரட்டிப்பாகவும் ஆக்கப்படும்போது, ஒளிமின்னோட்டம் என்னவாகும் ?
- நான்கில் ஒரு பங்காகும்
  - சமியாகும்
  - இரட்டிப்பாகும்
  - நான்கு மடங்காகும்
43.  $r$  ஆரம் கொண்டதொரு நுண்துளை குழாய், நீரில் அமிழ்த்தப் படுகிறது. அதில் நீரானது,  $h$  உயரம் எழும்புகிறது, நுண்துளையிலுள்ள நீரது நிறை,  $5\text{ g}$  ஆகும்.  $2r$ , ஆரம் கொண்ட மற்றொரு நுண்துளைகுழாய் நீரில் அமிழ்த்தப் படுகிறது. இந்தக்குழாயில் எழும்பக் கூடிய நீரது நிறை என்பது :
- 10.0 g
  - 20.0 g
  - 2.5 g
  - 5.0 g
44. புவியினது பரப்பில், ஒரு பொருள்,  $72\text{ N}$  என்ற எடையைப் பெற்றுள்ளது. புவியினது ஆரத்தின் பாதிக்குச் சமமான உயரத்தில், அதன் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை, யாது ?
- 30 N
  - 24 N
  - 48 N
  - 32 N

45. ஒரு தொடர் LCR மின்சுற்று, ஓர்  $ac$  மின்னமுத்து மூலத்தோடு இணைக்கப் பட்டுள்ளது. மின்சுற்றிலிருந்து,  $I$  விலக்கப்படும் போது, மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னமுத்தத்திற்கிடையிலான கட்டவேறுபாடு,  $\frac{\pi}{3}$  ஆகும். இதற்கு பதிலாக,  $C$  மின்சுற்றிலிருந்து விலக்கப்படின், மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னமுத்தத்திற்கிடையிலான கட்டவேறுபாடு, மீண்டும்  $\frac{\pi}{3}$  என்றமைகிறது. மின்சுற்றினது திறன் காரணி என்பது :
- 1.0
  - 1.0
  - சமி
  - 0.5
46. அரை கீழ்மட்ட சூலகப்பை இதில் உள்ளது :
- சூரியகாந்தி
  - பிளம்
  - கத்தரி
  - கடுகு
47. வறையறு நொதிகள் குறித்து தவறான கூற்று எது?
- மரபு பொறியியலில் அவை பயன் படுகிறது.
  - ஒட்டும் முனைகள் டி.என்.ஏ. கைகேஸ் மூலம் இணைக்கப்படுகிறது.
  - ஒவ்வொரு வறையறு நொதியும் டி.என்.ஏ. -வின் முழு நீளத்தை ஆராய்கிறது.
  - பாலின்ட்ரோமிக் பகுதிகளில் டி.என்.ஏ. இழைகளை அவை வெட்டுகிறது.
48. ஆக்சிஜன் கடத்தல் குறித்த தவறான கூற்று எது ?
- நுண்ணறையில் உயர்  $H^+$  அடர்வு ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் உருவாதலுக்கு உதவுகிறது.
  - நுண்ணறையில் குறை  $pCO_2$  அக்சி ஹீமோகுளோபின் உருவாதலுக்கு உதவுகிறது.
  - ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினோடு இணைவது ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தத் தோடு தொடர்புடையது.
  - கார்பன் டை ஆக்சைடின் பகுதி அழுத்தம் ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினோடு இணைதலில் தலையிடும்.

49. ஆகாயத் தாமரை மற்றும் நீர் அல்லி ஆகியவற்றில் மகரந்தச் சேர்க்கை இவற்றின் மூலம் நடைபெறுகிறது.
- காற்று மற்றும் நீர்
  - பூச்சிகள் மற்றும் நீர்
  - பூச்சிகள் அல்லது காற்று
  - நீர் ஓட்டங்கள் மட்டும்
50. இரண்டு கார இணைகளுக்கிடையில் உள்ள தூரம்  $0.34 \text{ nm}$  மற்றும் இயல்பு பாலூட்ட செல்வின் மொத்த கார இணைகள்  $6.6 \times 10^9 \text{ bp}$  எனில், டி.என்.ஏ. -வின் நீளம் தோராயமாக எது?
- $2.2 \text{ மீட்டர்கள்}$
  - $2.7 \text{ மீட்டர்கள்}$
  - $2.0 \text{ மீட்டர்கள்}$
  - $2.5 \text{ மீட்டர்கள்}$
51. சினாப்டினிமல் தொகுப்பு எந்த நிலையில் கலைந்து கரையத் தொடங்குகிறது?
- டிப்ளோடன்
  - லெப்டோடன்
  - பாக்கிடன்
  - சைக்கோட்டன்
52. தாவரங்களில் இன்றியமையாத மூலங்கள் மற்றும் அவற்றின் செயல்கள் குறித்த கீழ்க்கண்டவற்றை பொருத்துக.
- இரும்பு (i) ஒளிசார் நீர் பகுப்பு
  - துத்தநாகம் (ii) மகரந்தத்துகள் முளைத்தல்
  - போரான் (iii) குளோரோபில் உயிர்ம வழி உருவாக்கத்தில் தேவைப் படுவது
  - மாங்கனீசு (iv) IAA உயிர்மவழி உருவாக்கம்
- சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும்.**
- |     |       |       |      |
|-----|-------|-------|------|
| (a) | (b)   | (c)   | (d)  |
| (1) | (iii) | (iv)  | (ii) |
| (2) | (iv)  | (i)   | (ii) |
| (3) | (ii)  | (i)   | (iv) |
| (4) | (iv)  | (iii) | (ii) |
53. சூவின் உடலம் பிழுனிகினில் இணைந்து காணப்படும் பகுதி :
- நிழுசெல்லஸ் (சூல் திசு)
  - சலாசா
  - வைலம் (சூல் தழும்பு)
  - சூல் துளை

54. ஒரு சூழ்நிலை மண்டலத்தின் மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் மற்றும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் ஆகியவை தொடர்புடைய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் **சரியானது** எது?
- மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் மற்றும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் ஆகியவை ஒன்றேயாகும்.
  - மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் மற்றும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் ஆகியவற்றின் இடையே எந்தத் தொடர்பும் இல்லை.
  - நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித் திறனை விட, மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் எப்போதும் குறைவாக உள்ளது.
  - மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் எப்போதும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித் திறனை விட அதிகமாக உள்ளது.
55. மனிதர்கள் செயல்பாட்டால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் கீழ்க்கண்ட எவற்றில் பரிணாமமடைந்தன?
- காலபகோஸ் தீவில் உள்ள டார்வின் சிட்டுக் குருவிகள்
  - களைச் செடிகளில் களைகொல்லி எதிர்ப்பு யூக்ரேயோட்டுகளில் மருந்துப்-பொருளுக்கு எதிர்ப்பு
  - மனிதன் உருவாக்கிய நாய்கள் போன்ற வீட்டு விலங்கின வகைகள்
  - (b), (c) மற்றும் (d)
  - (d) மட்டும்
  - (a) மட்டும்
  - (a) மற்றும் (c)
56. மனித செரிமான மண்டலம் குறித்த **சரியான கூற்று** எது?
- இலையம் என்பது மிகுந்த சுருங்கிய பகுதி
  - குடல் வால் டியோஷன்த்திலிருந்து தோன்றுகிறது
  - இலையம் சிறு குடலில் திறக்கிறது
  - உணவு பாதையின் உள் படலம் செரோசா என்பது
57. பயறுவகைத் தாவரங்களின் வேர் முண்டுகளில் நைட்ரோஜினேஸ் மூலமாக விணையுக்கப்பட்ட வேதி விணையின் விளைப் பொருள்கள்:
- அம்மோனியா மற்றும் ஆக்லிஜன்
  - அம்மோனியா மற்றும் வைட்ரஜன்
  - அம்மோனியா மட்டும்
  - நைட்ரேட் மட்டும்

- 58.** ஒரு தாவரப் பகுதியின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் கீழ்கண்ட உள்ளமைப்பு பண்புகள் காணப்படுகின்றன :
- கற்றை உறையால் சூழப்பட்ட அதிக எண்ணிக்கையிலான வாஸ்குலார் கற்றைகள் சிதறிக் காணப்படும்.
  - பெரிய அளவிலான, தெறிவான பாரன் கைமாவாலான தளத் திசு.
  - வாஸ்குலார் கற்றைகள் ஒருங்கமைந்தவை மற்றும் மூடியவை.
  - புளோயம் பாரன்கைமா காணப்படவில்லை.
- தாவரத்தின் வகையினையும் அதன் பகுதியையும் கண்டறிக்
- இருவித்திலைத்தாவரத் தண்டு
  - இருவித்திலைத்தாவர வேர்
  - ஒருவித்திலைத்தாவரத் தண்டு
  - ஒருவித்திலைத்தாவர வேர்
- 59.** உடற்குழியற்ற மற்றும் இருபக்க சமச்சீர் கொண்ட விலங்குகளின் தொகுதி எது ?
- அஸ்கெல்மிந்தஸ்
  - அன்னலிடா
  - கேனோஃபோரா
  - தட்டை புழுக்கள்
- 60.** உணவு பாதையிலுள்ள கோப்பை வடிவ செல்கள் எவற்றிலிருந்து மாறியிருக்கிறது ?
- காண்ட்ரோ சைட்டு
  - கூட்டு எபிதீவிய செல்கள்
  - கட்டை வடிவ எபிதீவிய செல்கள்
  - தூண்வடிவ எபிதீவிய செல்கள்
- 61.** கீழ்கண்டவற்றுள் ஓர் இனத் தொகையுடன் தொடர்பில்லாதது எது ?
- இறப்பு வீதம்
  - சிற்றினங்களின் உறவு முறை
  - பால் விகிதம்
  - பிறப்பு வீதம்
- 62.** பரினாமம் குறித்த கருவியல் சான்றினை தவறென நிருபித்தவர் :
- சார்லஸ் டார்வின்
  - ஓபாரின்
  - கார்ல் ஏர்ன்ஸ்ட் வான் பேர்
  - ஆல்பிரட் வாலஸ்

- 63.** விலங்குகளில் அதிக அளவு காணப்படும் புரதம் எது ?
- லெக்டின்
  - இன்சலின்
  - ஹீமோகுளோபின்
  - கொல்லாஜன்
- 64.** கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.
- | <b>தொகுதி - I</b>         | <b>தொகுதி - II</b>                                       |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|
| (a) ஈசினோ-<br>ஃபில்கள்    | (i) தடைகாப்பு<br>துலங்கல்                                |            |            |
| (b) பேசோஃபில்கள்          | (ii) செல்<br>விழுங்குதல்                                 |            |            |
| (c) நியூட்ரோ-<br>ஃபில்கள் | (iii) ஹிஸ்டமினேஸ்<br>அழிக்கும்<br>நொதிகளை<br>விடுவித்தல் |            |            |
| (d) லிம்போ-<br>சைட்டுகள்  | (iv) ஹிஸ்டமின்<br>கொண்ட<br>துகள்களை<br>விடுவித்தல்       |            |            |
| <b>(a)</b>                | <b>(b)</b>   | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1) (i)                   | (ii)   | (iv)       | (iii)      |
| (2) (ii)                  | (i)  | (iii)      | (iv)       |
| (3) (iii)                 | (iv)   | (ii)       | (i)        |
| (4) (iv)                  | (i)  | (ii)       | (iii)      |
- 65.** கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிளிலிருந்து அண்ட செல் வெளியாதலுக்கு ஹார்மோனின் எந்த நிலை உதவுகிறது ?
- LH - இன் குறை அடர்வு
  - FSH - இன் குறை அடர்வு
  - எஸ்டிரஜனின் உயர் அடர்வு
  - புரோஜெஸ்டிரானின் உயர் அடர்வு
- 66.** கடத்தியில் இணைக்கப்பட்ட DNA -வின் படி எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் தொடர்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன :
- பாவின்ட்ரோம் தொடர்
  - உணர்தல் தளம்
  - தெரிவுசெய்யக்கூடிய குறியீடு
  - Ori தளம்

67. தாவரத்தின் பாகங்கள், ஒன்றின் உள் மற்றொன்று என இரு தலைமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது :

- (a) மகரந்தப்பையின் உள்ளே மகரந்தத் துகள்கள்
- (b) இரண்டு ஆண் கேமீட்டுகள் உடைய முளைத்த மகரந்தத் துகள்கள்
- (c) கனியின் உள்ளே விதை
- (d) சூலின் உள்ளே சூலிப்பை
- (1) (c) மற்றும் (d)
- (2) (a) மற்றும் (d)
- (3) (a) மட்டும்
- (4) (a), (b) மற்றும் (c)

68. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

### தொகுதி - I

- (a) கிளாஸ்டிரிடியம் (i) சைக்ளோஸ் பூட்டிலிக்கம்
- (b) டிரைக்கோடெர்மா (ii) பியூட்ரிக் பாலிஸ்போரம்
- (c) மோனாஸ்கஸ் (iii) சிட்ரிக் அமிலம் பர்டுரியஸ்
- (d) ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் (iv) இரத்த நெந்கர் கொலஸ்டிரால் குறைக்கும் காரணி

### (a) (b) (c) (d)

- (1) (i) (ii) (iv) (iii)
- (2) (iv) (iii) (ii) (i)
- (3) (iii) (iv) (ii) (i)
- (4) (ii) (i) (iv) (iii)

69. அடிதண்டிலிருந்து தோன்றும் வேர்கள் :

- (1) தூண் வேர்கள்
- (2) பக்கவாட்டு வேர்கள்
- (3) சல்வி வேர்கள்
- (4) முதல் நிலை வேர்கள்

70. ABO இரத்த வகையை கட்டுப்படுத்தும் 'I' ஜீன் குறித்த தவறான கூற்று எது ?

- (1) 'I<sup>A</sup>' மற்றும் 'I<sup>B</sup>' இரண்டும் இருந்தால், ஓரே வகையான சர்க்கரையை வெளிபடுத்துகிறது.
- (2) 'I' அலீல் எந்த சர்க்கரையையும் உருவாக்குவதில்லை.
- (3) ஜீன் 'I' மூன்று அலீல்கள் கொண்டுள்ளது.
- (4) ஒரு நபரிடத்தில் மூன்றில் இரண்டு அலீல்கள் மட்டும் காணப்படும்.

71. நீர்த்த சிறுநீர் உருவாதலை தடுக்கும் காரணி எது ?

- (1) ஏட்ரியல் நாட்ரியூர்ட்டிக் காரணி இரத்த நாள சுருக்கியாக செயல்படுகிறது
- (2) JG செல்கள் ரெனின் சுரத்தலை குறைக்கிறது
- (3) குறைவான ADH சுரக்கப்படுவதால் அதிக நீர் மீள் உறிஞ்சப்படல்
- (4) ஆல்டோஸ்டிரோன் விளைவால் சிறு நீர் குழல்களில் Na<sup>+</sup> மற்றும் நீர் மீள் உறிஞ்சப்படுதல்

72. எதனைக் கட்டுப்படுத்த 1987-ல் மாண்ட்ரியல் பிரிகடனம் கையொப்பமிடப்பட்டது ?

- (1) பசுமை இல்ல வாயுக்களின் வெளியீடு
- (2) மின்னணு கழிவுகளை அகற்றுதல்
- (3) மரபு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்களை ஒரு நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டிற்கு கொண்டு செல்லுதல்
- (4) ஓசோனை அழிக்கும் பொருட்களின் வெளியீடு

73. இரண்டாம் நிலை அண்ட செல்வில் குன்றல் பகுப்பு எந்த நிலையில் நிறைவடைகிறது ?

- (1) கரு உருவான பிறகு
- (2) விந்தனு மற்றும் அண்ட செல் இணையும் நேரத்தில்
- (3) அண்ட வெளியாதலுக்கு முன்
- (4) புணர்ச்சி நடை பெறும் நேரத்தில்

74. ஹிசார்டேல் என்ற புதிய வகை செம்மறி ஆடு பிக்கானரி ஈவுகள் மற்றும் மரினோ ராம்களை எவ்வகை கலப்பு மேற்கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது ?

- (1) குறுக்கு கலப்பு
- (2) உள் கலப்பு
- (3) வெளி கலப்பு
- (4) திடீர் மாற்ற கலப்பு

75. கரப்பான் பூச்சியின் தலையை நீக்கினால், அது சிறிது காலம் வாழும். எதனால்?

- (1) தலையில் நரம்பு மண்டலத்தின் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமள்ளது. மீதமுள்ளவை உடலின் வயிற்றுப் பகுதியில் உள்ளது
- (2) தலையில் 1/3 நரம்பு மண்டலம் உள்ளது. மீதமுள்ளவை உடலின் முதுகு புறத்தில் உள்ளது
- (3) கரப்பான் பூச்சியின் உணவு பாதை மேல் நரம்பனுத்திற்குள் வயிற்றின் கீழ் பகுதியில் அமைந்துள்ளது
- (4) கரப்பான் பூச்சியில் நரம்பு மண்டலம் காணப்படாது

76. சரியற்ற கூற்றை கண்டறிக.

- (1) சாற்றுக் கட்டையானது இரண்டாம் நிலை சைலத்தின் உட்பகுதி மற்றும் அது வெளிர் நிறத்தில் காணப்படும்.
- (2) வைரக் கட்டையானது டானின்கள், ரெசின்கள், எண்ணெய்கள் மற்றும் பல படிவதால் அடர்ந்த நிறத்தில் உள்ளது.
- (3) வைரக் கட்டை நீரைக் கடத்துவதில்லை ஆனால் உறுதித் தன்மையை அளிக்கிறது.
- (4) சாற்றுக் கட்டை நீர் மற்றும் தனிமங்களை வேரிலிருந்து இலைக்கு கடத்துவதில் பங்கேற்கிறது.

77. முழுவதும் பால் வினை நோய்கள் அடங்கியது எது?

- (1) எய்ட்ஸ், மலேரியா, ஃபைலேரியா
- (2) புற்றுநோய், எய்ட்ஸ், சி.பி.விலிஸ்
- (3) கொனோரியா, சி.பி.விலிஸ், ஜெனிட்டல் ஹெர்பிஸ்
- (4) கொனோரியா, மலேரியா, ஜெனிட்டல் ஹெர்பிஸ்

78. நோய் தடைக்காப்பு குறித்த தவறான கூற்று எது?

- (1) ஆற்றல் மிகு நோய் தடைகாப்பு உடனடியாகவும் முழு துலங்கலை கொடுக்கும்.
- (2) வளர் கரு தாயிடமிருந்து ஆன்டிபாடிகளை பெற்றுக் கொள்ளும். இது மந்தமான நோய்தடைக்காப்புக்கு எடுத்துக் காட்டு.
- (3) உயிர் அல்லது செயலிழந்த ஆன்டிஜென்கள் ஓம்புயிரியில் செலுத்தப் பட்டால் அவை ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கும். இது ஆற்றல் மிகு நோய் தடைகாப்பாகும்.
- (4) ஆன்டிபாடிகளை நேரடியாக செலுத்துதல் மந்தமான நோய் தடைகாப்பாகும்.

79. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

தொகுதி - I	தொகுதி - II
(a) Bt பருத்தி	(i) ஜீன் சிகிச்சை
(b) அடினேசென்	(ii) செல் வகை டிஅமினேஸ் தற்காப்பு குறைபாடு
(c) ஆர்.என்.ஏ.	(iii) ஹெச் ஜி வி இடையீடு தொற்றை கண்டறிதல்
(d) பி.சி.ஆர்.	(iv) பேசில்லஸ் துரின்ஜியன்சிஸ்

- | (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii)  | (iii) | (iv)  |
| (2) | (i)   | (ii)  | (iii) |
| (3) | (iv)  | (i)   | (ii)  |
| (4) | (iii) | (ii)  | (i)   |

80. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது?

- (1) அடினென் மூன்று H-பினைப்புகளின் மூலம் தைமைன் உடன் இணைந்துள்ளது.
- (2) அடினென் தைமைனுடன் இணைவதில்லை.
- (3) அடினென் இரு H-பினைப்புகள் மூலம் தைமைன் உடன் இணைந்துள்ளது.
- (4) அடினென் ஒரு H-பினைப்பின் மூலம் தைமைன் உடன் இணைந்துள்ளது.

81. ராபர்ட் மே -இன் கருத்தின்படி புவியின் சிற்றினப் பன்மயம் சமார் :
- 50 மில்லியன்
  - 7 மில்லியன்
  - 1.5 மில்லியன்
  - 20 மில்லியன்
82. நிகோடின், ஸ்டரிக்னெண், மற்றும் கேஃபைன் போன்ற இரண்டாம் நிலை வளர்சிதைப் பொருட்கள் தாவரங்களால் இதற்காக உற்பத்தி செய்யப் படுகின்றன :
- பாதுகாப்புச் செயல்
  - இனப்பெருக்கத்தின் மீதுள்ள செயற்பாடு
  - ஊட்டச் சத்துக் குறிய திறன்
  - வளர்ச்சி பிரதிபலிப்பு
83. கீழ்கண்ட இணைகளில் ஒருசெல் அல்காக்களின் இணை எது ?
- அன்டீனா மற்றும் வால்வாக்ஸ்
  - குளோவரல்லா மற்றும் ஸ்பைருவினா
  - லாமினேரியா மற்றும் சர்காசம்
  - ஜெலிடியம் மற்றும் கிராசிலேரியா
84. என்டிரோகைனேஸ் என்ற நோதி எதன் மாற்றத்திற்கு உதவுகிறது ?
- கெசினோஜன் → கெசின்
  - பெப்சினோஜன் → பெப்சின்
  - புரதம் → பாலிப்பெப்டைடு
  - டிரிப்சினேஜன் → டிரிப்சின்
85. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>தொகுதி - I</b>                                     | <b>தொகுதி - II</b>           |
| (a) 6 - 15 இணைகள் (i) டிரைகான் செவுள் பிளவுகள்        | (i) டிரைகான் செவுள் பிளவுகள் |
| (b) ஹெட்டிரோ- (ii) வட்ட வாய்கள் செர்கள் வால் துடுப்பு | (ii) வட்ட வாய்கள்            |
| (c) காற்று பை (iii) கான்டிரிக்டீஸ்                    |                              |
| (d) நஷ்க் கொடுக்கு (iv) ஆஸ்டைக்டீஸ்                   |                              |
| <b>(a) (b) (c) (d)</b>                                |                              |
| (1) (iv) (ii) (iii) (i)                               |                              |
| (2) (i) (iv) (iii) (ii)                               |                              |
| (3) (ii) (iii) (iv) (i)                               |                              |
| (4) (iii) (iv) (i) (ii)                               |                              |

86. புற்களின் இலை நுனியில் நீர் திரவ நிலையில் இரவிலும் அதிகாலையிலும் வடிவதற்கு காரணமான நிகழ்வு எது ?
- உள்ளீர்த்தல்
  - பிளாஸ்மா சிதைவு
  - நீராவிப்போக்கு
  - வேர் அழுத்தம்
87. கீழ்கண்ட எது காற்றற்ற சிலட்ஜ் டைஜஸ்டரில் சேர்க்கப்பட்டு தொடர்ந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிகழ்த்தப்படுகிறது ?
- முதல் நிலை சுத்திகரிப்புக்குப்பின் உள்ள கழிவுநீர்
  - செயல்படுத்தப்பட்ட சிலட்ஜ்
  - முதல் நிலை சிலட்ஜ்
  - மிதக்கும் டெப்ரிஸ்கள்
88. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.
- |  |  |
|--|--|
| <b>தொகுதி - I</b>  | <b>தொகுதி - II</b>   |
| (a) மிதக்கும் விலா (i) இரண்டு மற்றும் எழாவது விலா எலும்புகள் | (i) இரண்டு மற்றும் எழாவது விலா எலும்புகளி- டைபில் அமைந்துள்ளது |
| (b) ஆக்ரோமியான் (ii) வியூமரலின் தலை பகுதி                    | (ii) வியூமரலின் தலை பகுதி                                      |
| (c) ஸ்கேப்புலா (iii) கிளாவிக்கிள்                            | (iii) கிளாவிக்கிள்   |
| (d) கிளீனாய்டு குழி (iv) ஸ்டெர்ன்த்- தோடு இணைந்திராது        | (iv) ஸ்டெர்ன்த்- தோடு இணைந்திராது                              |
| <b>(a) (b) (c) (d)</b>                                       |  |
| (1) (iii) (ii) (iv) (i)                                      |  |
| (2) (iv) (iii) (i) (ii)                                      |  |
| (3) (ii) (iv) (i) (iii)                                      |  |
| (4) (i) (iii) (ii) (iv)                                      |  |
89. சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு.
- இன்சலின் கணைய செல்கள் மற்றும் அடிப்போசைட்டுகளுடன் செயல் படுகிறது.
  - இன்சலின் உயர் கிளைசீமியாவோடு தொடர்புடையது.
  - குளுக்கோகார்டிகாய்டுகள் குளுக்கோ நியோ ஜெனிசிஸ்ஸை தூண்டுகிறது.
  - குளுக்ககான் வைப்போ கிளைசீமியா வோடு தொடர்புடையது.

- 90.** சிறுநீரில் கீழ்கண்ட எந்த பொருள் காணப்பட்டால், டயாபிட்டிஸ் மெல்லிட்டலிற்கு அறிகுறியாகும்?
- கீட்டோனூரியா மற்றும் கிளைகோசுரியா
  - சிறுநீர் கற்கள் மற்றும் உயர் கிளைகோசுரியா
  - யுரேமியா மற்றும் கீட்டோனூரியா
  - யுரேமியா மற்றும் சிறுநீர் கற்கள்
- 91.** கீழ்கண்டவற்றுள் விராய்டுகள் குறித்த சரியானது எது?
- அவை புரத உறையுடன் DNA கொண்டுள்ளவை
  - அவை புரத உறையற்று தனித்த DNA கொண்டுள்ளவை
  - அவை புரத உறையுடன் RNA கொண்டுள்ளவை
  - அவை புரத உறையற்று தனித்த RNA கொண்டுள்ளவை
- 92.** ஒரு எதிரிடைப் பண்புக் கூறு தவிர்த்து ஏனையவை ஒத்த எத்தனை ஜோடிப் பண்புகளை மெண்டல் தனித்த தூயவழி பட்டாணித் தாவர வகைகளில் தேர்ந்தெடுத்தார்?
- 14
  - 8
  - 4
  - 2
- 93.** கீழ்கண்டவற்றுள் பூமியின் எப்பகுதிகளில் அதிக அளவில் சிற்றினப் பன்மயம் காணப்படுகிறது?
- இமய மலை
  - அமேசான் காடுகள்
  - இந்தியாவின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை
  - மடகாஸ்கர்

- 94.** கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.
- | <b>தொகுதி - I</b>  | <b>தொகுதி - II</b>                  |            |            |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| (a) பிளாசன்டா      | (i) ஆன்டிராஜன்                      |            |            |
| (b) சோனா           | (ii) மனித கோரியானிக் கொனடோ-டிரோபின் |            |            |
| (c) பல்போ          | (iii) அண்டத்தின் அடுக்கு சுரப்பிகள் |            |            |
| (d) வெடிக் செல்கள் | (iv) பீனிஸை வழவழப்பாக்குதல்         |            |            |
| <b>(a)</b>         | <b>(b)</b>                          | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1)                | (iii)                               | (ii)       | (iv)       |
| (2)                | (ii)                                | (iii)      | (i)        |
| (3)                | (iv)                                | (iii)      | (i)        |
| (4)                | (i)                                 | (iv)       | (ii)       |
- 95.** புல் சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உண்ணூட்ட நிலைகளுடன் சரியான சிற்றின உதாரணங்களைப் பொருத்தவும்.
- நான்காம் உண்ணூட்ட நிலை
  - இரண்டாம் உண்ணூட்ட நிலை
  - முதலாம் உண்ணூட்ட நிலை
  - மூன்றாம் உண்ணூட்ட நிலை
- சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.**
- | <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
|------------|------------|------------|------------|
| (1)        | (iv)       | (iii)      | (ii)       |
| (2)        | (i)        | (ii)       | (iii)      |
| (3)        | (ii)       | (iii)      | (iv)       |
| (4)        | (iii)      | (ii)       | (i)        |
- 96.** பெண்குவின் மற்றும் டால் பினின், பினிப்பர்கள். இதற்கு எடுத்துக்காட்டு :
- தொழிற்சாலை மெலானின் ஆக்கம்
  - இயற்கைத் தேர்வு
  - தழுவிப்பரவல்
  - குவி பரினாமம்

97. சிட்ரிக் அமில சூழற்சியின் ஒரு சூழலின் போது தளப் பொருள் பாஸ்பாரிகரணம் நடைபெறுவதன் எண்ணிக்கை :

- (1) இரண்டு
- (2) மூன்று
- (3) பூஜ்ஜியம்
- (4) ஒன்று

98. கீழ்கண்டவற்றுள் தவறான கூற்று எது ?

- (1) செயல்படு இன்சனில், A மற்றும் B சங்கிலி வைட்ரஜன் பினைப்புகளால் இணைந்திருக்கும்
- (2) மரபு பொறியியல் மூலம் ஈ-கோலையில் இன்சவின் உருவாக்கப்படுகிறது
- (3) மனிதனில் இன்சவின் ஒரு முன்-இன்ச-வினாக உருவாக்கப்படுகிறது
- (4) முன் இன்சவினில் ஒரு கூடுதல் பெப்படைடு, C- பெப்படைடு உள்ளது

99. கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- |                    |       |               |
|--------------------|-------|---------------|
| (a) கார்டை உறுப்பு | (i)   | நடு காது      |
|                    |       | பகுதியை       |
|                    |       | தொண்டை-       |
|                    |       | யோடு          |
|                    |       | இணைக்கிறது    |
| (b) காக்ஸியா       | (ii)  | லாபிரிந்தின்  |
|                    |       | சுருண்ட பகுதி |
| (c) ஷுஸ்டெசியன்    | (iii) | நீள்வட்ட      |
| குழல்              |       | பலகணியோடு     |
|                    |       | இணைந்துள்ளது  |
| (d) ஸ்டேபிள்       | (iv)  | பேசில்லார்    |
|                    |       | சவ்வில்       |
|                    |       | அமைந்துள்ளது  |

**(a) (b) (c) (d)**

- (1) (iv) (ii) (i) (iii)
- (2) (i) (ii) (iv) (iii)
- (3) (ii) (iii) (i) (iv)
- (4) (iii) (i) (iv) (ii)

100. சில பகுப்புறும் செல்கள் செல் சூழற்சியில் இருந்து விடுபட்டு செயலற் ற வளர்வடக்க நிலைக்கு செல்கின்றன. இதற்கு அமைதி நிலை ( $G_0$ ) என அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்வு எதன் முழுவில் நடைபெறும் ?

- (1) S நிலை
- (2)  $G_2$  நிலை
- (3) M நிலை
- (4)  $G_1$  நிலை

101. வளர்ச்சி நிலை அதிகமாக இருப்பது எப்போது ?

- (1) முதிர்ந்து உதிர்தல்
- (2) உறக்க நிலை
- (3) அடுக்கேற்றப் பருவம்
- (4) ஒடுக்கப் பருவம்

102. ஒரு இயல்பு ECG -யில் QRS கூட்டமைப்பு எதனைக்குறிக்கின்றது ?

- (1) வெண்டிரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க நீக்கம்
- (2) வெண்டிரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க மீட்சி
- (3) ஆரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க மீட்சி
- (4) ஆரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க நீக்கம்

103. பேசில்லஸ் தூரின்ஜியன்சிஸ்ஸின் நச்ச ஜீனை உட்செலுத்தி உருவாக்கப்பட்ட Bt பஞ்ச வகை எதற்கு எதிர்ப்பு ?

- (1) தாவர நெமட்டோடுகள்
- (2) பூச்சி கொன்று திண்ணிகள்
- (3) பூச்சி தீங்குயிரிகள்
- (4) பூஞ்சை நோய்கள்

104. எந்த தொழில் நுட்பத்தில் கருவற இயலாத பெண்களுக்கு மகப்பேறுக்காக கரு மாற்றம் செய்யப்படுகிறது ?

- (1) ICSI மற்றும் ZIFT
- (2) GIFT மற்றும் ICSI
- (3) ZIFT மற்றும் IUT
- (4) GIFT மற்றும் ZIFT

- 105.** ஃபுளோரிடியன் தரசம் இதற்கு இணையான அமைப்பைக் கொண்டது.
- மான்னிடால் மற்றும் ஆல்லின்
  - லாமினாரின் மற்றும் செல்லுலோஸ்
  - தரசம் மற்றும் செல்லுலோஸ்
  - அமைலோ பெக்டின் மற்றும் கிளை-கோஜன்
- 106.** கரும்புப் பயிரின் மீது தெளிக்கும் போது தண்டின் நீளத்தை அதிகரித்து கரும்பின் விளைச்சலை அதிகரிக்கும் தாவர வளர்ச்சி ஊக்கியின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.
- எத்திலீன்
  - அப்சிசிக் அமிலம்
  - செட்டோகைனின்
  - ஐப்ரல்லின்
- 107.** கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) கூட்டமாக வாழும், (i) ஆஸ்டெ-அனைத்துண்ணும் ர்பாஸ் தீங்குயிரி
- (b) நிறையுயிரி அரசமச்சீர் (ii) தேள் கொண்டவை இளவுயிரி இருபக்க சமச்சீர் கொண்டவை
- (c) புத்தக நுரை யீரல் (iii) மேனோ-பிளானா
- (d) உயிர் ஒளி (iv) லோகஸ்டா
- (a) (b) (c) (d)
- (iii) (ii) (i) (iv)
  - (ii) (i) (iii) (iv)
  - (i) (iii) (ii) (iv)
  - (iv) (i) (ii) (iii)

**தொகுதி - II**

- 108.** தொகுதி கார்டேட்டா பற்றிய சரியான கூற்றுகள் யாது?
- வால் நாணிகளில் முதுகுநாண் தலை முதல் வால் வரை வாழ்காலம் முழுவதும் காணப்படும்.
  - முதுகெலும்புகளில் முதுகு நாண் கருவளர்ச்சிக் காலத்தில் மட்டும் காணப்படும்.
  - மைய நரம்புத் தொகுதி முதுகுபறத்தில் உள்ளீடற்றி நரம்பினை கொண்டது.
  - கார்டேட்டா மூன்று துணை தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது; அரை நாணிகள், மேனிக்கேட்டா மற்றும் தலை நாணிகள்.
- (a) மற்றும் (b)
  - (b) மற்றும் (c)
  - (d) மற்றும் (c)
  - (c) மற்றும் (a)
- 109.** படிபெயர்த்தவின் முதல் நிலையாவது:
- tRNA -வின் அமைனோ அசைல் சேர்த்தல்
  - எதிர் குறியீடினை கண்டறிதல்
  - ரைபோசோம் mRNA உடன் இணைதல்
  - DNA மூலக்கூறை கண்டறிதல்
- 110.** கொடுக்கப்பட்டவைகளுள் கார அமினோ அமிலம் எது?
- லைசின்
  - வாலைன்
  - தைரோசின்
  - குருந்டாமிக் அமிலம்
- 111.** பிளாஸ்மோடியத்தின் தொற்று ஏற்படுத்தும் எந்த நிலை மனித உடலினுள் நுழைகிறது?
- பெண் காமிட்டோசைட்டுகள்
  - ஆண் காமிட்டோசைட்டுகள்
  - டிரோஃபோசைட்டுகள்
  - ஸ்போரோசைட்டுகள்
- 112.** இன்டாஃபோஸ் நிலையின் G<sub>1</sub> நிலை குறித்த சரியான கூற்று எது?
- செல்லில் வளர்சிதை மாற்ற செயல்கள் நடைபெற்று, செல் வளர்கிறது; ஆனால் டி.என்.ஏ. இரட்டிப்படையாது
  - உட்கரு பிரிவு நடைபெறுகிறது
  - டி.என்.ஏ. உருவாக்கம் மற்றும் இரட்டிப் பாதல் நடைபெறுகிறது
  - செல் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்தும் மறு ஓருங்கமைதல் அடைகிறது

- 113.** ஓளி வினையின் போது எலெக்ட்ரான்கள் இவற்றிலிருநு கடத்தப்படுவதை பிளாஸ்டோ குடினோன் துணை புரிகிறது :
- PS-I -லிருந்து NADP<sup>+</sup>
  - PS-I -லிருந்து ATP சிந்தேஸ்
  - PS-II -விலிருந்து Cytb<sub>6f</sub> கூட்டமைப்பு
  - Cytb<sub>6f</sub> கூட்டமைப்பிலிருந்து PS-I
- 114.** ஓளிக்வாசத்தில் RuBisCo நொதியின் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிகழ்வால் தோன்றுவது :
- 1 மூலக்கூறு 6-கார்பன் பொருள்
  - 1 மூலக்கூறு 4-கார்பன் பொருள்  
1 மூலக்கூறு 2-கார்பன் பொருள்
  - 2 மூலக்கூறுகள் 3-கார்பன் பொருள்
  - 1 மூலக்கூறு 3-கார்பன் பொருள்
- 115.** மெய்யுட்கரு செல்களில் கிளைகோ புரதங்கள் மற்றும் கிளைகோவிபிடுகள் உருவாகும் முக்கியமான இடம் எது ?
- கோல்கை உடலங்கள்
  - பாலிசோம்கள்
  - எண்டோபிளாச வலை
  - பெராக்சிசோம்கள்
- 116.** கீழ்கண்டவற்றைப் பொருத்துக.
- வினையூக்கசெயல் (i) ரிசின் பாடுகளை தடுப்பவை
  - பெப்படைடுபினைப் (ii) மெலோ-புகளைக் கொண்டவை னெட்
  - பூஞ்சைகளில் செல்- (iii) கைட்டின் சுவர் பொருள்
  - இரண்டாம் நிலை (iv) கொல்-வளர்ச்சிதைப்பொருட்கள் லோஜின் கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- |     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
| (1) | (iii) | (iv)  | (i)   |
| (2) | (ii)  | (iii) | (i)   |
| (3) | (ii)  | (iv)  | (iii) |
| (4) | (iii) | (i)   | (iv)  |
- 117.** கிளைகோசெடிக் பினைப்பு மற்றும் பெப்படைடு பினைப்பு ஆகியவற்றை அவற்றின் அமைப்பில் முறையே கொண்ட பொருட்களை கண்டறிக.
- செல்லுலோஸ், லெசித்தின்
  - இனுவின், இன்கவின்
  - கைடின், கொலஸ்ட்ரால்
  - கிளிசரால், ட்ரிப்சின்

- 118.** பாரம்பரியத்திற்கான குரோமோசோம் கோட்பாட்டின் சோதனை சரிபார்ப்பு இவரால் நடத்தப்பட்டது :
- பொவேரி
  - மார்கான்
  - மெண்டல்
  - சட்டன்
- 119.** EcoRI கண்டறியும் பாலின்டுரோமிக் வரிசை எது ?
- 5' - CTTAAG - 3'  
3' - GAATTC - 5'
  - 5' - GGATCC - 3'  
3' - CCTAGG - 5'
  - 5' - GAATTC - 3'  
3' - CTTAAG - 5'
  - 5' - GGAACC - 3'  
3' - CCTTGG - 5'
- 120.** படியெடுத்தவில் டி.என்.ஏ. ஹெலிக்சை திறக்க உதவும் நொதி எது ?
- டி.என்.ஏ. பாலிமரேஸ்
  - ஆர்.என்.ஏ. பாலிமரேஸ்
  - டி.என்.ஏ. வைகேஸ்
  - டி.என்.ஏ. ஹெலிக்கேஸ்
- 121. சரியாக பொருத்தியுள்ளது எது ?**
- |               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| (1) அரிவாள்   | –           | உடல் குரோமோ  |
| இரத்தச் சோகை  | சோமில் உள்ள | ஒடுங்கிய     |
|               |             | பண்பு, குரோ- |
|               |             | மோசோம்-11    |
| (2) தலாசீமியா | –           | X பினைப்பு   |
| ஹீமோஃபீலியா   | –           | Y பினைப்பு   |
| (3) ஃபீனையில் | –           | உடல் குரோமோ  |
| கீட்டோநூரியா  | சோமில் உள்ள | ஒலகிய பண்பு  |
- 122.** S.L. மில்லர் தன் சோதனைகளில் மூடிய குடுவையில் இருந்து எவற்றைக் கலப்பதின் மூலம் அமினோஅமிலங்களைத் தோற்றுவித்தார் ?
- 600°C -ல் CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> மற்றும் நீராவி
  - 600°C -ல் CH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> மற்றும் நீராவி
  - 800°C -ல் CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> மற்றும் நீராவி
  - 800°C -ல் CH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub> மற்றும் நீராவி

- 123.** கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

தொகுதி - I

- (a) പ്രിട്ടുപ്പറി (i) കിരോവില്സ് നോയ്  
കർപ്പി

(b) തെരാമ്പു കർപ്പി (ii) തെയാപിട്ടിസ്  
മെല്ലിപ്പറി

(c) അട്ടീൻല് കർപ്പി (iii) തെയാപിട്ടിസ്  
ഇൻകിപിടിസ്

(d) കന്ണയമ് (iv) അട്ടിച്ചൻ നോയ്

<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>
(1)	(iii)	(i)	(iv)
(2)	(ii)	(i)	(iv)
(3)	(iv)	(iii)	(i)
(4)	(iii)	(ii)	(i)

- 124.** புருஸ் விளிம்பு நூண் வில்லைகளை கொண்ட கண சதுரா வடிவ எபிதீலியம் எங்கு காணப்படும்?

(1) நெஂ்ப்ரானின் அன்மை சுருள் நூண்குழல்கள்

(2) யூஸ்டேலியன் குழாய்

(3) குடவின் உட்படலம்

(4) உமிழு நீர் சுரப்பியின் நாளங்கள்

125. ஸ்ட்ரோபெலஸ்கன் அல்லது கூம்புகள் இவற்றில் காணப்படுகின்றன :

  - (1) மார்கான்ஷியா
  - (2) ஈக்குவிசிட்டம்
  - (3) சால்வீனியா
  - (4) பெரிஸ்

126. அண்டார்ஷிகா பகுதியில் பனிக்குருடு ஏற்படுவது எதனால் ?

(1) பனிக்கட்டியிலிருந்து ஒளி அதிக அளவில் பிரதிபலிக்கப் படுவதால்

(2) அகச்சிவப்பு கதிர்களால் விழித்திரை பாதிக்கப் படுவதால்

(3) குறைந்த வெப்ப நிலையில் கண்ணில் உள்ள திரவங்கள் உறைவதால்

(4) அதிக அளவிலான UV-B கதிர்வீச்சின் காரணமாக கருவிமிகி வீக்கமடைவதால்

- 127.** නොයික් මරුම් නොයික් කාරණිකල පොරුත්ත් සියාල විනිශ්චය තොර්න්තෙහි.

ତୋରୁତି - I

- |            |             |            |                       |
|------------|-------------|------------|-----------------------|
| (a)        | ତୈଟଂ୍କପାଯ୍ୟ | (i)        | ଉଣ୍ଡରେଚରିମିଯା         |
| (b)        | ନ୍ତିମୋଣିଯା  | (ii)       | ଏଲାଗାଲ୍ସମ୍ବେମାତ୍ରିଯମ୍ |
| (c)        | ତୈପଲାଗିଯା   | (iii)      | ଚାଳ୍‌ମୋଣଲ୍ଲାଗ         |
| (d)        | ମଲେଗିଯା     | (iv)       | ଉର୍ମିମେଗାଂ୍କିଲିଲାସ୍   |
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b>  | <b>(c)</b> | <b>(d)</b>            |
| (1)        | (ii)        | (i)        | (iii)                 |
| (2)        | (iv)        | (i)        | (ii)                  |
| (3)        | (i)         | (iii)      | (ii)                  |
| (4)        | (iii)       | (iv)       | (i)                   |

- 128.** கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து சரியான இணையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- (1) நியூகிளியேஸ்கள் - DNA - னிரு இழை - களைப் பிரிக்கின்றன
  - (2) எக்லோநியூக்ளி - DNA - வில் குறிப் யேஸ்கள் பிட்டிடங்களில் வெட்டுகின்றன
  - (3) ஸலகேஸ்கள் - இரு DNA மூலக்கூறு - களை இணைக்கின்றன
  - (4) பாலிமெரேஸ்கள் - DNA - வை துண்டாங் - களாக உடைத்தின்றன

- 129.** கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் உள்ளடக்கப் பொருட்கள் குறித்த எது சரியானதல்ல ?

- (1) செட்டோபிளாசுத்தில் தனித்து உள்ளவை.
  - (2) அவை செட்டோபிளாசுத்தில் இருப்புப் பொருளாக உள்ளவை.
  - (3) எந்த சவ்வாலும் சூழப்படவில்லை.
  - (4) உணவுத் துகள்களின் உள் விழுங்குதலில் ஈடுபடுகின்றன.

- 130.** உட்சுவாசம் நிகழ்வுகளில் சரியானவை எவை ?

- (a) உதிர விதானம் சுருங்கல்  
(b) வெளி விலா எலும்பிடைத்தசைகள் சுருங்குதல்  
(c) நுரையீரல் கொள்ளாவு குறைதல்  
(d) நுரையீரலிடை அழுத்தம் அதிகரிக்தல்


(1) (a), (b) மற்றும் (d)  
(2) (d) மட்டும்  
(3) (a) மற்றும் (b)  
(4) (c) மற்றும் (d)

- 131.** கதிர் சிறுமலர்களில் காணப்படுகிறது :
- வைப்போகைனஸ் சூலகப்பை
  - அரைக்மீட்ட சூலகப்பை
  - கீழ்மட்ட சூலகப்பை
  - மேல்மட்ட சூலகப்பை
- 132.** உயிரியுடன் அது தொடர்பான உயிர்நுட்பத்தில் அதன் பயனைப் பொருத்துக.
- |                     |                                |                        |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| (a) பாசில்லஸ்       | (i) குளோனிங் துரின்ஜியன்சிஸ்   | கடத்தி                 |
| (b) தெர்மஸ்         | (ii) முதல் rDNA அக்குவாடிகஸ்   | மூலக்கூறை உருவாக்குதல் |
| (c) அக்ரோபா-க்ஸியம் | (iii) DNA குமிபேசியன்ஸ்        | பாலிமரேஸ்              |
| (d) சால்மோனெஸ்லா    | (iv) Cry புரதங்கள் டைபிழுரியம் |                        |
- சரியான விடையை கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்வு செய்யவும்.**
- | (a)       | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----------|-------|-------|------|
| (1) (iii) | (ii)  | (iv)  | (i)  |
| (2) (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |
| (3) (ii)  | (iv)  | (iii) | (i)  |
| (4) (iv)  | (iii) | (i)   | (ii) |
- 133.** கீழ்கண்டவற்றுள் விடை உறக்கத்தை தடை செய்யும் பொருள் எதுவல்ல ?
- பினாலிக் அமிலம்
  - பாரா - அஸ்கார்பிக் அமிலம்
  - ஜிப்ரல்லிக் அமிலம்
  - அப்சிசிக் அமிலம்
- 134.** குன்றல் பகுப்பு குறித்த கீழ்கண்டவற்றைப் பொருத்துக.
- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| (a) சைகோஷன்     | (i) முடிவடைதல்             |
| (b) பாக்கைஷன்   | (ii) கையாஸ்மாக்கள்         |
| (c) டிப்ளோஷன்   | (iii) குறுக்கெதிர் மாற்றம் |
| (d) கையாகைனசிஸ் | (iv) சினாப்சிஸ்            |
- கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.**
- | (a)       | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----------|-------|-------|-------|
| (1) (i)   | (ii)  | (iv)  | (iii) |
| (2) (ii)  | (iv)  | (iii) | (i)   |
| (3) (iii) | (iv)  | (i)   | (ii)  |
| (4) (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)   |

- 135.** கூழ்ம மின் ஆற்றலால் பகுப்பின் மூலம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட DNA துண்டங்களை இதன் உதவியுடன் பார்க்க முடியும் :
- UV கதிர்வீச்சில் அசிடோகார்மைன்
  - அகச் சிவப்புக் கதிர்வீச்சில் எத்திடியம் புரோமைடு
  - பிரகாசமான நீல ஓளியில் அசிடோகார்மைன்
  - UV கதிர்வீச்சில் எத்திடியம் புரோமைடு
- 136.** கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று இயற்கை பலபடி?
- பாலி ப்யூட்டாடையீன்
  - பாலி (ப்யூட்டாடையீன்-அக்ரேலோ-நைட்ரேல்)
  - சிஸ்-1,4- பாலிஜீசோபீரின்
  - பாலி (ப்யூட்டாடையீன்-ஸ்டைரீன்)
- 137.** பிளாட்டினம் (Pt) மின் முனையை பயன்படுத்தி நீர்த்த சல்பூரிக் அமிலத்தை மின்னாற்ற பகுக்கும் போது, நேர்மின்முனையில் கிடைக்கும் விளைபொருள் :
- $H_2S$  வாயு
  - $SO_2$  வாயு
  - ஷைட்ரஜன் வாயு
  - ஆக்ஸிஜன் வாயு
- 138.** பொருள் மைய கனச்சதூர் (bcc) அமைப்புடைய ஒரு தனிமத்தின் கூடுவினிம்பின் மதிப்பு  $288 \text{ pm}$  எனில், அதன் அணு ஆரமானது :
- $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
  - $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
  - $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
  - $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- 139.** வெப்பம் மாறா நிபந்தனையின் கீழ், ஒரு நல்லியல்பு வாயு வெற்றிட விரிவாக்கம் அடைவதற்குரிய சரியான தெரிவானது :
- $q < 0, \Delta T = 0$  மற்றும்  $w = 0$
  - $q > 0, \Delta T > 0$  மற்றும்  $w > 0$
  - $q = 0, \Delta T = 0$  மற்றும்  $w = 0$
  - $q = 0, \Delta T < 0$  மற்றும்  $w > 0$

- 140.** கீழ்கண்ட மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பில் எது பூஜ்ய இருமுனை திருப்புத்திறனை கொண்டுள்ளது?
- நெட்ரஜன் ட்ரை புளூரைடு, பெரிலியம் டை புளூரைடு, நீர், 1,3-டை குளோரோ பென்சீன்
  - போரான் ட்ரை புளூரைடு, பெரிலியம் டை புளூரைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, 1,4-டை குளோரோ பென்சீன்
  - அம்மோனியா, பெரிலியம் டை புளூரைடு, நீர், 1,4-டை குளோரோ பென்சீன்
  - போரான் ட்ரை புளூரைடு, வைட்ரஜன் புளூரைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, 1,3-டை குளோரோ பென்சீன்
- 141.** ஒரு சிலின்டரில்  $N_2$  மற்றும் Ar வாயுக்கள் கொண்ட ஒரு கலவை உள்ளது. அதில் 7 g  $N_2$  மற்றும் 8 g Ar உள்ளது. சிலின்டரில் உள்ள வாயு கலைவயின் மொத்த அழுத்தம் 27 bar எனில்,  $N_2$ -வின் பகுதி அழுத்தம் :
- [ $N = 14$ ,  $Ar = 40$  ( $\text{g mol}^{-1}$  -ல்)] : அணுநிறைகளை பயன்படுத்துக]
- 15 bar
  - 18 bar
  - 9 bar
  - 12 bar
- 142.** கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து சரியான கூற்றுகளை கண்டறியவும்.
- ஐஸ்கீரீம் மற்றும் உறைந்த உணவிற்கு  $CO_2(g)$  குளிருட்டியாக பயன்படுகிறது.
  - $C_{60}$  அமைப்பானது பன்னிரெண்டு ஆறு கார்பன் கொண்ட வளையத்தையும் மற்றும் இருபது ஐந்து கார்பன் கொண்ட வளையத்தையும் கொண்டது.
  - ZSM-5, ஜீயோலைட்டின் ஒரு வகை, ஆல்கஹால்களை பெட்ரோலாக மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது.
  - CO நிறமற்ற மற்றும் மணமற்ற வாயுவாகும்.
- (b) மற்றும் (c) மட்டும்
  - (c) மற்றும் (d) மட்டும்
  - (a), (b) மற்றும் (c) மட்டும்
  - (a) மற்றும் (c) மட்டும்

- 143.** அனிசோலை, HI உடன் பிளத்தல் வினைக்கு உட்படுத்தும் போது கிடைப்பது :





- 144.** ரெளால்ட் விதியிலிருந்து நேர்விலக்கம் காண்பிக்கும் கலவையானது :
- அசிட்டோன் + குளோரோபார்ம்
  - குளோரோ ஈத்தேன் + புரோமோ ஈத்தேன்
  - எத்தனால் + அசிட்டோன்
  - பென்சீன் + டொலுவீன்
- 145.** அணைவுச் சேர்மங்கள் உருவாவதில் ஈனிகளின் புல வலிமையின் சரியான ஏறு வரிசை கீழ்கண்டவற்றில் எது?
- $F^- < SCN^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
  - $CN^- < C_2O_4^{2-} < SCN^- < F^-$
  - $SCN^- < F^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
  - $SCN^- < F^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$
- 146.** கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று அதிகப்பட்ச எண்ணிக்கையிலான அணுக்களை கொண்டுள்ளது?
- 1 g  $O_2(g)$  [ $O$  -யின் அணுநிறை = 16]
  - 1 g  $Li(s)$  [ $Li$  -யின் அணுநிறை = 7]
  - 1 g  $Ag(s)$  [ $Ag$  -யின் அணுநிறை = 108]
  - 1 g  $Mg(s)$  [ $Mg$  -யின் அணுநிறை = 24]

147. உர்ட்ஸ் வினையில் கீழ்கண்ட எந்த ஆல்கோன்-ஐ பெருமளவில் தயாரிக்க இயலாது?
- n-ஹெப்டேன்
  - n-ப்யூட்டேன்
  - n-ஹெக்சேன்
  - 2,3-டைமெத்தில் ப்யூட்டேன்
148. கீழ்கண்டவற்றில் கார்பன்மோனாக்சைடு குறித்து எது சரியற்றது?
- கார்பாக்ஸி ஹீமோகுளோபின் (ஹீமோ-குளோபின் CO உடன் இணைந்த அமைப்பு) ஆக்ஸி ஹீமோகுளோபினைக் காட்டிலும் குறைந்த நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது
  - முழுமையடையாத ஏரிதலினால் உற்பத்தியாகின்றது
  - அது கார்பாக்ஸி ஹீமோகுளோபினை உருவாக்கும்
  - அது இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் கடத்தும் திறனை குறைக்கின்றது.
149.  $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2\text{(g)}$  வினையில், சரியான விடையானது:
- $\Delta_r\text{H} < 0$  மற்றும்  $\Delta_r\text{S} > 0$
  - $\Delta_r\text{H} < 0$  மற்றும்  $\Delta_r\text{S} < 0$
  - $\Delta_r\text{H} > 0$  மற்றும்  $\Delta_r\text{S} > 0$
  - $\Delta_r\text{H} > 0$  மற்றும்  $\Delta_r\text{S} < 0$
150. கீழ்கண்டவற்றை பொருத்தி சரியான விடையை கண்டறியவும்.
- |   |   |
|---|---|
| (a) $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ | (i) $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ |
| (b) தற்காலிக கடின நீர்                    | (ii) ஒரு எலக்ட்ரான் குறை வைட்டரைடு                          |
| (c) $\text{B}_2\text{H}_6$                | (iii) தொகுப்பு வாயு   |
| (d) $\text{H}_2\text{O}_2$                | (iv) தளமற்ற அமைப்பு   |
- (a) (b) (c) (d)
- (iii) (iv) (ii) (i)
  - (i) (iii) (ii) (iv)
  - (iii) (i) (ii) (iv)
  - (iii) (ii) (i) (iv)

151. ஷுரியா நீருடன் வினைபுரிந்து A -வை தருகின்றது, அது சிதைவடைந்து B -யை தரும். B -யை ஆழந்த நீலம் நிறமடைய  $\text{Cu}^{2+}$  (aq) கரைசலினுள் செலுத்தும் போது C -யை தருகின்றது. கீழ்கண்டவற்றுள் C -யின் வாய்பாடு என்ன?
- $\text{Cu(OH)}_2$
  - $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$
  - $\text{CuSO}_4$
  - $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
152. கக்ரோசின் நீராற்பகுத்தல், கீழ்கண்ட வினையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
 $\text{கக்ரோஸ்} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{குளுகோஸ்} + \text{ப்ரக்டோஸ்}$   
 300 K -இல் சமநிலை மாறிலியானது ( $K_c$ )  $2 \times 10^{13}$  எனில், அதே வெப்பநிலையில்  $\Delta_r\text{G}^\ominus$  மதிப்பானது:
- $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
  - $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
  - $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
  - $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
153.  $\text{Cr}^{2+}$  அயனியின் கணக்கிடப்பட்ட சுழற்சி காந்ததிருப்புத்திறனானது:
- 5.92 BM
  - 2.84 BM
  - 3.87 BM
  - 4.90 BM
154. கூழ்ம கரைசலின் எந்த பண்பினை நிர்ணயிப்பதற்கு ஜிட்டாதிறன் அளவீடு பயன்படுகின்றது?
- கூழ்மத்துக்களின் நிலைப்புத்தன்மை
  - கூழ்மத்துக்களின் உருவ அளவு
  - பாகுத் தன்மை
  - கரைதிறன்
155. கீழ்கண்டவற்றுள் நேர் அயனி அழுக்குநீக்கி எது?
- சீடைல்ட்ரைமெத்தில் அம்மோனியம் புரோமைடு
  - சோடியம் டோடெட்க்கைல் பென்சீன் சல்போனேட்
  - சோடியம் லாரைல் சல்பேட்
  - சோடியம் ஸில்பேட்
156. 0.1 M NaOH இல்  $\text{Ni}(\text{OH})_2$  -வின் கரைதிறனை கண்டறியவும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள  $\text{Ni}(\text{OH})_2$  -வின் அயனிப் பெருக்கமானது  $2 \times 10^{-15}$ .
- $1 \times 10^{-13} \text{ M}$
  - $1 \times 10^8 \text{ M}$
  - $2 \times 10^{-13} \text{ M}$
  - $2 \times 10^{-8} \text{ M}$

157. கீழ்கண்ட வினைத் தொடரில் உருவாகும் சேர்மம் X -யை கண்டறியவும்.



158. கீழ்கண்ட எந்த உலோக அயனி பல நொதிகளை தூண்டி குளுகோசின் ஆக்லிஜனேற்றத்தில் பங்கேற்று, ATP -யை உற்பத்தி செய்து மற்றும் Na -வுடன் நரம்பு சைகை பரிமாற்றத்திற்கு காரணமாக அமைகிறது ?
- கால்சியம்
  - பொட்டாசியம்
  - இரும்பு
  - காப்பர்

159. ஒரு வினையின் வினைபடு பொருள்களின் செறிவு அதிகரிப்பதனால் கீழ்கண்ட எது மாறுபடும் ?

- பயன் தொடக்க ஆற்றல்/குறைந்த பட்ச இயக்க ஆற்றல்
- மோதல் அதிர்வெண்
- கிளர்வுகொள் ஆற்றல்
- வினை வெப்பம்

160. ஒரு முதல் வகை வினையின் வினைபேக மாறிலி  $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$  ஆகும். 2.0 g வினைபடு பொருள் 0.2 g ஆக குறைவதற்கு தேவைப் படும் நேரம் :

- 500 s
- 1000 s
- 100 s
- 200 s

161. உருகிய  $\text{CaCl}_2$  -வில் இருந்து 20 g கால்சியம் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவைப்படும் பாரடேக்களின் (F) எண்ணிக்கை :

- (Ca -ன் அணு நிறை =  $40 \text{ g mol}^{-1}$ )
- 3
  - 4
  - 1
  - 2

162. கீழ்கண்டவற்றுள் சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- வான் -ஆர்க்கல் முறையில் நிக்கல் ஆவி அழுத்த தூய்மையாக்கல் செய்யப் படுகிறது.
- தேனிரும்பு பல்வேறு அமைப்புகளாக வார்ப்பு செய்யப்படுகிறது.
- 4% கார்பன் உடைய மெல்லிரும்பு தூய்மையற்றது.
- $\text{CO}_2$  வெளிவருவதால் கொப்பளக் காப்பரானது கொப்பளத்தேற்றத்தை கொண்டுள்ளது.

163. எந்த ஒரு மூலக்கூறு உருவாகாது என்பதனை கண்டறியவும்.

- $\text{C}_2$
- $\text{O}_2$
- $\text{He}_2$
- $\text{Li}_2$


164. ஒரு மூவினைய பிழுடைல் கார்பன் நேர் அயனி, ஒரு ஈரினைய பிழுடைல் கார்பன் நேர் அயனியைவிட அதிக நிலைப்புத்தன்மையை கொண்டிருப்பதற்கு கீழ்கண்டவற்றுள் எது, காரணமாகிறது ?

- $-\text{CH}_3$  தொகுதிகளின்  $-R$  விளைவு
- பினைப்பில்லா உடனிசைவு/குறை பினைப்பு
- $-\text{CH}_3$  தொகுதிகளின்  $-I$  விளைவு
- $-\text{CH}_3$  தொகுதிகளின்  $+R$  விளைவு

165.  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{MgCl}_2$  மற்றும்  $\text{NaCl}$  கரைசலினுள்  $\text{HCl}$  செலுத்தப்படுகின்றது. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்தசேர்மம்/களில் ஒன்று படிகமாகும் ?

- $\text{MgCl}_2$  மட்டும்
- $\text{NaCl}$ ,  $\text{MgCl}_2$  மற்றும்  $\text{CaCl}_2$
- $\text{MgCl}_2$  மற்றும்  $\text{CaCl}_2$  இரண்டுமே
- $\text{NaCl}$  மட்டும்

166. கீழ்கண்ட அமீனில் எவை கார்பலமைன் சோதனையை தருகின்றது?



167. சரியாக பொருந்தாதவற்றை கண்டறியவும்.  
பெயர் IUPAC அதிகார-  
பூர்வமான பெயர்


- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| (a) Unnilunium  | (i) மெண்டலீவியல்           |
| (b) Unniltrium  | (ii) லாரான்சியம்           |
| (c) Unnilhexium | (iii) ஸோர்ஜியம்            |
| (d) Unununniun  | (iv) டார்மஸ்டாட்-<br>டியம் |
- (1) (c), (iii)  
(2) (d), (iv)  
(3) (a), (i)  
(4) (b), (ii)

168. அசிட்டோன் மற்றும் மெத்தில் மெக்னீசியம் ஆகியவை வினைபுரிந்து பின் அதன் தொடர்ச்சியாக நீராற்படுத்தால் கிடைக்கும் விளைபொருள்:

- (1) மூவிணைய பியூட்டைல் ஆல்கஹால்  
(2) ஐசோபியூட்டைல் ஆல்கஹால்  
(3) ஐசோபுரப்பைல் ஆல்கஹால்  
(4) ஈரிணைய் பியூட்டைல் ஆல்கஹால்

169. சுக்ரோஸை நீரால் பகுத்தால் கிடைப்பது:  
(1)  $\alpha$ -D-குளுகோஸ் +  $\beta$ -D-ப்ரக்டோஸ்  
(2)  $\alpha$ -D-ப்ரக்டோஸ் +  $\beta$ -D-ப்ரக்டோஸ்  
(3)  $\beta$ -D-குளுகோஸ் +  $\alpha$ -D-ப்ரக்டோஸ்  
(4)  $\alpha$ -D-குளுகோஸ் +  $\beta$ -D-குளுகோஸ்

170. ஒரு ஆல்கீன் ஓச்சோனேற்றத்தின் போது மெத்தனல் -ஐ ஒரு விளை பொருளாகத் தருகின்றது. அதன் அமைப்பானது:



171. சரியற்ற கூற்றை கண்டறியவும்.

- (1) உலோகங்களின் படிக கூட்டில் சிறு அணுக்களான H, C அல்லது N உள்ளிஞக்கப்பட்டு உருவாக்கப்படு-வதே இடையூட்டுச் சேர்மங்களாகும்.  
(2)  $\text{CrO}_4^{2-}$  மற்றும்  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ -இல் குரோமியத் தின் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகள் ஒத்த-தாக இருக்காது.  
(3) நீரில்  $\text{Fe}^{2+}(\text{d}^6)$  -யை காட்டிலும்  $\text{Cr}^{2+}(\text{d}^4)$  ஒரு வலிமை மிகு ஒடுக்கும் காரணி-யாகும்.  
(4) இடைநிலை உலோகங்களும் மற்றும் அதன் சேர்மங்களும் பல்வேறு ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றிருக்கும் திறன் வாய்ந்ததாலும் மற்றும் அணைவுகளை உருவாக்குவதாலும் அவை சிறந்த வினையூக்கி பண்பைப் பெற்றுள்ளன.

172. கீழ்கண்டவற்றில் எந்த ஒன்று கார அமினோ அமிலம் ஆகும் ?
- டைரோசின்
  - லைசின்
  - சிரென்
  - அலனென்
173. கீழ்கண்ட சல்பரின் அமில ஆக்சைடுகளில் எவை – O – O – பினைப்பை கொண்டுள்ளது ?
- $H_2S_2O_8$ , பெர்ஆக்சோடை சல்பூரிக் அமிலம்
  - $H_2S_2O_7$ , பைரோ சல்பூரிக் அமிலம்
  - $H_2SO_3$ , சல்பூரஸ் அமிலம்
  - $H_2SO_4$ , சல்பூரிக் அமிலம்
174. 2-புரோமோ பென்டேன் நீக்கவினையில் ஈடுபட்டு பென்ட்-2-ன் உருவாகும் போது நிகழும் வினை எது ?
- பி-நீக்க வினை
  - செயிட்செவ் விதியை பின்பற்றுகிறது
  - ஹெட்ரஜன் ஹாலஜன் நீக்கவினை
  - நீர் நீக்க வினை
- (b), (c), (d)
  - (a), (b), (d)
  - (a), (b), (c)
  - (a), (c), (d)
175. கீழ்கண்டவற்றை பொருத்துக.

**ஆக்சைடு****தன்மை**

- CO (i) கார
- BaO (ii) நடுநிலை
- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (iii) அமில
- Cl<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (iv) ஈரியல்புள்ள

கீழ்கண்டவற்றுள் சரியான விடை எது ?

**(a) (b) (c) (d)**

- (iii) (iv) (i) (ii)
- (iv) (iii) (ii) (i)
- (i) (ii) (iii) (iv)
- (ii) (i) (iv) (iii)

176. பென்சீனின் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலியின் ( $K_f$ ) மதிப்பு  $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$ . மின்பகுளி அல்லாத கரைபொருளை கொண்ட 0.078 m மோலாலிட்டி பென்சீன் கரைசலின் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலி :
- (இரண்டு தசம புள்ளி வரை முழுமையாக்கவும்)
- 0.40 K
  - 0.60 K
  - 0.20 K
  - 0.80 K
177. தாள்/காகித வண்ணப்பிரிகை எதற்கான எடுத்துக்காட்டு ?
- மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப் பிரிகை
  - பத்தி வண்ணப் பிரிகை
  - பரப்புக் கவர்ச்சி வண்ணப் பிரிகை
  - பங்கீடு வண்ணப் பிரிகை
178. கீழ்கண்ட வினையில் கார்பனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன ?
- $$CH_4(g) + 4Cl_2(g) \rightarrow CCl_4(l) + 4HCl(g)$$
- 4 இல் இருந்து + 4
  - 0 இல் இருந்து - 4
  - + 4 இல் இருந்து + 4
  - 0 இல் இருந்து + 4
179. நீர்த்த �NaOH முன்னிலையில் பென்சால்டிஹெட்டு மற்றும் அசிட்டோபீனோன் இடையிலான வினை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது ?
- குறுக்க கானிசரோ வினை
  - குறுக்க ஆல்டால் குறுக்கம்
  - ஆல்டால் குறுக்கம்
  - கானிசரோ வினை
180.  $^{175}_{71}\text{Lu}$  உள்ள புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை முறையே :
- 71, 71 மற்றும் 104
  - 175, 104 மற்றும் 71
  - 71, 104 மற்றும் 71
  - 104, 71 மற்றும் 71

**Space For Rough Work / இதர வேலைக்கான காலியிடம்**

No. :

Test Booklet Code

வினாத்தான் தொகுப்பு குறியீடு

# HAKAN

This Booklet contains 24+44 pages.

இவ்வினாத்தான் தொகுப்பு 24+44 பக்கங்களை கொண்டது.

**G4**

**Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.**

இந்த வினாத் தொகுப்பை திறக்கும்படி கண்காணிப்பாளர் கூறும் வரையில் திறக்கக் கூடாது.

**Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.**

வினாத் தொகுப்பிற்கு பின் பக்கமுள்ள அறிவுரைகளை கவனமாக படிக்கவும்.

## **Important Instructions :**

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on **side-1** and **side-2** carefully with **blue/black ball point pen** only.
2. The test is of **3 hours** duration and Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
4. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
6. The CODE for this Booklet is **G4**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.

## **முக்கிய அறிவுரைகள் :**

1. இந்த வினாத் தொகுப்பிற்குள் விடைத்தாள் உள்ளது. வினாத் தொகுப்பை திறக்க அறிவுறுத்தப்படும் பொழுது விடைத்தாளை எடுத்து பக்கம் 1 மற்றும் பக்கம் 2 இல் கேட்கப்பட்டுள்ள விபரங்களை கவனமாக **நீலம்/கருப்பு** பந்துமுனைப் பேனா மட்டுமே பயன்படுத்தி நிரப்பவும்.
2. இந்த தேர்வு **3 மணி** நேரமாகும் மற்றும் வினாத்தான் தொகுப்பு **180** வினாக்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு வினாவுக்கு **4** மதிப்பெண்கள். ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கு தேர்வு எழுதுபவருக்கு **4** மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும். மொத்த மதிப்பெண்களிலிருந்து ஒவ்வொரு தவறான விடைக்கும் **ஒரு** மதிப்பெண் கழிக்கப்படும். அதிகப்ச மதிப்பெண்கள் **720** ஆகும்.
3. இந்த பக்கத்தில் எழுதுவதற்கும்/விடைகளைக் குறிப்பதற்கும் **நீலம்/கருப்பு** பந்துமுனைப் பேனா மட்டும் உபயோகிக்க வேண்டும்.
4. வினாத்தாள் தொகுப்பில் கொடுக்கப்பட்ட இடத்தில் மட்டும் சரி பார்த்தலுக்கு (Rough work) பயன்படுத்த வேண்டும்.
5. தேர்வு முடிந்தவுடன், தேர்வு எழுதுபவர் விடைத்தாளை அறை/ஹாலிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு முன், அறை தேர்வுக் கண்காணிப்பாளரிடம் கொடுக்க வேண்டும். தேர்வு எழுதுபவர்கள் வினாத்தான் தொகுப்பை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்க படுகிறார்கள்.
6. இந்த வினாத்தான் தொகுப்பின் குறியீடு **G4**, விடைத்தாளின் பக்கம் 2-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடும் இந்த வினாத்தான் தொகுப்பின் குறியீடும் ஒன்று தான் என்று உறுதி செய்யவும். ஏதாவது முரண்பாடு இருந்தால், தேர்வு எழுதுபவர் உடனடியாக அறை கண்காணிப்பாளரிடம் தெரிவித்து, மாற்று வினாத்தான் தொகுப்பையும் மற்றும் விடைத்தாளையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
7. தேர்வு எழுதுபவர்கள் விடைத்தாள் மடங்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். விடைத்தாளில் எந்த விதமான தேவையற்ற குறிப்புகளும் செய்யக்கூடாது. வினாத்தான் தொகுப்பு/விடைத்தாளில் கொடுக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட இடத்தை தவிர எந்த இடத்திலும் தேர்வு எழுதுபவர் அவரது பதிவு எண்ணை எழுத கூடாது.
8. விடைத்தாளில் வெள்ளை தீரவத்தில் அழித்து திருத்தங்கள் செய்ய அனுமதியில்லை.

**In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.**

**வினா மொழி பெயர்ப்பில் ஏதாவது சர்ச்சை இருந்தால், ஆங்கில பிரதியே முடிவானது.**

Name of the Candidate (in Capitals) : \_\_\_\_\_

தேர்வு எழுதுபவரின் பெயர் : \_\_\_\_\_

Roll Number : in figures \_\_\_\_\_

பதிவு எண் : எண்ணில் \_\_\_\_\_

: in words \_\_\_\_\_

: எழுத்தில் \_\_\_\_\_

Centre of Examination (in Capitals) : \_\_\_\_\_

தேர்வு மையம் : \_\_\_\_\_

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_

Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

தேர்வு எழுதுபவரின் கையொப்பம்:

கண்காணிப்பாளரின் கையொப்பம்:

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : \_\_\_\_\_

1. ஸ்ட்ரோபெலஸ்கள் அல்லது கூம்புகள் இவற்றில் காணப்படுகின்றன :
- டெரிஸ்
  - மார்கான்ஷியா
  - ஈக்குவிசிட்டம்
  - சால்வீனியா
2. ஒரு இயல்பு ECG -யில் QRS கூட்டமைப்பு எதனைக்குறிக்கின்றது ?
- ஆரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க நீக்கம்
  - வெண்டிரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க நீக்கம்
  - வெண்டிரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க மீட்சி
  - ஆரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க மீட்சி
3. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.
- | தொகுதி - I                       | தொகுதி - II                         |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| (a) பிளாசன்டா                    | (i) ஆன்டிரஜன்                       |
| (b) சோனா பெல்லுசிடா              | (ii) மனித கோரியானிக் கொனடோ-டிரோபின் |
| (c) பல்போ யுரேத்திரல் சுரப்பிகள் | (iii) அண்டத்தின் அடுக்கு            |
| (d) வெடிக் செல்கள்               | (iv) பீனிஸை வழவழப்பாக்குதல்         |
| <b>(a)    (b)    (c)    (d)</b>  |                                     |
| (1) (i)    (iv)                  | (ii)    (iii)                       |
| (2) (iii)    (ii)                | (iv)    (i)                         |
| (3) (ii)    (iii)                | (iv)    (i)                         |
| (4) (iv)    (iii)                | (i)    (ii)                         |
4. எந்த தொழில் நுட்பத்தில் கருவற இயலாத் பெண்களுக்கு மகப்பேறுக்காக கரு மாற்றம் செய்யப்படுகிறது ?
- GIFT மற்றும் ZIFT
  - ICSI மற்றும் ZIFT
  - GIFT மற்றும் ICSI
  - ZIFT மற்றும் IUT

5. சரியாக பொருத்தியுள்ளது எது ?
- ஃபீனையில் – உடல் குரோமோ கீட்டோநூரியா ஓலகிய பண்பு
  - அரிவாள் – உடல் குரோமோ இரத்தச் சோகை ஓடுங்கிய பண்பு, குரோ-மோசோம்-11
  - தலாசீமியா – X பிணைப்பு
  - ஹீமோஃபீலியா – Y பிணைப்பு
6. சினாப்டினிமல் தொகுப்பு எந்த நிலையில் கலைந்து கரையத் தொடங்குகிறது ?
- சைக்கோட்டைன்
  - டிப்ளோட்டைன்
  - லெப்டோடைன்
  - பாக்கிடைன்
7. கீழ்கண்டவற்றுள் ஓர் இனத் தொகையுடன் தொடர்பில்லாதது எது ?
- பிறப்பு வீதம்
  - இறப்பு வீதம்
  - சிற்றினங்களின் உறவு முறை
  - பால் விகிதம்
8. கிராஃபியன் ஃபாவிக்கிளிவிருந்து அண்ட செல் வெளியாதலுக்கு ஹார்மோனின் எந்த நிலை உதவுகிறது ?
- புரோஜெஸ்டிரானின் உயர் அடர்வு
  - LH - இன் குறை அடர்வு
  - FSH - இன் குறை அடர்வு
  - எஸ்டிரஜனின் உயர் அடர்வு
9. மனித செரிமான மண்டலம் குறித்த சரியான கூற்று எது ?
- உணவு பாதையின் உள் படலம் செரோசா என்பது
  - இலியம் என்பது மிகுந்த சுருங்கிய பகுதி
  - குடல் வால் டியோநெத்திலிருந்து தோன்றுகிறது
  - இலியம் சிறு குடலில் திறக்கிறது

- 10. சரியற்ற கூற்றை கண்டறிக.**
- சாற்றுக் கட்டை நீர் மற்றும் தனிமங்களை வேரிலிருந்து இலைக்கு கடத்துவதில் பங்கேற்கிறது.
  - சாற்றுக் கட்டையானது இரண்டாம் நிலை சைலத்தின் உட்பகுதி மற்றும் அது வெளிர் நிறத்தில் காணப்படும்.
  - வைரக் கட்டையானது டானின்கள், ரெசின்கள், எண்ணெய்கள் மற்றும் பல படிவதால் அடர்ந்த நிறத்தில் உள்ளது.
  - வைரக் கட்டை நீரைக் கடத்துவதில்லை ஆனால் உறுதித் தன்மையை அளிக்கிறது.
- 11. உணவு பாதையிலுள்ள கோப்பை வடிவ செல்கள் எவற்றிலிருந்து மாறியிருக்கிறது ?**
- தூண்வடிவ எபிதீவிய செல்கள்
  - காண்ட் ரோ செட்டு
  - கூட்டு எபிதீவிய செல்கள்
  - கட்டை வடிவ எபிதீவிய செல்கள்
- 12. அண்டார்ஷிகா பகுதியில் பனிக்-குருடு ஏற்படுவது எதனால் ?**
- அதிக அளவிலான UV-B கதிர்வீச்சின் காரணமாக கருவிழி வீக்கமடைவதால்
  - பனிக்கட்டியிலிருந்து ஒளி அதிக அளவில் பிரதிபலிக்கப் படுவதால்
  - அகச்சிவப்பு கதிர்களால் விழித்திரை பாதிக்கப் படுவதால்
  - குறைந்த வெப்ப நிலையில் கண்ணில் உள்ள திரவங்கள் உறைவதால்
- 13. வளர்ச்சி நிலை அதிகமாக இருப்பது எப்போது ?**
- ஒடுக்கப் பருவம்
  - முதிர்ந்து உதிர்தல்
  - உறக்க நிலை
  - அடுக்கேற்றப் பருவம்
- 14. S.L. மில்லர் தன் சோதனைகளில் மூடிய குடுவையில் இருந்து எவற்றைக் கலப்பதின் மூலம் அமினோஅமிலங்களைத் தோற்று - வித்தார் ?**
- $800^{\circ}\text{C}$  -ல்  $\text{CH}_3, \text{H}_2, \text{NH}_4$  மற்றும் நீராவி
  - $600^{\circ}\text{C}$  -ல்  $\text{CH}_4, \text{H}_2, \text{NH}_3$  மற்றும் நீராவி
  - $600^{\circ}\text{C}$  -ல்  $\text{CH}_3, \text{H}_2, \text{NH}_3$  மற்றும் நீராவி
  - $800^{\circ}\text{C}$  -ல்  $\text{CH}_4, \text{H}_2, \text{NH}_3$  மற்றும் நீராவி
- 15. பிளாஸ்மோடியத்தின் தொற்று ஏற்படுத்தும் எந்த நிலை மனித உடலினுள் நுழைகிறது ?**
- ஸ்போரோசைட்டுகள்
  - பெண் காமிட்டோசைட்டுகள்
  - ஆண் காமிட்டோசைட்டுகள்
  - டுரோஃபோசைட்டுகள்
- 16. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது ?**
- அடினைன் ஒரு H-பினைப்பின் மூலம் தைமைன் உடன் இணைந்துள்ளது.
  - அடினைன் மூன்று H-பினைப்புகளின் மூலம் தைமைன் உடன் இணைந்துள்ளது.
  - அடினைன் தைமைனுடன் இணை - வதில்லை.
  - அடினைன் இரு H-பினைப்புகள் மூலம் தைமைன் உடன் இணைந்துள்ளது.
- 17. கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து சரியான இணையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.**
- பாலிமேரேஸ்கள் - DNA -வை துண்டங்களாக உடைக்கின்றன
  - நியூகிளியேஸ்கள் - DNA -னிரு இழை - களைப் பிரிக்கின்றன
  - எக்ஸோநியூக்ளி - DNA -வில் குறிப் பேஸ்கள் பிட்ட இடங்களில் வெட்டுகின்றன
  - லைகேஸ்கள் - இரு DNA மூலக்கூறு - களை இணைக்கின்றன
- 18. கரப்பான் பூச்சியின் தலையை நீக்கினால், அது சிறிது காலம் வாழும். எதனால் ?**
- கரப்பான் பூச்சியில் நரம்பு மண்டலம் காணப்படாது
  - தலையில் நரம்பு மண்டலத்தின் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமேள்ளது. மீதமுள்ளவை உடலின் வயிற்றுப் பகுதியில் உள்ளது
  - தலையில் 1/3 நரம்பு மண்டலம் உள்ளது. மீதமுள்ளவை உடலின் முதுகு புறத்தில் உள்ளது
  - கரப்பான் பூச்சியின் உணவு பாதை மேல் நரம்பனுத்திறள் வயிற்றின் கீழ் பகுதியில் அமைந்துள்ளது

19. சில பகுப்புறும் செல்கள் செல் சுழற்சியில் இருந்து விடுபட்டு செயலற்ற வளர்வடக்க நிலைக்கு செல்கின்றன. இதற்கு அமைதி நிலை ( $G_0$ ) என அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்வு எதன் முழுவில் நடைபெறும்?
- $G_1$  நிலை
  - $S$  நிலை
  - $G_2$  நிலை
  - $M$  நிலை
20. அரை கீழ்மட்ட சூலகப்பை இதில் உள்ளது :
- கடுகு
  - சூரியகாந்தி
  - பிளம்
  - கத்தரி
21. கடத்தியில் இணைக்கப்பட்ட DNA -வின் படி எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் தொடர்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன :
- Ori தளம்
  - பாலின்ட்ரோம் தொடர்
  - உணர்தல் தளம்
  - தெரிவுசெய்யக்கூடிய குறியீடு
22. ஆகாயத் தாமரை மற்றும் நீர் அல்லி ஆகியவற்றில் மகரந்தச் சேர்க்கை இவற்றின் மூலம் நடைபெறுகிறது.
- நீர் ஓட்டங்கள் மட்டும்
  - காற்று மற்றும் நீர்
  - பூச்சிகள் மற்றும் நீர்
  - பூச்சிகள் அல்லது காற்று
23. உயிரியுடன் அது தொடர்பான உயிர்நுட்பத்தில் அதன் பயனைப் பொருத்துக.
- பாசில்லஸ் (i) குளோனிங் துரின்ஜியன்சிஸ் கடத்தி
  - தெர்மஸ் (ii) முதல் rDNA அக்குவாடிகள் மூலக்கூறை உருவாக்குதல்
  - அக்ரோபா- (iii) DNA க்ஸியம் பாலிமரேஸ் குமிபேசியன்ஸ்
  - சால்மோனெல்லா (iv) Cry புரதங்கள் ஸ்டைபிழுரியம்
- சரியான விடையை கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்வு செய்யவும்.
- (a) (b) (c) (d)**
- (iv) (iii) (i) (ii)
  - (iii) (ii) (iv) (i)
  - (iii) (iv) (i) (ii)
  - (ii) (iv) (iii) (i)

24. படியெடுத்தவில் டி.என்.ஏ. ஹெலிக்சை திறக்க உதவும் நொதி எது?
- டி.என்.ஏ. ஹெலிக்கேஸ்
  - டி.என்.ஏ. பாலிமரேஸ்
  - ஆர்.என்.ஏ. பாலிமரேஸ்
  - டி.என்.ஏ. லைகேஸ்
25. கொடுக்கப்பட்ட நோய்கள் மற்றும் நோய்க் காரணிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.
- | தொகுதி - I              | தொகுதி - II             |
|-------------------------|-------------------------|
| (a) டைஃபாய்டு           | (i) ஊசெரிரியா           |
| (b) நிமோனியா            | (ii) பிளாஸ்மோடியம்      |
| (c) பைலாரியா            | (iii) சால்மோனெல்லா      |
| (d) மலேரியா             | (iv) ஹீமோஃபில்லஸ்       |
| <b>(a) (b) (c) (d)</b>  | <b>(a) (b) (c) (d)</b>  |
| (1) (iii) (iv) (i) (ii) | (1) (ii) (i) (iii) (iv) |
| (2) (ii) (i) (iii) (iv) | (2) (iv) (i) (ii) (iii) |
| (3) (iv) (i) (ii) (iii) | (3) (i) (iii) (ii) (iv) |
| (4) (i) (iii) (ii) (iv) | (4) (ii) (iii) (i) (iv) |
26. படிபெயர்த்தவின் முதல் நிலையாவது:
- DNA மூலக்கூறை கண்டறிதல்
  - tRNA -வின் அமைனோ அசைல் சேர்த்தல்
  - எதிர் குறியீடினை கண்டறிதல்
  - ரைபோசோம் mRNA உடன் இணைதல்
27. இரண்டாம் நிலை அண்ட செல்வில் குன்றல் பகுப்பு எந்த நிலையில் நிறைவடைகிறது?
- புனர்ச்சி நடை பெறும் நேரத்தில்
  - கரு உருவான பிறகு
  - விந்தனு மற்றும் அண்ட செல் இணையும் நேரத்தில்
  - அண்ட வெளியாதலுக்கு முன்
28. கூழ்ம மின் ஆற்றலால் பகுப்பின் மூலம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட DNA துண்டங்களை இதன் உதவியுடன் பார்க்க முடியும்:
- UV கதிர்வீச்சில் எத்திடியம் புரோமைடு
  - UV கதிர்வீச்சில் அசிடோகார்மைன்
  - அகச் சிவப்புக் கதிர்வீச்சில் எத்திடியம் புரோமைடு
  - பிரகாசமான நீல ஓளியில் அசிடோ-கார்மைன்

29. இன்டர்.ஃபேஸ் நிலையின் G<sub>1</sub> நிலை குறித்த சரியான கூற்று எது ?
- செல் உள்ளூறுப்புகள் அனைத்தும் மறு ஒருங்கமைதல் அடைகிறது
  - செல்வில் வளர்சிதை மாற்ற செயல்கள் நடைபெற்று, செல் வளர்கிறது; ஆனால் டி.என்.ஏ. இரட்டிப்படையாது
  - உட்கரு பிரிவு நடை பெறுகிறது
  - டி.என்.ஏ. உருவாக்கம் மற்றும் இரட்டிப் பாதல் நடைபெறுகிறது
30. கதிர் சிறுமலர்களில் காணப்படுகிறது :
- மேல்மட்ட சூலகப்பை
  - ஷஹப்போகைனஸ் சூலகப்பை
  - அரைக்மீழ்மட்ட சூலகப்பை
  - கீழ்மட்ட சூலகப்பை
31. உடற்குழியற்ற மற்றும் இருபக்க சமச்சீர் கொண்ட விலங்குகளின் தொகுதி எது ?
- தட்டை புழுக்கள்
  - அஸ்கெலமிந்தஸ்
  - அன்னலிடா
  - கேனோஃபோரா
32. கிளைகோசெடிக் பிணைப்பு மற்றும் பெப்படைடு பிணைப்பு ஆகியவற்றை அவற்றின் அமைப்பில் முறையே கொண்ட பொருட்களை கண்டறிக.
- கிளிசரால், ட்ரிப்சின்
  - செல்லுலோஸ், லெசித்தின்
  - இனுவின், இன்கலின்
  - கைடின், கொலஸ்ட்ரால்
33. உட்சவாசம் நிகழ்வுகளில் சரியானவை எவை ?
- உதிர் விதானம் சுருங்கல்
  - வெளி விலா எலும்பிடைத்தசைகள் சுருங்குதல்
  - நுரையீரல் கொள்ளளவு குறைதல்
  - நுரையீரலிடை அழுத்தம் அதிகரிக்கல்
- (c) மற்றும் (d)
  - (a), (b) மற்றும் (d)
  - (d) மட்டும்
  - (a) மற்றும் (b)
34. கீழ்கண்ட இணைகளில் ஒருசெல் அல்காக்களின் இணை எது ?
- ஜெலிடியம் மற்றும் கிராசிலேரியா
  - அன்டீனா மற்றும் வால்வாக்ஸ்
  - குளோரெல்லா மற்றும் ஸ்பெருவினா
  - லாமினோரியா மற்றும் சர்காசம்

35. கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

தொகுதி - I	தொகுதி - II
(a) எசினோ-ஃபில்கள்	(i) தடைகாப்பு துலங்கல்
(b) பேசோஃபில்கள்	(ii) செல் விழுங்குதல்
(c) நியூட்ரோ-ஃபில்கள்	(iii) ஹிஸ்டமினேஸ் அழிக்கும் நொதிகளை விடுவித்தல்
(d) லிம்போ-செட்டுகள்	(iv) ஹிஸ்டமின் கொண்ட துகள்களை விடுவித்தல்
<b>(a)      (b)      (c)      (d)</b>	
(1) (iv) (i) (ii) (iii)	
(2) (i) (ii) (iv) (iii)	
(3) (ii) (i) (iii) (iv)	
(4) (iii) (iv) (ii) (i)	

36. பெண்குவின் மற்றும் டால்.ஃபினின், ஃபினிப்பர்கள். இதற்கு எடுத்துக்காட்டு :
- குவி பரினாமம்
  - தொழிற்சாலை மெலானின் ஆக்கம்
  - இயற்கைத் தேர்வு
  - தழுவிப்பரவல்
37. புருங் விளிம்பு நுண் வில்லைகளை கொண்ட கன சதுர வடிவ எபிதீவியம் எங்கு காணப்படும் ?
- உமிழ் நீர் சுரப்பியின் நாளங்கள்
  - நெ.ஃப்ரானின் அன்மை சுருள் நுண்குழல்கள்
  - பூஸ்டேலியன் குழாய்
  - குடலின் உட்படலம்

38. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) 6 - 15 இணைகள் (i) டிரைகான் செவுள் பிளவுகள்
  - (b) ஹெட்டிரோ- (ii) வட்ட வாய்கள் செர்கள் வால் துடுப்பு
  - (c) காற்று பை (iii) காண்டிரிக்தீஸ்
  - (d) நங்க கொடுக்கு (iv) ஆஸ்டெக்தீஸ்
- (a) (b) (c) (d)
  - (1) (iii) (iv) (i) (ii)
  - (2) (iv) (ii) (iii) (i)
  - (3) (i) (iv) (iii) (ii)
  - (4) (ii) (iii) (iv) (i)

39. தாவரத்தின் பாகங்கள், ஒன்றின் உள்மற்றொன்று என இரு தலைமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது :

- (a) மகரந்தப்பையின் உள்ளே மகரந்தத் துகள்கள்
  - (b) இரண்டு ஆண் கேமீட்டுகள் உடைய முளைத்த மகரந்தத் துகள்கள்
  - (c) கனியின் உள்ளே விதை
  - (d) சூவின் உள்ளே சூவிப்பை
- (1) (a), (b) மற்றும் (c)
  - (2) (c) மற்றும் (d)
  - (3) (a) மற்றும் (d)
  - (4) (a) மட்டும்

40. எதனைக் கட்டுப்படுத்த 1987-ல் மான்ட்ரியல் பிரகடனம் கையொப்பமிடப்பட்டது ?

- (1) ஓசோனை அழிக்கும் பொருட்களின் வெளியீடு
- (2) பசுமை இல்ல வாயுக்களின் வெளியீடு
- (3) மின்னணு கழிவுகளை அகற்றுதல்
- (4) மரபு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்களை ஒரு நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டிற்கு கொண்டு செல்லுதல்

41. விலங்குகளில் அதிக அளவு காணப்படும் புரதம் எது ?

- (1) கொல்லாஜன்
- (2) வெக்டின்
- (3) இன்சலின்
- (4) வீமோகுளோபின்

42. EcoRI கண்டறியும் பாலின்டுரோமிக் வரிசை எது ?

- (1) 5' - GGAACC - 3'
- 3' - CCTTGG - 5'
- (2) 5' - CTTAAG - 3'
- 3' - GAATTC - 5'
- (3) 5' - GGATCC - 3'
- 3' - CCTAGG - 5'
- (4) 5' - GAATTC - 3'
- 3' - CTTAAG - 5'

43. இரண்டு கார இணைகளுக்கிடையில் உள்ள தூரம்  $0.34 \text{ nm}$  மற்றும் இயல்பு பாலுட்ட செல்லின் மொத்த கார இணைகள்  $6.6 \times 10^9 \text{ bp}$  எனில், டி.என்.ஏ. -வின் நீளம் தோராயமாக எது ?

- (1) 2.5 மீட்டர்கள்
- (2) 2.2 மீட்டர்கள்
- (3) 2.7 மீட்டர்கள்
- (4) 2.0 மீட்டர்கள்

44. பயறுவகைத் தாவரங்களின் வேர் முண்டுகளில் நைட்ரோஜினேஸ் மூலமாக விணையுக்கப்பட்ட வேதி விணையின் விளைப் பொருள்கள் :

- (1) நைட்ரேட் மட்டும்
- (2) அம்மோனியா மற்றும் ஆக்ஸிஜன்
- (3) அம்மோனியா மற்றும் ஹெட்ரஜன்
- (4) அம்மோனியா மட்டும்

45. மனிதர்கள் செயல்பாட்டால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் கீழ்கண்ட எவ்வில் பரிணாமமடைந்தன ?

- (a) காலபகோஸ் தீவில் உள்ள டார்வின் சிட்டுக் குருவிகள்
- (b) களைச் செடிகளில் களைகொல்லி எதிர்ப்பு யூகேரியோட்டுகளில் மருந்துப்-பொருளுக்கு எதிர்ப்பு
- (c) மனிதன் உருவாக்கிய நாய்கள் போன்ற வீட்டு விலங்கின வகைகள்
- (1) (a) மற்றும் (c)
- (2) (b), (c) மற்றும் (d)
- (3) (d) மட்டும்
- (4) (a) மட்டும்

46. கீழ்கண்ட வற்றுள் பூமியின் எப்பகுதிகளில் அதிக அளவில் சிற்றினப் பன்மயம் காணப்படுகிறது ?

- (1) மடகால்கர்
- (2) இமய மலை
- (3) அமேசான் காடுகள்
- (4) இந்தியாவின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை

47. மெய்யுட்கரு செல்களில் கிளைகோ புரதங்கள் மற்றும் கிளைகோவிபிடுகள் உருவாகும் முக்கியமான இடம் எது?
- பெராக்சிசோம்கள்
  - கோல்கை உடலங்கள்
  - பாலிசோம்கள்
  - எண்டோபிளாச வலை
48. ஒரு எதிரிடைப் பண்புக் கூறு தவிர்த்து ஏனையவை ஒத்த எத்தனை ஜோடிப் பண்புகளை மெண்டல் தனித்த தூயவழி பட்டாணித் தாவர வகைகளில் தேர்ந்தெடுத்தார்?
- 2
  - 14
  - 8
  - 4
49. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.
- | தொகுதி - I          | தொகுதி - II                                |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|
| (a) மிதக்கும் விலா  | (i) இரண்டு மற்றும் எலும்புகள்              |            |            |
|                     | ஏழாவது விலா எலும்புகளி-டையில் அமைந்துள்ளது |            |            |
| (b) ஆக்ரோமியான்     | (ii) ஹியூமரஸின் தலை பகுதி                  |            |            |
| (c) ஸ்கேப்புலா      | (iii) கிளாவிக்கிள்                         |            |            |
| (d) கிளீனாய்டு குழி | (iv) ஸ்டெர்ன்த-தோடு இணைந்திராது            |            |            |
| <b>(a)</b>          | <b>(b)</b>                                 | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1) (i)             | (iii)                                      | (ii)       | (iv)       |
| (2) (iii)           | (ii)                                       | (iv)       | (i)        |
| (3) (iv)            | (iii)                                      | (i)        | (ii)       |
| (4) (ii)            | (iv)                                       | (i)        | (iii)      |
50. முழுவதும் பால் வினை நோய்கள் அடங்கியது எது?
- கொனோரியா, மலேரியா, ஜெனிட்டல் ஹோபிஸ்
  - எய்ட்ஸ், மலேரியா, ஃபைலேரியா
  - புற்றுநோய், எய்ட்ஸ், சிஃபிலிஸ்
  - கொனோரியா, சிஃபிலிஸ், ஜெனிட்டல் ஹோபிஸ்

51. வறையறு நொதிகள் குறித்து தவறான கூற்று எது?
- பாலின்ட்ரோமிக் பகுதிகளில் டி.என்.ஏ. இழைகளை அவை வெட்டுகிறது.
  - மரபு பொறியியலில் அவை பயன் படுகிறது.
  - ஒட்டும் முனைகள் டி.என்.ஏ. லைகேஸ் மூலம் இணைக்கப்படுகிறது.
  - ஒவ்வொரு வறையறு நொதியும் டி.என்.ஏ. -வின் முழு நீளத்தை ஆராய்கிறது.

52. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

தொகுதி - I	தொகுதி - II
(a) கிளாஸ்டிரீடியம்	(i) சைக்ளோஸ் பூட்டிலிக்கம்
(b) டிரைக்கோடெர்மா	(ii) பியூட்ரிக் பாலிஸ்போரம்
(c) மேரனாஸ்கஸ்	(iii) சிட்ரிக் அமிலம் பர்சுரியஸ்
(d) ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்	(iv) இரத்த ரைகர் கொலஸ்டிரால் குறைக்கும் காரணி

(a)	(b)	(c)	(d)
(1) (ii)	(i)	(iv)	(iii)
(2) (i)	(ii)	(iv)	(iii)
(3) (iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4) (iii)	(iv)	(ii)	(i)

53. குன்றல் பகுப்பு குறித்த கீழ்கண்டவற்றைப் பொருத்துக.
- சைகோன்
  - பாக்கைண்
  - டிப்ளோன்
  - டையாகைனசிஸ்
- (i) முடிவடைதல்
- (ii) கையாஸ்மாக்கள்
- (iii) குறுக்கெதிர் மாற்றம்
- (iv) சினாப்சிஸ் கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a)	(b)	(c)	(d)
(1) (iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2) (i)	(ii)	(iv)	(iii)
(3) (ii)	(iv)	(iii)	(i)
(4) (iii)	(iv)	(i)	(ii)

54. ஆக்சிஜன் கடத்தல் குறித்த தவறான கூற்று எது?
- கார்பன் டை ஆக்சைடின் பகுதி அமுத்தம் ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினோடு இணைத்தில் தலையிடும்.
  - நுண்ணறையில் உயர்  $H^+$  அடர்வு ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் உருவாதலுக்கு உதவுகிறது.
  - நுண்ணறையில் குறை  $pCO_2$  அக்சி ஹீமோகுளோபின் உருவாதலுக்கு உதவுகிறது.
  - ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினோடு இணைவது ஆக்சிஜனின் பகுதி அமுத்தத் தோடு தொடர்புடையது.
55. நீர்த்த சிறுநீர் உருவாதலை தடுக்கும் காரணி எது?
- ஆல்டோஸ்டிரோன் விளைவால் சிறு நீர் குழல்களில்  $Na^+$  மற்றும் நீர் மீள உறிஞ்சப்படுதல்
  - ஏட்ரியல் நாட்ரியூர்ட்டிக் காரணி இரத்த நாள் சுருக்கியாக செயல்படுகிறது
  - JG செல்கள் ரெனின் சுரத்தலை குறைக்கிறது
  - குறைவான ADH சுரக்கப்படுவதால் அதிக நீர் மீள உறிஞ்சப்படல்
56. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் உள்ளடக்கப் பொருட்கள் குறித்த எது சரியானதல்ல?
- உணவுத் துகள்களின் உள் விழுங்குதலில் ஈடுபடுகின்றன.
  - செட்டோபிளாசத்தில் தனித்து உள்ளவை.
  - அவை செட்டோபிளாசத்தில் இருப்புப் பொருளாக உள்ளவை.
  - எந்த சவ்வாலும் சூழப்படவில்லை.
57. பேசில்லஸ் தூரின்ஜியன்சிஸ்ஸின் நச்ச ஜீனை உட்செலுத்தி உருவாக்கப்பட்ட Bt பஞ்ச வகை எதற்கு எதிர்ப்பு?
- பூஞ்சை நோய்கள்
  - தாவர நெமட்டோடுகள்
  - பூச்சி கொன்று தின்னிகள்
  - பூச்சி தீங்குயிரிகள்

58. ஹிசார்டேல் என்ற புதிய வகை செம்மறி ஆடு பிக்கானரி ஈவுகள் மற்றும் மரினோ ராம்களை எவ்வகை கலப்பு மேற்கொண்டு உருவாக்கப் பட்டது?
- திசீர் மாற்ற கலப்பு
  - குறுக்கு கலப்பு
  - உள் கலப்பு
  - வெளி கலப்பு
59. தொகுதி கார்டேட்டா பற்றிய சரியான கூற்றுகள் யாது?
- வால் நாணிகளில் முதுகுநாண் தலை முதல் வால் வரை வாழ்காலம் முழுவதும் காணப்படும்.
  - முதுகெலும்புகளில் முதுகு நாண் கருவளர்ச்சிக் காலத்தில் மட்டும் காணப்படும்.
  - மைய நரம்புத் தொகுதி முதுகுபுறத்தில் உள்ளீடற்றி நரம்பினை கொண்டது.
  - கார்டேட்டா மூன்று துணை தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது; அரை நாணிகள், மேலீக்கேட்டா மற்றும் தலை நாணிகள்.
- (c) மற்றும் (a)
  - (a) மற்றும் (b)
  - (b) மற்றும் (c)
  - (d) மற்றும் (c)
60. சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு.
- குளுக்கான் வைப்போ கிளைசீமியா வோடு தொடர்புடையது.
  - இன்சலின் கணைய செல்கள் மற்றும் அடிப்போசைட்டுகளுடன் செயல் படுகிறது.
  - இன்சலின் உயர் கிளைசீமியாவோடு தொடர்புடையது.
  - குளுக்கோகார்டிகாய்டுகள் குளுக்கோ நியோ ஜெனிசிஸ்ஸை தூண்டுகிறது.

61. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) கூட்டமாக வாழும், அனைத்துண்ணும் தீங்குயிரி
  - (b) நிறையுயிரி அரசமச்சீர் கொண்டவை இளவுயிரி இருபக்க சமச்சீர் கொண்டவை
  - (c) புத்தக நூரை யீரல்
  - (d) உயிர் ஒளி
- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1)        | (iv)       | (i)        | (iii)      |
| (2)        | (iii)      | (ii)       | (iv)       |
| (3)        | (ii)       | (i)        | (iii)      |
| (4)        | (i)        | (iii)      | (ii)       |

**தொகுதி - II**

- (i) ஆஸ்டெ-ர்யாஸ்
- (ii) தேள் கொண்டவை
- (iii) மேனோ-பிளானா
- (iv) லோகஸ்டா

62. புல் சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உண்ணுட்ட நிலைகளுடன் சரியான சிற்றின உதாரணங்களைப் பொருத்தவும்.

- (a) நான்காம் உண்ணுட்ட நிலை
- (b) இரண்டாம் உண்ணுட்ட நிலை
- (c) முதலாம் உண்ணுட்ட நிலை
- (d) மூன்றாம் உண்ணுட்ட நிலை

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1)        | (iii)      | (ii)       | (iv)       |
| (2)        | (iv)       | (iii)      | (ii)       |
| (3)        | (i)        | (ii)       | (iii)      |
| (4)        | (ii)       | (iii)      | (iv)       |

63. கரும்புப் பயிரின் மீது தெளிக்கும் போது தண்டின் நீளத்தை அதிகரித்து கரும்பின் விளைச்சலை அதிகரிக்கும் தாவர வளர்ச்சி ஊக்கியின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

- (1) ஜிப்ரல்லின்
- (2) எத்திலீன்
- (3) அப்சிசிக் அமிலம்
- (4) செட்டோகைனின்

64. கீழ்கண்டவற்றுள் விதை உறக்கத்தை தடை செய்யும் பொருள் எதுவல்ல?

- (1) அப்சிசிக் அமிலம்
- (2) பினாலிக் அமிலம்
- (3) பாரா - அஸ்கார்பிக் அமிலம்
- (4) ஜிப்ரல்லிக் அமிலம்

65. ஒரு சூழ்நிலை மண்டலத்தின் மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் மற்றும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் ஆகியவை தொடர்படைய கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானது எது?

- (1) மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் எப்போதும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித் திறனை விட அதிகமாக உள்ளது.
- (2) மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் மற்றும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் ஆகியவை ஒன்றேயாகும்.
- (3) மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் மற்றும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் ஆகியவற்றின் இடையே எந்தத் தொடர்பும் இல்லை.
- (4) நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித் திறனை விட, மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் எப்போதும் குறைவாக உள்ளது.

66. என்டிரோகைனேஸ் என்ற நொதி எதன் மாற்றத்திற்கு உதவுகிறது?

- (1) டிரிப்சினேஜன் → டிரிப்சின்
- (2) கெசினோஜன் → கெசீன்
- (3) பெப்சினோஜன் → பெப்சின்
- (4) புரதம் → பாலிப்பெப்படைடு

67. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

- | <b>தொகுதி - I</b> | <b>தொகுதி - II</b>                          |
|-------------------|---|
| (a) Bt பருத்தி    | (i) ஜீன் சிகிச்சை                           |
| (b) அடினேசைன்     | (ii) செல் வகை டிஅமினேஸ் குறைபாடு            |
| (c) ஆர்.என்.ஏ.    | (iii) வெலுச் ஜீ வி இடையீடு தொற்றை கண்டறிதல் |
| (d) பி.சி.ஆர்.    | (iv) பேசில்லஸ் துரின் ஜியன்சிஸ்             |

- | <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
|------------|------------|------------|------------|
| (1)        | (iii)      | (ii)       | (i)        |
| (2)        | (ii)       | (iii)      | (iv)       |
| (3)        | (i)        | (ii)       | (iii)      |
| (4)        | (iv)       | (i)        | (ii)       |

68. கொடுக்கப்பட்டவைகளுள் கார அமினோ அமிலம் எது?

- குளுட்டாமிக் அமிலம்
- லைசின்
- வாலென்
- தெரோசின்

69. தாவரங்களில் இன்றியமையாத மூலங்கள் மற்றும் அவற்றின் செயல்கள் குறித்த கீழ்கண்டவற்றை பொருத்துக.

- இரும்பு (i) ஓளிசார் நீர் பகுப்பு
- துத்தநாகம் (ii) மகரந்தத்துகள் முளைத்தல்
- போரான் (iii) குளோரோபில் உயிர்ம வழி உருவாக்கத்தில் தேவைப் படுவது
- மாங்கனீசு (iv) IAA உயிர்மவழி உருவாக்கம்

**சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும்.**

**(a) (b) (c) (d)**

- (iv) (iii) (ii) (i)
- (iii) (iv) (ii) (i)
- (iv) (i) (ii) (iii)
- (ii) (i) (iv) (iii)

70. சிறுநீரில் கீழ்கண்ட எந்த பொருள் காணப்பட்டால், டயாபிட்டிஸ் மெல்லிட்டிற்கு அறிகுறியாகும்?

- யுரேமியா மற்றும் சிறுநீர் கற்கள்
- கீட்டோனூரியா மற்றும் கிளைகோகுரியா
- சிறுநீர் கற்கள் மற்றும் உயர் கிளைகோ-குரியா
- யுரேமியா மற்றும் கீட்டோனூரியா

71. கீழ்கண்டவற்றுள் விராய்டுகள் குறித்த சரியானது எது?

- அவை புரத உறையற்று தனித்த RNA கொண்டுள்ளவை
- அவை புரத உறையுடன் DNA கொண்டுள்ளவை
- அவை புரத உறையற்று தனித்த DNA கொண்டுள்ளவை
- அவை புரத உறையுடன் RNA கொண்டுள்ளவை

72. கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

தொகுதி - I	தொகுதி - II
(a) கார்டை உறுப்பு	(i) நடு காது பகுதியை தொண்டை-யோடு இணைக்கிறது
(b) காக்ளியா	(ii) லாபிரிந்தின் சுருண்ட பகுதி
(c) ஷஸ்டெசியன்	(iii) நீள்வட்ட குழல் பலகணியோடு இணைந்துள்ளது
(d) ஸ்டேபிள்	(iv) பேசில்லார் சவ்வில் அமைந்துள்ளது

<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>
(1) (iii)	(i)	(iv)	(ii)
(2) (iv)	(ii)	(i)	(iii)
(3) (i)	(ii)	(iv)	(iii)
(4) (ii)	(i)	(iii)	(iv)

73. நிகோடின், ஸ்டரிக்னென், மற்றும் கேஃபென் போன்ற இரண்டாம் நிலை வளர்சிதைப் பொருத்கள் தாவரங்களால் இதற்காக உற்பத்தி செய்யப் படுகின்றன :

- வளர்ச்சி பிரதிபலிப்பு
- பாதுகாப்புச் செயல்
- இனப்பெருக்கத்தின் மீதுள்ள செயற்பாடு
- ஊட்டச் சத்துக் குறிய திறன்

74. ராபர்ட் மே -இன் கருத்தின்படி புவியின் சிற்றினப் பன்மயம் சுமார் :

- 20 மில்லியன்
- 50 மில்லியன்
- 7 மில்லியன்
- 1.5 மில்லியன்

75. சூவின் உடலம் பிழுனிகினில் இணைந்து காணப்படும் பகுதி :

- சூல் துளை
- நிழுசெல்லஸ் (சூல் திச)
- சலாசா
- ஞைலம் (சூல் தழும்பு)

- 76.** கீழ்கண்டவற்றுள் **தவறான கூற்று** எது ?
- முன் இன்சலினில் ஒரு கூடுதல் பெப்டைடு, C-பெப்டைடு உள்ளது
  - செயல்படு இன்சனில், A மற்றும் B சங்கிலி வைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் இணைந்திருக்கும்
  - மரபு பொறியியல் மூலம் ஈ-கோலையில் இன்சலின் உருவாக்கப்படுகிறது
  - மனிதனில் இன்சலின் ஒரு முன்-இன்ச-லினாக உருவாக்கப்படுகிறது
- 77.** நோய் தடைக்காப்பு குறித்த **தவறான கூற்று** எது ?
- ஆன்டிபாடிகளை நேரடியாக செலுத்துதல் மந்தமான நோய் தடைகாப்பாகும்.
  - ஆற்றல் மிகு நோய் தடைகாப்பு உடனடியாகவும் முழு துலங்கலை கொடுக்கும்.
  - வளர் கரு தாயிடமிருந்து ஆன்டிபாடிகளை பெற்றுக் கொள்ளும். இது மந்தமான நோய்தடைக்காப்புக்கு எடுத்துக் காட்டு.
  - உயிர் அல்லது செயலிழந்த ஆன்டி-ஜெஜன்கள் ஓம்புயிரியில் செலுத்தப் பட்டால் அவை ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கும். இது ஆற்றல் மிகு நோய் தடைகாப்பாகும்.
- 78.** அடி தண்டிலிருந்து தோன்றும் வேர்கள் :
- முதல் நிலை வேர்கள்
  - தூண் வேர்கள்
  - பக்கவாட்டு வேர்கள்
  - சல்வி வேர்கள்
- 79.** சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் ஒரு சுழலின் போது தளப் பொருள் பாஸ்பாரிகரணம் நடைபெறுவதன் எண்ணிக்கை :
- ஒன்று
  - இரண்டு
  - மூன்று
  - ஷுஜ்ஜியம்
- 80.** பார்ம்பரியத்திற்கான குரோமோசோம் கோட்பாட்டின் சோதனை சரிபார்ப்பு இவரால் நடத்தப் பட்டது :
- சட்டன்
  - பொவேரி
  - மார்கான்
  - மெண்டல்
- 81.** புற்களின் இலை நுனியில் நீர் திரவ நிலையில் இரவிலும் அதிகாலையிலும் வடிவதற்கு காரணமான நிகழ்வு எது ?
- வேர் அழுத்தம்
  - உள்ளீர்த்தல்
  - பிளாஸ்மா சிதைவு
  - நீராவிப்போக்கு
- 82.** ஒளிசுவாசத்தில் RuBisCo நொதியின் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிகழ்வால் தோன்றுவது :
- 1 மூலக்கூறு 3-கார்பன் பொருள்
  - 1 மூலக்கூறு 6-கார்பன் பொருள்
  - 1 மூலக்கூறு 4-கார்பன் பொருள்
  - 1 மூலக்கூறு 2-கார்பன் பொருள்
  - 2 மூலக்கூறுகள் 3-கார்பன் பொருள்
- 83.** ABO இரத்த வகையை கட்டுப்படுத்தும் 'I' ஜீன் குறித்த **தவறான கூற்று** எது ?
- ஒரு நபரிடத்தில் மூன்றில் இரண்டு அலீல்கள் மட்டும் காணப்படும்.
  - 'IA' மற்றும் 'IB' இரண்டும் இருந்தால், ஒரே வகையான சர்க்கரையை வெளிபடுத்துகிறது.
  - 'I' அலீல் எந்த சர்க்கரையையும் உருவாக்குவதில்லை.
  - ஜீன் 'I' மூன்று அலீல்கள் கொண்டுள்ளது.
- 84.** கீழ்கண்ட எது காற்றற்ற சிலட்ஜ் டைஜிஸ்டரில் சேர்க்கப்பட்டு தொடர்ந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிகழ்த்தப்படுகிறது ?
- மிதக்கும் டெப்ரிஸ்கள்
  - முதல் நிலை சுத்திகரிப்புக்குப்பின் உள்ள கழிவுநீர்
  - செயல்படுத்தப்பட்ட சிலட்ஜ்
  - முதல் நிலை சிலட்ஜ்
- 85.** பரிணாமம் குறித்த கருவியல் சான்றினை தவறென நிரூபித்தவர் :
- ஆல்பிரட் வாலஸ்
  - சார்லஸ் டார்வின்
  - ஓபாரின்
  - கார்ல் எர்ன்ஸ்ட் வான் பேர்

86. ஃபுளோரிடியன் தரசம் இதற்கு இணையான அமைப்பைக் கொண்டது.

- அமைலோ பெக்டின் மற்றும் கிளை-கோஜன்
- மான்னிடால் மற்றும் ஆல்ஜின்
- லாமினாரின் மற்றும் செல்லுலோஸ்
- தரசம் மற்றும் செல்லுலோஸ்

87. கீழ்கண்டவற்றைப் பொருத்துக.

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| (a) வினையுக்கசெயல்                      | (i) ரிசின் பாடுகளை தடுப்பவை          |
| (b) பெப்டைடுபினைப் புகளைக் கொண்டவை      | (ii) மெலோ-னெட்                       |
| (c) பூஞ்சைகளில் செல்-சுவர் பொருள்       | (iii) கைட்டின் வளர்ச்சிதைப்பொருட்கள் |
| (d) இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிதைப்பொருட்கள் | (iv) கொல்லோஜென்                      |

கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

**(a) (b) (c) (d)**

- (iii) (i) (iv) (ii)
- (iii) (iv) (i) (ii)
- (ii) (iii) (i) (iv)
- (ii) (iv) (iii) (i)

88. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- பிட்யூட்டரி (i) கிரேவிஸ் நோய் சுரப்பி

- தெராய்டு சுரப்பி (ii) டையாபிட்டிஸ் மெல்லிட்டாஸ்

- அட்ரீனல் சுரப்பி (iii) டையாபிட்டிஸ் இன்சிபிடாஸ்

- கணையம் (iv) அட்டிசன் நோய்

**(a) (b) (c) (d)**

- (iii) (ii) (i) (iv)
- (iii) (i) (iv) (ii)
- (ii) (i) (iv) (iii)
- (iv) (iii) (i) (ii)

89. ஒரு தாவரப் பகுதியின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் கீழ்கண்ட உள்ளமைப்பு பண்புகள் காணப்படுகின்றன :

- கற்றை உறையால் சூழப்பட்ட அதிக எண்ணிக்கையிலான வாஸ்குலார் கற்றைகள் சிதறிக் காணப்படும்.
- பெரிய அளவிலான, தெறிவான பாரன் கைமாவாலான தளத் திசு.
- வாஸ்குலார் கற்றைகள் ஒருங்கமைந்தவை மற்றும் மூடியவை.
- புளோயம் பாரன்கைமா காணப்படவில்லை.

தாவரத்தின் வகையினையும் அதன் பகுதியையும் கண்டறிக.

- ஒருவித்திலைத்தாவர வேர்
- இருவித்திலைத்தாவரத் தண்டு
- இருவித்திலைத்தாவர வேர்
- ஒருவித்திலைத்தாவரத் தண்டு

90. ஒளி வினையின் போது எலெக்ட்ரான்கள் இவற்றிலிருநு கடத்தப்படுவதை பிளாஸ்டோ குயினோன் துணை புரிகிறது :

- Cytb<sub>6f</sub> கூட்டமைப்பிலிருந்து PS-I
- PS-I -லிருந்து NADP<sup>+</sup>
- PS-I -லிருந்து ATP சிந்தேஸ்
- PS-II -விலிருந்து Cytb<sub>6f</sub> கூட்டமைப்பு

91. ஒரு விண்மீனிலிருந்து, 600 nm அலைநீளம் கொண்ட ஒளி வருகிறது என அனுமானிக்க. 2 m விட்டம் கொண்ட பொருளாருகு வில்லையை கொண்ட தொலைநோக்கியினது பகுதிறன் வரம்பு என்பது :

- $1.83 \times 10^{-7}$  rad
- $7.32 \times 10^{-7}$  rad
- $6.00 \times 10^{-7}$  rad
- $3.66 \times 10^{-7}$  rad

92. <sup>235</sup>U எனும் யுரேனிய ஐஸோடோப், நியூட்ரான் கொண்டு தாக்கப்படும் போது, <sup>89</sup>Kr மற்றும் மூன்று நியூட்ரானோடு உருவாக்கப்படுவது :

- <sup>91</sup>Zr
- <sup>101</sup>Kr
- <sup>103</sup>Kr
- <sup>144</sup>Ba

93. ஒரு சிறிய மின் இருமுனை,  $16 \times 10^{-9} \text{ C m}$  எனும் இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றுள்ளது. இருமுனை அச்சோடு  $60^\circ$  எனும் கோணத்தினை மேற்கொண்டுள்ள ஒரு கோட்டில், இருமுனை மையத்திலிருந்து  $0.6 \text{ m}$  தூரத்தில் அமைந்துள்ளதொரு புள்ளியில் இருமுனையினால் ஏற்படும் மின்னழுத்த மதிப்பு என்பது :  $\left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$
- 200 V
  - 400 V
  - சுழி
  - 50 V
94. (A எனும் முப்பட்டக்கோணம் கொண்ட) ஒரு குறுங்கோண முப்பட்டகத்தின் ஒரு பரப்பில், ஓர் ஒளிக்கதிரானது,  $i$  எனும் வீழ்கோணத்தில் விழுகிறது. மேலும் அது எதிர்ப்பக்க பரப்பு வழியாக செங்குத்தாக வெளியேறுகிறது. முப்பட்டக பொருளின் ஒளி விலகல் என்,  $\mu$ , எனில், வீழ் கோணம் ஏற்கக்குறைய சமமாக இருப்பது :
- $\frac{2A}{\mu}$
  - $\mu A$
  - $\frac{\mu A}{2}$
  - $\frac{A}{2\mu}$
95. புவியினது பரப்பில், ஒரு பொருள்,  $72 \text{ N}$  என்ற எடையைப் பெற்றுள்ளது. புவியினது ஆரத்தின் பாதிக்குச் சமமான உயரத்தில், அதன் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை, யாது ?
- 32 N
  - 30 N
  - 24 N
  - 48 N
96. போர் மாதிரி, பின்வருவனவற்றில் எதற்கு பொருந்தமற்றாக அமையும் ?
- ஒற்றை அயனியாக்கமடைந்த ஹீலியம் அனு ( $\text{He}^+$ )
  - ட்ரூடிரான் அனு
  - ஒற்றை அயனியாக்கமடைந்த நியான் அனு ( $\text{Ne}^+$ )
  - வைட்ரஜன் அனு

97.  $r$  ஆரம் கொண்டதொரு நுண்துளை குழாய், நீரில் அமிழ்த்தப் படுகிறது. அதில் நீரானது,  $h$  உயரம் எழும்புகிறது, நுண்துளையிலுள்ள நீரது நிறை,  $5 \text{ g}$  ஆகும்.  $2r$ , ஆரம் கொண்ட மற்றொரு நுண்துளைகுழாயில் எழும்பக் கூடிய நீரது நிறை என்பது :
- 5.0 g
  - 10.0 g
  - 20.0 g
  - 2.5 g
98. ஒரு திருகு அளவி,  $0.01 \text{ mm}$  எனும் மீச்சிற்றளவினையும், மேலும் தனது வட்ட அளவுகோலில் 50 பிரிவுகளையும் பெற்றுள்ளது. அத்திருகு அளவியின், புரி என்பது :
- 0.25 mm
  - 0.5 mm
  - 1.0 mm
  - 0.01 mm
99. 599 எனும் ஏற்புத்திறனுடைய ஓர் இரும்புத் தண்டு,  $1200 \text{ A m}^{-1}$  எனும் காந்தமாக்கு புலத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. தண்டு செய்யப்பட்ட பொருளின் உட்பகுதிறன் என்பது : ( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ )
- $8.0 \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
  - $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
  - $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
  - $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
100. சீரிசை இயக்கத்திலுள்ள துகள் ஒன்றின் இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் முடுக்கம் ஆகியவற்றிற் கிடையிலான கட்ட வேறுபாடு என்பது :
- $\frac{3\pi}{2} \text{ rad}$
  - $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
  - சுழி
  - $\pi \text{ rad}$
101. ஒரு பொருளது  $0.5 \text{ g}$ -ற்கான ஆற்றல் சமன் என்பது :
- $4.5 \times 10^{13} \text{ J}$
  - $1.5 \times 10^{13} \text{ J}$
  - $0.5 \times 10^{13} \text{ J}$
  - $4.5 \times 10^{16} \text{ J}$

- 102.** ஒரு மீட்டர் சமனச்சுற்றின் இடது இடைவெளியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதோரு மின்தடைக்கம்பி, வலது இடைவெளியில் உள்ள  $10 \Omega$  மின்தடையோடு சமன் செய்து கொள்ளும் புள்ளி, சமனச்சுற்றுக் கம்பியினை,  $3 : 2$  என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கிறது. மின்தடை கம்பியின் நீளம்,  $1.5 \text{ m}$  எனில், மின்தடை கம்பியின்  $1 \Omega$ -மிற்கான நீளம் என்பது :
- $1.0 \times 10^{-1} \text{ m}$
  - $1.5 \times 10^{-1} \text{ m}$
  - $1.5 \times 10^{-2} \text{ m}$
  - $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$
- 103.** ஒற்றையனு வாயு ஒன்றின் சராசரி வெப்பவியல் ஆற்றல், என்பது : ( $k_B$  என்பது போல்ஸ்ட்மென் மாறிலி மற்றும்  $T$ , தனி வெப்பநிலை)
- $\frac{3}{2} k_B T$
  - $\frac{5}{2} k_B T$
  - $\frac{7}{2} k_B T$
  - $\frac{1}{2} k_B T$
- 104.** ஒரு மின்காந்த அலையினது செறிவுக்கு, அதன் மின்புல மற்றும் காந்தப்புலக் கூறுகள் அளிக்கும் பங்களிப்புகளின் விகிதமானது :
- $(c = EM$
- அலையினது வேகம்)
- $1 : 1$
  - $1 : c$
  - $1 : c^2$
  - $c : 1$
- 105.** கோபுரம் ஒன்றின் உச்சியிலிருந்து, ஒரு பந்து,  $20 \text{ m/s}$  எனும் திசை வேகத்தில் கீழ்நோக்கி செங்குத்தாக ஏறியப்படுகிறது. அது, சிறிது நேரத்திற்குப்பிறகு  $80 \text{ m/s}$  என்ற திசை வேகத்தில் தரையைத் தொடுகிறது, எனில் கோபுரத்தின் உயரம் : ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )
- $340 \text{ m}$
  - $320 \text{ m}$
  - $300 \text{ m}$
  - $360 \text{ m}$

- 106.**  $50 \text{ cm}$  நீளமும்,  $100 \text{ சம்பூர்த்தி}$  உடையதோரு நீள்வரிச்சுருள்,  $2.5 \text{ A}$  மின்னோட்டத் தினை தாங்கிச் செல்கிறது. நீள் வரிச்சுருளின் மையத்தில் உள்ள காந்தப்புலம் என்பது : ( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ )
  - $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$
  - $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$
  - $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$
  - $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$

**107.** தனிச்சிறப்பு மிக்க இலக்கங்களை கருத்தில் கொள்ளுகையில்,  $9.99 \text{ m} - 0.0099 \text{ m}$  என்பதன் மதிப்பு யாது ?

  - $9.98 \text{ m}$
  - $9.980 \text{ m}$
  - $9.9 \text{ m}$
  - $9.9801 \text{ m}$

**108.** பயன்தொடக்க அதிர்வெண்ணின்  $1.5 \text{ மடங்கு}$  அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி, ஒரு ஒளி உணர்வு நுட்ப பொருள்மீது விழுகிறது. அதிர்வெண் பாதியாகவும், செறிவு இரட்டிப்பாகவும் ஆக்கப்படும்போது, ஒளி மின்னோட்டம் என்னவாகும் ?

  - நான்கு மடங்காகும்
  - நான்கில் ஒரு பங்காகும்
  - சூழியாகும்
  - இரட்டிப்பாகும்

**109.** ஒரு மின்தடையினது நிறக்குறியீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.




மஞ்சள் ஊதா பழுப்பு பொன்னிறம் மின்தடை மற்றும் சகிப்புத்தன்மை ஆகியவற்றின் மதிப்புகள், முறையே :

  - $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
  - $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
  - $470 \Omega, 5\%$
  - $470 \text{ k}\Omega, 5\%$

**110.**  $1 \text{ m}$  நீளம் கொண்ட, ஒதுக்கத்தக்க நிறை கொண்ட திட தண்டு ஒன்றின் இரு முனைகளில், முறையே  $5 \text{ kg}$  மற்றும்  $10 \text{ kg}$  நிறை கொண்ட இரு துகள்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.  $5 \text{ kg}$  துகளிலிலிருந்து, ஒருங்கின்து நிறை மையம் அமைந்துள்ள தொலைவு, (ஏறக்குறைய) :

  - $50 \text{ cm}$
  - $67 \text{ cm}$
  - $80 \text{ cm}$
  - $33 \text{ cm}$

- 111.** டிரான்சிஸ்டரது செயல்பாட்டிற்கு, பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது ?
- அடிவாய், உமிழ்வாய் மற்றும் ஏற்பி பகுதிகள் சமமான உருவளவினை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
  - உமிழ்வாய் சந்தி மற்றும் ஏற்பி சந்தி ஆகிய இரண்டும் முன்னோக்கு சார்பினை பெற்றிருக்கும்.
  - அடிவாய் பகுதி மிக மெல்லியதாகவும், மிதமான மாசுமட்டும் அமைய வேண்டும்.
  - அடிவாய், உமிழ்வாய் மற்றும் ஏற்பி பகுதிகள் சமமான மாசுப்பொருள் அடர்த்திகளோடு அமைய வேண்டும்.
- 112.** மூலக்கூறு விட்டம்,  $d$  மற்றும் எண் அடர்த்தி  $n$  கொண்ட வாயு ஒன்றின் சராசரி மோதலிடை தூரத்தினை இவ்வாறு வெளிப்படுத்த முடியும் :
- $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$
  - $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi d^2}$
  - $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$
  - $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d}$
- 113.** 249 kPa, அழுத்தம் மற்றும்  $27^\circ\text{C}$  வெப்பநிலையிலுள்ள ஹெட்ரஜன் வாயுவினை, ஒரு உருளை கொண்டுள்ளது. அதன் அடர்த்தி என்பது : ( $R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )
- $0.2 \text{ kg/m}^3$
  - $0.1 \text{ kg/m}^3$
  - $0.02 \text{ kg/m}^3$
  - $0.5 \text{ kg/m}^3$
- 114.**  $3 \times 10^{-10} \text{ V m}^{-1}$  மதிப்புடைய மின்புலத்தில்,  $7.5 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$  எனும் நகர்வு திசைவேகமுடைய ஒரு மின்னுட்டப்பட்ட துகள் பெறும் நகர்வு திறன்,  $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$  என்ற அலகில் :
- $2.5 \times 10^6$
  - $2.5 \times 10^{-6}$
  - $2.25 \times 10^{-15}$
  - $2.25 \times 10^{15}$

- 115.** தகைவு என்பதன் பரிமாணங்கள் :
- $[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$
  - $[\text{ML}^0\text{T}^{-2}]$
  - $[\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]$
  - $[\text{MLT}^{-2}]$
- 116.** நிலையாக பொருத்தப்பட்டுள்ள தாங்கி ஒன்றில்,  $L$  நீளம் மற்றும்  $A$ , குறுக்குவெட்டு பரப்பு கொண்ட கம்பி ஒன்று தொங்கவிடப் பட்டுள்ளது.  $M$  எனும் நிறை, அதன் கட்டற்ற முனையிலிருந்து தொங்கவிடப்படும் போது, கம்பியின் நீளம்,  $L_1$  என்று மாறுகிறது எனில், யங்கின் குணகத்திற்கான கோவை என்பது :
- $$\frac{\text{Mg}(L_1 - L)}{AL}$$
  - $$\frac{\text{MgL}}{AL_1}$$
  - $$\frac{\text{MgL}}{A(L_1 - L)}$$
  - $$\frac{\text{MgL}_1}{AL}$$
- 117.** ஒரே பொருளாலான, கிடார் ஒன்றின்  $A$  மற்றும்  $B$  ஆகிய இரு நரம்புகள் சிறிதளவு சுருதியில் வேறுபடுகின்றன மற்றும் அவை  $6 \text{ Hz}$ , அதிர்வெண் கொண்ட விம்மல்களை ஏற்படுத்துகின்றன.  $B$  -யில் உள்ள இழுவிசை சிறிதளவு குறைக்கப்படும் போது, விம்மல் அதிர்வெண்  $7 \text{ Hz}$  ஆக அதிகரிக்கிறது.  $A$  -யினது அதிர்வெண்,  $530 \text{ Hz}$  எனில்,  $B$  -யினது தொடக்க அதிர்வெண் மதிப்பு என்பது :
- $524 \text{ Hz}$
  - $536 \text{ Hz}$
  - $537 \text{ Hz}$
  - $523 \text{ Hz}$
- 118.** ஒரு நிறையில்லா கம்பியின் முனைகளில்  $4 \text{ kg}$  மற்றும்  $6 \text{ kg}$  நிறை கொண்ட இரு பொருட்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. கம்பி கடந்துசெல்லும் இழுவை (pulley), உராய்வற்று. (படத்தில் காணக). புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தினை ( $g$ ) பொருந்த, ஒருங்கின்து முடுக்கம் என்பது :
- 
- $g/2$
  - $g/5$
  - $g/10$
  - $g$

119. காற்றினை ஊடகமாகப் பெற்றுள்ள ஓர் இணைத்தட்டு மின்தேக்கியினது, மின்தேக்குதிறன்,  $6 \mu\text{F}$  ஆகும். மின்கடத்தாப்பொருள் ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்துவதால், அதன் மின்தேக்குதிறன்,  $30 \mu\text{F}$  என்று ஆகிறது. ஊடகத்தின் அனுமதிதிறனானது :

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

(1)  $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$   
 (2)  $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$   
 (3)  $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$   
 (4)  $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$


120. யங்கினது இரட்டைப் பிளவுச் சோதனையில், ஓரியல்பு மூலங்களுக்கிடையிலான இடைவெளி பாதியாக்கப்பட்டு, ஓரியல்பு மூலங்களிலிருந்து திரையினது தொலை இரட்டிப்பாக்கப் படுகிறது எனில், பட்டைவரி அகலம் :

- (1) பாதியாகும்  
 (2) நான்கு மடங்காகும்  
 (3) நான்கில் ஒரு பங்காகும்  
 (4) இரட்டிப்பாகும்

121.  $20 \text{ W/cm}^2$  எனும் சராசரி பாய அடர்த்தி கொண்ட ஒளி,  $20 \text{ cm}^2$  பரப்பளவு உடைய எதிரொளிப் பற்ற பரப்பின் மீது செங்குத்து வீழலில் விழுகிறது.  $1 \text{ நிமிட கால இடைவெளியில்}$ , பரப்பால் ஏற்கப்பட்ட ஆற்றல் என்பது :

- (1)  $12 \times 10^3 \text{ J}$   
 (2)  $24 \times 10^3 \text{ J}$   
 (3)  $48 \times 10^3 \text{ J}$   
 (4)  $10 \times 10^3 \text{ J}$

122. பின் வரும் வரைபடங்களில், தாமிரத்தின் மின்தடையெண் ( $\rho$ ) வெப்பநிலை ( $T$ ) -யோடு அடையும் வேறுபாட்டை உணர்த்துவது எது ?



123.  $r_1$  மற்றும்  $r_2$  ( $r_1 = 1.5 r_2$ ) ஆரங்கள் கொண்ட இரு திண்ம தாமிர கோளங்களின் வெப்பநிலையினை,  $1 \text{ K}$  என்றாலும் உயர்த்துவதற்கு தேவைப்படும் வெப்பளவுகளின் தகவு என்பது :

- (1)  $\frac{9}{4}$   
 (2)  $\frac{3}{2}$   
 (3)  $\frac{5}{3}$   
 (4)  $\frac{27}{8}$

124.  $2\hat{k} \text{ m}$  என்ற ஆர வெக்டர் கொண்ட துகள் ஒன்றின் மீது, மூலத்தைப் பொருத்த  $3\hat{j} \text{ N}$  என்றதொரு விசை செயல்படும் போதுள்ளதிருப்புவிசையைக் காணக்.

- (1)  $6\hat{j} \text{ N m}$   
 (2)  $-6\hat{i} \text{ N m}$   
 (3)  $6\hat{k} \text{ N m}$   
 (4)  $6\hat{i} \text{ N m}$

125.  $0.2 \text{ m}^3$  பருமன் கொண்டதொரு குறிப்பிட்ட வெளிப்பகுதியில், எங்கும்,  $5 \text{ V}$  மின்னழுத்தம் காணப்படுகிறது. இப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மின்புலமதிப்பானது :

- (1)  $0.5 \text{ N/C}$   
 (2)  $1 \text{ N/C}$   
 (3)  $5 \text{ N/C}$   
 (4) சமூ


126. ஓர் இடைமுகத்திம் ப்ரூஸ்டர் கோணம்,  $i_b$  அமையவேண்டிய மதிப்பு :

- (1)  $30^\circ < i_b < 45^\circ$   
 (2)  $45^\circ < i_b < 90^\circ$   
 (3)  $i_b = 90^\circ$   
 (4)  $0^\circ < i_b < 30^\circ$

127. ஓர் p-n சந்தி டயோடினது இயக்கமில்லாப் பகுதியின் அகலம் அதிகரிப்பது என்பது இதனால் ஏற்படுகிறது :

- (1) பின்னோக்குச் சார்பு மட்டும்  
 (2) முன்னோக்குச் சார்பு மற்றும் பின்னோக்குச் சார்பு ஆகிய இரண்டும்  
 (3) முன்னோக்கு மின்னோட்ட அதிகரிப்பு  
 (4) முன்னோக்குச் சார்பு மட்டும்

128. சீராகப் பரப்பப்பட்டுள்ள  $3.2 \times 10^{-7}$  C எனும் மின்சமையினை, 10 cm ஆரம் கொண்டதோரு கோள் வடிவு கடத்தி பெற்றுள்ளது. கோளத்தின் மையத்திலிருந்து, 15 cm தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியில் உள்ள மின்புலத்தின் எண் மதிப்பு யாது?  $\left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$
- $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
  - $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
  - $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
  - $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
129. DNA -வில் உள்ள பின்னப்படு ஒன்றினை முறிக்க தேவையான ஆற்றல்,  $10^{-20} \text{ J}$  ஆகும். eV-யில் இதன் மதிப்பு, ஏறக்குறைய :  
 (1) 0.6  
 (2) 0.06  
 (3) 0.006  
 (4) 6
130. ஒரு  $40 \mu\text{F}$  மின்தேக்கி, 200 V மற்றும் 50 Hz ac மின் அளிப்பாணோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சுற்றிலுள்ள மின்னோட்டத்தினது rms மதிப்பு ஏறக்குறைய :  
 (1) 2.05 A  
 (2) 2.5 A  
 (3) 25.1 A  
 (4) 1.7 A
131. V வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு இடையே, ஓர் எலக்ட்ரான் ஓய்விலிருந்து முடுக்கப்படுகிறது. எலக்ட்ரானது டெ-ப்ராக்வி அலை நீளம்,  $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$  எனில், மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது :  
 (1)  $10^2 \text{ V}$   
 (2)  $10^3 \text{ V}$   
 (3)  $10^4 \text{ V}$   
 (4)  $10 \text{ V}$
132. சம கொள்ளலு பெற்றுள்ள இரு உருளைகள் A மற்றும் B, ஒன்றோடொன்று ஓர் அடைப்பான் வழியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. A, திட்ட வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில், நல்லியல்பு வாயு ஒன்றினைக் கொண்டுள்ளது. B, முழுவதுமாக காலியாக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பு முழுவதும் வெப்பக்காப்பிடப் பட்டுள்ளது. அடைப்பான், விரைவாக திறக்கப் படுகிறது. இந்த நிகழ்வு, இந்த வகையைச் சார்ந்தது :  
 (1) வெப்ப மாற்றீடற்றது  
 (2) மாறா பரும்  
 (3) மாறா அழுத்தம்  
 (4) மாறா வெப்பநிலை

133. காட்டப்பட்டுள்ள வாதியல் மின்சுற்றிற்கான மெய் அட்டவணை என்பது :
- 
- | (1) | A | B | Y |
|-----|---|---|---|
| 0   | 0 | 0 |   |
| 0   | 1 | 1 |   |
| 1   | 0 | 1 |   |
| 1   | 1 | 1 |   |
- | (2) | A | B | Y |
|-----|---|---|---|
| 0   | 0 | 1 |   |
| 0   | 1 | 1 |   |
| 1   | 0 | 1 |   |
| 1   | 1 | 0 |   |
- | (3) | A | B | Y |
|-----|---|---|---|
| 0   | 0 | 1 |   |
| 0   | 1 | 0 |   |
| 1   | 0 | 0 |   |
| 1   | 1 | 0 |   |
- | (4) | A | B | Y |
|-----|---|---|---|
| 0   | 0 | 0 |   |
| 0   | 1 | 0 |   |
| 1   | 0 | 0 |   |
| 1   | 1 | 1 |   |
134. எதிர்க்குறி வெப்ப மின்தடை எண் கொண்ட திண்மங்கள் என்பன :  
 (1) மின்காப்புப் பொருட்கள் மட்டும்  
 (2) குறைகடத்திகள் மட்டும்  
 (3) மின்காப்புப் பொருட்கள் மற்றும் குறை-கடத்திகள்  
 (4) உலோகங்கள்
135. ஒரு தொடர் LCR மின்சுற்று, ஓர் ac மின்னழுத்த மூலத்தோடு இணைக்கப் பட்டுள்ளது. மின்சுற்றிலிருந்து, L விலக்கப்படும் போது, மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்தத் திற்கிடையிலான கட்டவேறுபாடு,  $\frac{\pi}{3}$  ஆகும். இதற்கு பதிலாக, C மின்சுற்றிலிருந்து விலக்கப்படின், மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்தத்திற்கிடையிலான கட்டவேறுபாடு, மீண்டும்  $\frac{\pi}{3}$  என்ற மைக்ராறது. மின்சுற்றினது திறன் காரணி என்பது :  
 (1) 0.5  
 (2) 1.0  
 (3) -1.0  
 (4) சுழி

136. சுக்ரோசின் நீராற்பகுத்தல், கீழ்கண்ட வினையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- $$\text{சுக்ரோஸ்} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{குளுகோஸ்} + \text{ப்ரக்டோஸ்}$$
- 300 K -இல் சமநிலை மாறிலியானது ( $K_p$ )  $2 \times 10^{13}$  எனில், அதே வெப்பநிலையில்  $\Delta_r G^\ominus$  மதிப்பானது :
- $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
  - $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
  - $-8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
  - $-8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
137. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று அதிகப்பட்ச எண்ணிக்கையிலான அணுக்களை கொண்டுள்ளது ?
- 1 g Mg(s) [Mg -யின் அணுநிறை = 24]
  - 1 g O<sub>2</sub>(g) [O -யின் அணுநிறை = 16]
  - 1 g Li(s) [Li -யின் அணுநிறை = 7]
  - 1 g Ag(s) [Ag -யின் அணுநிறை = 108]
138. கீழ்கண்டவற்றில் கார்பன்மோனாக்சைடு குறித்து எது சரியற்றது ?
- அது இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் கடத்தும் திறனை குறைக்கின்றது.
  - கார்பாக்ஸி ஹீமோகுளோபின் (ஹீமோ-குளோபின் CO உடன் இணைந்த அமைப்பு) ஆக்ஸி ஹீமோகுளோபினைக் காட்டிலும் குறைந்த நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது
  - முழுமையடையாத ஏரிதலினால் உற்பத்தியாகின்றது
  - அது கார்பாக்ஸி ஹீமோகுளோபினை உருவாக்கும்
139. Cr<sup>2+</sup> அயனியின் கணக்கிடப்பட்ட சுழற்சி காந்ததிருப்புத்திறனானது :
- 4.90 BM
  - 5.92 BM
  - 2.84 BM
  - 3.87 BM
140. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று இயற்கை பலபடி?
- பாலி (ப்பிட்டாடையீன்-ஸ்டெரீன்)
  - பாலி ப்பிட்டாடையீன்
  - பாலி (ப்பிட்டாடையீன்-அக்ரேலோ-நைட்ரேல்)
  - சிஸ்-1,4- பாலிஜோபீரின்

141. கீழ்கண்டவற்றில் எந்த ஒன்று கார அமினோ அமிலம் ஆகும் ?
- அலனைன்
  - டைரோசின்
  - லைசின்
  - சிரென்
142. ஒரு சிலின்டரில் N<sub>2</sub> மற்றும் Ar வாயுக்கள் கொண்ட ஒரு கலவை உள்ளது. அதில் 7 g N<sub>2</sub> மற்றும் 8 g Ar உள்ளது. சிலின்டரில் உள்ள வாயு கலைவயின் மொத்த அழுத்தம் 27 bar எனில், N<sub>2</sub> -யின் பகுதி அழுத்தம் :
- [N = 14, Ar = 40 (g mol<sup>-1</sup> -ல்) : அணுநிறைகளை பயன்படுத்துக]
- 12 bar
  - 15 bar
  - 18 bar
  - 9 bar
143. தாள் / காகித வண்ணப்பிரிகை எதற்கான எடுத்துக்காட்டு ?
- பங்கீடு வண்ணப்பிரிகை
  - மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை
  - பத்தி வண்ணப்பிரிகை
  - பரப்புக் கவர்ச்சி வண்ணப்பிரிகை
144. 2Cl(g) → Cl<sub>2</sub>(g) வினையில், சரியான விடையானது :
- $\Delta_r H > 0$  மற்றும்  $\Delta_r S < 0$
  - $\Delta_r H < 0$  மற்றும்  $\Delta_r S > 0$
  - $\Delta_r H < 0$  மற்றும்  $\Delta_r S < 0$
  - $\Delta_r H > 0$  மற்றும்  $\Delta_r S > 0$
145. ஷரியா நீருடன் வினைபுரிந்து A -வை தருகின்றது, அது சிதைவடைந்து B -யை தரும். B -யை ஆழந்த நீலம் நிறமுடைய Cu<sup>2+</sup> (aq) கரைசலினுள் செலுத்தும் போது C -யை தருகின்றது. கீழ்கண்டவற்றுள் C -யின் வாய்பாடு என்ன ?
- [Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sup>2+</sup>
  - Cu(OH)<sub>2</sub>
  - CuCO<sub>3</sub>·Cu(OH)<sub>2</sub>
  - CuSO<sub>4</sub>

- 146.** பிளாட்டினம் (Pt) மின் முனையை பயன்படுத்தி நீர்த்த சல்பூரிக் அமிலத்தை மின்னாற்ற பகுக்கும் போது, நேர் மின் முனையில் கிடைக்கும் விளைபொருள் :
- ஆக்ஸிஜன் வாயு
  - $H_2S$  வாயு
  - $SO_2$  வாயு
  - ஷைட்ரஜன் வாயு
- 147.** பொருள் மைய கனச்சதூர (bcc) அமைப்புடைய ஒரு தனிமத்தின் கூடுவிளிம்பின் மதிப்பு 288 pm எனில், அதன் அணு ஆரமானது :
- $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
  - $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
  - $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
  - $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- 148.** ஒரு வினையின் வினைபடு பொருள்களின் செறிவு அதிகரிப்பதனால் கீழ்கண்ட எது மாறுபடும் ?
- வினை வெப்பம்
  - பயன் தொடக்க ஆற்றல்/குறைந்த பட்ச இயக்க ஆற்றல்
  - மோதல் அதிர்வெண்
  - கிளர்வுகொள் ஆற்றல்
- 149.** உர்ட்ஸ் வினையில் கீழ்கண்ட எந்த ஆல்கேன்-ஐ பெருமளவில் தயாரிக்க இயலாது ?
- 2,3-டைமெத்தில் ப்யூட்டேன்
  - n-ஹப்டேன்
  - n-ப்யூட்டேன்
  - n-ஹக்சேன்

- 150.** சரியற்ற கூற்றை கண்டறியவும்.
- இடைநிலை உலோகங்களும் மற்றும் அதன் சேர்மங்களும் பல்வேறு ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றிருக்கும் திறன் வாய்ந்ததாலும் மற்றும் அணைவுகளை உருவாக்குவதாலும் அவை சிறந்த வினையூக்கி பண்டைப் பெற்றுள்ளன.
  - உலோகங்களின் படிக கூட்டில் சிறு அணுக்களான H, C அல்லது N உள்ளிஞக்கப்பட்டு உருவாக்கப்படுவதே இடையூட்டுச் சேர்மங்களாகும்.
  - $CrO_4^{2-}$  மற்றும்  $Cr_2O_7^{2-}$ -இல் குரோமியத் தின் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகள் ஒத்ததாக இருக்காது.
  - நீரில்  $Fe^{2+}(d^6)$  -யை காட்டிலும்  $Cr^{2+}(d^4)$  ஒரு வலிமை மிகு ஒடுக்கும் காரணியாகும்.
- 151.** கீழ்கண்டவற்றுள் நேர் அயனி அழுக்குநீக்கி எது ?
- சோடியம் ஸிரேட்
  - சீடைல்ட்ரைமெத்தில் அம்மோனியம் புரோமைடு
  - சோடியம் டோடெக்கைல் பென்சீன் சல்போனேட்
  - சோடியம் லாரைல் சல்போட்
- 152.** ஒரு மூவினைய பியூடைல் கார்பன் நேர் அயனி, ஒரு ஈரினைய பியூடைல் கார்பன் நேர் அயனியைவிட அதிக நிலைப்புத்தன்மையை கொண்டிருப்பதற்கு கீழ்கண்டவற்றுள் எது, காரணமாகிறது ?
- $-CH_3$  தொகுதிகளின் + R விளைவு
  - $-CH_3$  தொகுதிகளின் - R விளைவு
  - பினைப்பில்லா உடனிசைவு/குறை பினைப்பு
  - $-CH_3$  தொகுதிகளின் - I விளைவு
- 153.** அணைவுச் சேர்மங்கள் உருவாவதில் ஈனிகளின் புல வலிமையின் சரியான ஏறு வரிசை கீழ்கண்டவற்றில் எது ?
- $SCN^- < F^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$
  - $F^- < SCN^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
  - $CN^- < C_2O_4^{2-} < SCN^- < F^-$
  - $SCN^- < F^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$

- 154.** கீழ்கண்டவற்றுள் **சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும்.**
- CO<sub>2</sub> வெளிவருவதால் கொப்பளக்காப்பரானது கொப்பளத்தேற்றத்தை கொண்டுள்ளது.
  - வான்-ஆர்க்கல் முறையில் நிக்கல் ஆவி அழுத்த தூய்மையாக்கல் செய்யப்படுகிறது.
  - தேனிரும்பு பல்வேறு அமைப்புகளாக வார்ப்பு செய்யப்படுகிறது.
  - 4% கார்பன் உடைய மெல்லிரும்பு தூய்மையற்று.
- 155.** கீழ்கண்ட மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பில் எது பூஜ்ய இருமுனை திருப்புத்திறனை கொண்டுள்ளது?
- போரான் ட்ரை புளூரைடு, வைட்ராஜன் புளூரைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, 1,3-டை குளோரோ பென்சீன்
  - நெட்ராஜன் ட்ரை புளூரைடு, பெரிலியம் டை புளூரைடு, நீர், 1,3-டை குளோரோ பென்சீன்
  - போரான் ட்ரை புளூரைடு, பெரிலியம் டை புளூரைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, 1,4-டை குளோரோ பென்சீன்
  - அம்மோனியா, பெரிலியம் டை புளூரைடு, நீர், 1,4-டை குளோரோ பென்சீன்
- 156.** கீழ்கண்டவற்றை பொருத்தி **சரியான விடையை கண்டறியவும்.**
- |  |   |
|--|---|
| (a) CO(g) + H <sub>2</sub> (g)         | (i) Mg(HCO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> + Ca(HCO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> |
| (b) தற்காலிக கடின நீர்                 | (ii) ஒரு எலக்ட்ரான் குறை வைட்ராஜன் டை வைட்ரான்டு                            |
| (c) B <sub>2</sub> H <sub>6</sub>      | (iii) தொகுப்பு வாயு   |
| (d) H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>      | (iv) தளமற்ற அமைப்பு   |
| (a)      (b)      (c)      (d)         |   |
| (1) (iii)      (ii)      (i)      (iv) |   |
| (2) (iii)      (iv)      (ii)      (i) |   |
| (3) (i)      (iii)      (ii)      (iv) |   |
| (4) (iii)      (i)      (ii)      (iv) |   |
- 157.** <sup>175</sup>Lu உள்ள புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை முறையே :
- 104, 71 மற்றும் 71
  - 71, 71 மற்றும் 104
  - 175, 104 மற்றும் 71
  - 71, 104 மற்றும் 71
- 158.** உருகிய CaCl<sub>2</sub>-வில் இருந்து 20 g கால்சியம் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவைப்படும் பாரடேக்களின் (F) எண்ணிக்கை :
- (Ca -ன் அணு நிறை = 40 g mol<sup>-1</sup>)
- 2
  - 3
  - 4
  - 1
- 159.** 2-புரோமோ பென்டேன் நீக்கவினையில் ஈடுபட்டு பென்ட-2-ஈன் உருவாகும் போது நிகழும் வினை எது?
- பி-நீக்க வினை
  - செயிட்செல் விதியை பின்பற்றுகிறது
  - வைட்ராஜன் ஹாலஜன் நீக்கவினை
  - நீர் நீக்க வினை
- (a), (c), (d)
  - (b), (c), (d)
  - (a), (b), (d)
  - (a), (b), (c)
- 160.** கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து **சரியான கூற்றுகளை கண்டறியவும்.**
- ஐஸ்கிரீம் மற்றும் உறைந்த உணவிற்கு CO<sub>2</sub>(g) குளிருட்டியாக பயன்படுகிறது.
  - C<sub>60</sub> அமைப்பானது பன்னிரெண்டு ஆறு கார்பன் கொண்ட வளையத்தையும் மற்றும் இருபது ஐந்து கார்பன் கொண்ட வளையத்தையும் கொண்டது.
  - ZSM-5, ஜீயோலைட்டின் ஒரு வகை, ஆல்கஹால்களை பெட்ரோலாக மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது.
  - CO நிறமற்ற மற்றும் மணமற்ற வாயுவாகும்.
- (a) மற்றும் (c) மட்டும்
  - (b) மற்றும் (c) மட்டும்
  - (c) மற்றும் (d) மட்டும்
  - (a), (b) மற்றும் (c) மட்டும்
- 161.** சரியாக பொருந்தாதவற்றை கண்டறியவும்.
- | பெயர்  | IUPAC அதிகார-பூர்வமான பெயர் |
|--|-----------------------------|
| (a) Unnilunium   | (i) மெண்டலீவியல்            |
| (b) Unniltrium   | (ii) லாரான்சியம்            |
| (c) Unnilhexium  | (iii) ஸீபோர்ஜியம்           |
| (d) Unununniun   | (iv) டார்ம்ஸ்டாட்டியம்      |
| (1) (b), (ii)<br>(2) (c), (iii)<br>(3) (d), (iv)<br>(4) (a), (i) |                             |

- 162.** பென்சீனின் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலியின் ( $K_f$ ) மதிப்பு  $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$ . மின்பகுளி அல்லாத கரைபொருளை கொண்ட 0.078 m மோலாலிட்டி பென்சீன் கரைசலின் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலி :
- (இரண்டு தசம புள்ளி வரை முழுமையாக்கவும்)
- 0.80 K
  - 0.40 K
  - 0.60 K
  - 0.20 K
- 163.** கீழ்கண்ட வினையில் கார்பனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன ?
- $$\text{CH}_4(g) + 4\text{Cl}_2(g) \rightarrow \text{CCl}_4(l) + 4\text{HCl}(g)$$
- 0 இல் இருந்து +4
  - 4 இல் இருந்து +4
  - 0 இல் இருந்து -4
  - +4 இல் இருந்து +4
- 164.** ஒரு முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலி  $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$  ஆகும். 2.0 g வினைபடு பொருள் 0.2 g ஆக குறைவதற்கு தேவைப் படும் நேரம் :
- 200 s
  - 500 s
  - 1000 s
  - 100 s
- 165.** ரெளவட் விதியிலிருந்து நேர்விலக்கம் காண்பிக்கும் கலவையானது :
- பென்சீன் + டொலுவீன்
  - அசிட்டோன் + குளோரோபார்ம்
  - குளோரோ ஈத்தேன் + புரோமோ ஈத்தேன்
  - எத்தனால் + அசிட்டோன்
- 166.** கீழ்கண்ட சல்பரின் அமில ஆக்சைடுகளில் எவை -O-O- பினைப்பை கொண்டுள்ளது ?
- $\text{H}_2\text{SO}_4$ , சல்பூரிக் அமிலம்
  - $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ , பெர்ஆக்சோடை சல்பூரிக் அமிலம்
  - $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ , பைரோ சல்பூரிக் அமிலம்
  - $\text{H}_2\text{SO}_3$ , சல்பூரஸ் அமிலம்
- 167.** கூழ்ம கரைசலின் எந்த பண்பினை நிர்ணயிப்பதற்கு ஜீட்டாதிறன் அளவீடு பயன்படுகின்றது ?
- கரைதிறன்
  - கூழ்மத்துகள்களின் நிலைப்புத்தன்மை
  - கூழ்மத்துகள்களின் உருவ அளவு
  - பாகுத் தன்மை

- 168.** சுக்ரோஸை நீரால் பகுத்தால் கிடைப்பது :

- $\alpha$ -D-குளுகோஸ் +  $\beta$ -D-குளுகோஸ்
- $\alpha$ -D-குளுகோஸ் +  $\beta$ -D-ப்ரக்டோஸ்
- $\alpha$ -D-ப்ரக்டோஸ் +  $\beta$ -D-ப்ரக்டோஸ்
- $\beta$ -D-குளுகோஸ் +  $\alpha$ -D-ப்ரக்டோஸ்





- 169.** 0.1 M NaOH இல்  $\text{Ni(OH)}_2$  -வின் கரைதிறனை கண்டறியவும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள  $\text{Ni(OH)}_2$  -வின் அயனிப் பெருக்கமானது  $2 \times 10^{-15}$ .

- $2 \times 10^{-8} \text{ M}$
- $1 \times 10^{-13} \text{ M}$
- $1 \times 10^8 \text{ M}$
- $2 \times 10^{-13} \text{ M}$






- 170.** வெப்பம் மாறா நிபந்தனையின் கீழ், ஒரு நல்லியல்பு வாயு வெற்றிட விரிவாக்கம் அடைவதற்குரிய சரியான தெரிவானது :

- $q = 0, \Delta T < 0$  மற்றும்  $w > 0$
- $q < 0, \Delta T = 0$  மற்றும்  $w = 0$
- $q > 0, \Delta T > 0$  மற்றும்  $w > 0$
- $q = 0, \Delta T = 0$  மற்றும்  $w = 0$

- 171.** கீழ்கண்ட அமீனில் எவை கார்பலமைன் சோதனையை தருகின்றது ?



172. கீழ்கண்ட வினைத் தொடரில் உருவாகும் சேர்மம் X -யை கண்டறியவும்.







173. நீர்த்த னாஓஹ் முன்னிலையில் பென்சால்டிளைஹூடு மற்றும் அசிட்டோபீனோன் இடையிலான வினை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது ?

- (1) கானிசரோ வினை
- (2) குறுக்க கானிசரோ வினை
- (3) குறுக்க ஆல்டால் குறுக்கம்
- (4) ஆல்டால் குறுக்கம்

174. எந்த ஒரு மூலக்கூறு உருவாகாது என்பதனை கண்டறியவும்.

- (1)  $\text{Li}_2$
- (2)  $\text{C}_2$
- (3)  $\text{O}_2$
- (4)  $\text{He}_2$





175. ஒரு ஆல்கீன் ஓச்சோனேற்றத்தின் போது மெத்தனல் -ஜை ஒரு விளை பொருளாகத் தருகின்றது. அதன் அமைப்பானது :



176. கீழ்கண்ட எந்த உலோக அயனி பல நொதிகளை தூண்டி குணுகோசின் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தில் பங்கேற்று, ATP -யை உற்பத்தி செய்து மற்றும்  $\text{Na}^-$ -வுடன் நரம்பு சைகை பரிமாற்றத்திற்கு காரணமாக அமைகிறது ?

- (1) காப்பர்
- (2) கால்சியம்
- (3) பொட்டாசியம்
- (4) இரும்பு

177. அனிசோலை, HI உடன் பிளத்தல் வினைக்கு உட்படுத்தும் போது கிடைப்பது :



178. கீழ்கண்டவற்றை பொருத்துக.

**ஆக்ஷெ(ு)**

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| (a) CO                             | (i) கார          |
| (b) BaO                            | (ii) நடுநிலை     |
| (c) Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | (iii) அமில       |
| (d) Cl <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | (iv) ஈரியல்புள்ள |

**தன்மை**

- o 0 o -

179. CaCl<sub>2</sub>, MgCl<sub>2</sub> மற்றும் NaCl கரைசலினுள் HCl செலுத்தப்படுகின்றது. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்தசேர்மம்/களில் ஒன்று படிகமாகும் ?

- (1) NaCl மட்டும்
- (2) MgCl<sub>2</sub> மட்டும்
- (3) NaCl, MgCl<sub>2</sub> மற்றும் CaCl<sub>2</sub>
- (4) MgCl<sub>2</sub> மற்றும் CaCl<sub>2</sub> இரண்டுமே

180. அசிட்டோன் மற்றும் மெத்தில் மெக்ஸீயம் ஆகியவை வினைபுரிந்து பின் அதன் தொடர்ச்சியாக நீராற்படுத்தால் கிடைக்கும் வினைபொருள் :

- (1) ஈரினைய் பியூட்டைல் ஆல்கஹால்
- (2) முவினைய பியூட்டைல் ஆல்கஹால்
- (3) ஐசோபியூட்டைல் ஆல்கஹால்
- (4) ஐசோபுரப்பைல் ஆல்கஹால்

கீழ்கண்டவற்றுள் சரியான விடை எது ?

**(a) (b) (c) (d)**

- (1) (ii) (i) (iv) (iii)
- (2) (iii) (iv) (i) (ii)
- (3) (iv) (iii) (ii) (i)
- (4) (i) (ii) (iii) (iv)

**Space For Rough Work / இதர வேலைக்கான காலியிடம்**

No. :

Test Booklet Code

வினாத்தான் தொகுப்பு குறியீடு

# HAKAN

This Booklet contains 24+44 pages.

இவ்வினாத்தான் தொகுப்பு 24+44 பக்கங்களை கொண்டது.

**H4**

**Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.**

**இந்த வினாத் தொகுப்பை திறக்கும்படி கண்காணிப்பாளர் கூறும் வரையில் திறக்கக் கூடாது.**

**Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.**

**வினாத் தொகுப்பிற்கு பின் பக்கமுள்ள அறிவுரைகளை கவனமாக படிக்கவும்.**

TAMIL

### **Important Instructions :**

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on **side-1** and **side-2** carefully with **blue/black ball point pen** only.
2. The test is of **3 hours** duration and Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
4. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
6. The CODE for this Booklet is **H4**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.

### **முக்கிய அறிவுரைகள் :**

1. இந்த வினாத் தொகுப்பிற்குள் விடைத்தாள் உள்ளது. வினாத் தொகுப்பை திறக்க அறிவுறுத்தப்படும் பொழுது விடைத்தாளை எடுத்து பக்கம் 1 மற்றும் பக்கம் 2 இல் கேட்கப்பட்டுள்ள விபரங்களை கவனமாக **நீலம்/கருப்பு** பந்துமுனைப் பேனா மட்டுமே பயன்படுத்தி நிரப்பவும்.
2. இந்த தேர்வு **3 மணி** நேரமாகும் மற்றும் வினாத்தான் தொகுப்பு **180** வினாக்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு வினாவுக்கு **4** மதிப்பெண்கள். ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கு தேர்வு எழுதுபவருக்கு **4** மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும். மொத்த மதிப்பெண்களிலிருந்து ஒவ்வொரு தவறான விடைக்கும் **ஒரு** மதிப்பெண் கழிக்கப்படும். அதிகப்ச மதிப்பெண்கள் **720** ஆகும்.
3. இந்த பக்கத்தில் எழுதுவதற்கும்/விடைகளைக் குறிப்பதற்கும் **நீலம்/கருப்பு** பந்துமுனைப் பேனா மட்டும் உபயோகிக்க வேண்டும்.
4. வினாத்தாள் தொகுப்பில் கொடுக்கப்பட்ட இடத்தில் மட்டும் சரி பார்த்தலுக்கு (Rough work) பயன்படுத்த வேண்டும்.
5. தேர்வு முடிந்தவுடன், தேர்வு எழுதுபவர் விடைத்தாளை அறை/ஹாலிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு முன், அறை தேர்வுக் கண்காணிப்பாளரிடம் கொடுக்க வேண்டும். தேர்வு எழுதுபவர்கள் வினாத்தான் தொகுப்பை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்க படுகிறார்கள்.
6. இந்த வினாத்தான் தொகுப்பின் குறியீடு **H4**, விடைத்தாளின் பக்கம் 2-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடும் இந்த வினாத்தான் தொகுப்பின் குறியீடும் ஒன்று தான் என்று உறுதி செய்யவும். ஏதாவது முரண்பாடு இருந்தால், தேர்வு எழுதுபவர் உடனடியாக அறை கண்காணிப்பாளரிடம் தெரிவித்து, மாற்று வினாத்தான் தொகுப்பையும் மற்றும் விடைத்தாளையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
7. தேர்வு எழுதுபவர்கள் விடைத்தாள் மடங்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். விடைத்தாளில் எந்த விதமான தேவையற்ற குறிப்புகளும் செய்யக்கூடாது. வினாத்தான் தொகுப்பு/விடைத்தாளில் கொடுக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட இடத்தை தவிர எந்த இடத்திலும் தேர்வு எழுதுபவர் அவரது பதிவு எண்ணை எழுத கூடாது.
8. விடைத்தாளில் வெள்ளை தீரவத்தில் அழித்து திருத்தங்கள் செய்ய அனுமதியில்லை.

**In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.**

**வினா மொழி பெயர்ப்பில் ஏதாவது சர்ச்சை இருந்தால், ஆங்கில பிரதியே முடிவானது.**

Name of the Candidate (in Capitals) : \_\_\_\_\_

தேர்வு எழுதுபவரின் பெயர் : \_\_\_\_\_

Roll Number : in figures \_\_\_\_\_

பதிவு எண் : எண்ணில் \_\_\_\_\_

: in words \_\_\_\_\_

: எழுத்தில் \_\_\_\_\_

Centre of Examination (in Capitals) : \_\_\_\_\_

தேர்வு மையம் : \_\_\_\_\_

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_

Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

தேர்வு எழுதுபவரின் கையொப்பம்:

கண்காணிப்பாளரின் கையொப்பம்:


Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : \_\_\_\_\_

1. ஒற்றையனு வாயு ஓன்றின் சராசரி வெப்பவியல் ஆற்றல், என்பது : ( $k_B$  என்பது போல்ஸ்ட் மென் மாறிலி மற்றும்  $T$ , தனி வெப்பநிலை)

- (1)  $\frac{7}{2} k_B T$
- (2)  $\frac{1}{2} k_B T$
- (3)  $\frac{3}{2} k_B T$
- (4)  $\frac{5}{2} k_B T$

2. பின் வரும் வரைபடங்களில், தாமிரத்தின் மின்தடையெண் ( $\rho$ ) வெப்பநிலை ( $T$ ) -யோடு அடையும் வேறுபாட்டை உணர்த்துவது எது ?



3. போர் மாதிரி, பின்வருவனவற்றில் எதற்கு பொருந்தமற்றதாக அமையும் ?

- (1) ஒற்றை அயனியாக்கமடைந்த நியான் அணு ( $Ne^+$ )
- (2) வைட்ரஜன் அணு
- (3) ஒற்றை அயனியாக்கமடைந்த ஹீலியம் அணு ( $He^+$ )
- (4) ட்யூடிரான் அணு

4.  $r_1$  மற்றும்  $r_2$  ( $r_1 = 1.5 r_2$ ) ஆரங்கள் கொண்ட இரு திண்ம தாமிர கோளங்களின் வெப்பநிலையினை, 1 K என்றாலும் உயர்த்துவதற்கு தேவைப்படும் வெப்பளவுகளின் தகவு என்பது :

- (1)  $\frac{5}{3}$
- (2)  $\frac{27}{8}$
- (3)  $\frac{9}{4}$
- (4)  $\frac{3}{2}$

5.  $r$  ஆரம் கொண்டதொரு நுண்துளை குழாய், நீரில் அமிழ்த்தப் படுகிறது. அதில் நீரானது,  $h$  உயரம் எழும்புகிறது, நுண்துளையிலுள்ள நீரது நிறை, 5 g ஆகும்.  $2r$ , ஆரம் கொண்ட மற்றொரு நுண்துளைகுழாய் நீரில் அமிழ்த்தப் படுகிறது. இந்தக்குழாயில் எழும்பக் கூடிய நீரது நிறை என்பது :

- (1) 20.0 g
- (2) 2.5 g
- (3) 5.0 g
- (4) 10.0 g

6.  $1\text{ m}$  நீளம் கொண்ட, ஒதுக்கத்தக்க நிறை கொண்ட திட தண்டு ஓன்றின் இரு முனைகளில், முறையே  $5\text{ kg}$  மற்றும்  $10\text{ kg}$  நிறை கொண்ட இரு துகள்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.  $5\text{ kg}$  துகளிலிருந்து, ஒருங்கிணது நிறை மையம் அமைந்துள்ள தொலைவு, (ஏறக்குறைய) :

- (1) 80 cm
- (2) 33 cm
- (3) 50 cm
- (4) 67 cm

- 599 எனும் ஏற்புத்திறனுடைய ஓர் இரும்புத் தண்டு,  $1200\text{ A m}^{-1}$  எனும் காந்தமாக்குப் புலத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. தண்டு செய்யப்பட்ட பொருளின் உட்புகுதிறன் என்பது : ( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ T m A}^{-1}$ )

- (1)  $2.4\pi \times 10^{-7}\text{ T m A}^{-1}$
- (2)  $2.4\pi \times 10^{-4}\text{ T m A}^{-1}$
- (3)  $8.0 \times 10^{-5}\text{ T m A}^{-1}$
- (4)  $2.4\pi \times 10^{-5}\text{ T m A}^{-1}$


8.  $^{235}_{92}\text{U}$  எனும் யுரேனிய ஜோடோப், நியூட்ரான் கொண்டு தாக்கப்படும் போது,  $^{89}_{36}\text{Kr}$  மற்றும் மூன்று நியூட்ரானோடு உருவாக்கப்படுவது :
- $^{103}_{36}\text{Kr}$
  - $^{144}_{56}\text{Ba}$
  - $^{91}_{40}\text{Zr}$
  - $^{101}_{36}\text{Kr}$
9. 249 kPa, அழுத்தம் மற்றும்  $27^\circ\text{C}$  வெப்பநிலையிலுள்ள ஹெட்ரஜன் வாயுவினை, ஒரு உருளை கொண்டுள்ளது. அதன் அடர்த்தி என்பது : ( $R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )
- $0.02 \text{ kg/m}^3$
  - $0.5 \text{ kg/m}^3$
  - $0.2 \text{ kg/m}^3$
  - $0.1 \text{ kg/m}^3$
10. புவியினது பரப்பில், ஒரு பொருள், 72 N என்ற எடையைப் பெற்றுள்ளது. புவியினது ஆரத்தின் பாதிக்குச் சமமான உயரத்தில், அதன் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை, யாது ?
- 24 N
  - 48 N
  - 32 N
  - 30 N
11. V வோல்ட் மின்னமுத்த வேறுபாட்டிற்கு இடையே, ஓர் எலக்ட்ரான் ஓய்விலிருந்து முடுக்கப்படுகிறது. எலக்ட்ரானது ஒ-ப்ராக்கி அலை நீளம்,  $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$  எனில், மின்னமுத்த வேறுபாடு என்பது :
- $10^4 \text{ V}$
  - $10 \text{ V}$
  - $10^2 \text{ V}$
  - $10^3 \text{ V}$
12. ஒரு சிறிய மின் இருமுனை,  $16 \times 10^{-9} \text{ C m}$  எனும் இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றுள்ளது. இருமுனை அச்சோடு  $60^\circ$  எனும் கோணத்தினை மேற்கொண்டுள்ள ஒரு கோட்டில், இருமுனை மையத்திலிருந்து  $0.6 \text{ m}$  தூரத்தில் அமைந்துள்ளதொரு புள்ளியில் இருமுனையினால் ஏற்படும் மின்னமுத்த மதிப்பு என்பது :  $\left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$
- சமி
  - 50 V
  - 200 V
  - 400 V

13. கோபுரம் ஒன்றின் உச்சியிலிருந்து, ஒரு பந்து,  $20 \text{ m/s}$  எனும் திசை வேகத்தில் கீழ்நோக்கி செங்குத்தாக எறியப்படுகிறது. அது, சிறிது நேரத்திற்குப்பிறகு  $80 \text{ m/s}$  என்ற திசை வேகத்தில் தரையைத் தொடுகிறது, எனில் கோபுரத்தின் உயரம் : ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )
- 300 m
  - 360 m
  - 340 m
  - 320 m
14. ஒரு மீட்டர் சமன்சுற்றின் இடது இடைவெளியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதொரு மின்தடைக்கம்பி, வலது இடைவெளியில் உள்ள  $10 \Omega$  மின்தடையோடு சமன் செய்து கொள்ளும் புள்ளி, சமன்சுற்றுக் கம்பியினை,  $3 : 2$  என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கிறது. மின்தடை கம்பியின் நீளம்,  $1.5 \text{ m}$  எனில், மின்தடை கம்பியின்  $1 \Omega$ -மிற்கான நீளம் என்பது :
- $1.5 \times 10^{-2} \text{ m}$
  - $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$
  - $1.0 \times 10^{-1} \text{ m}$
  - $1.5 \times 10^{-1} \text{ m}$
15. மூலக்கூறு விட்டம், d மற்றும் எண் அடர்த்தி n கொண்ட வாயு ஒன்றின் சராசரி மோதலிடை தூரத்தினை இவ்வாறு வெளிப்படுத்த முடியும் :
- $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$
  - $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d}$
  - $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$
  - $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi d^2}$
16. சீராகப் பரப்பப்பட்டுள்ள  $3.2 \times 10^{-7} \text{ C}$  எனும் மின்சமையினை,  $10 \text{ cm}$  ஆரம் கொண்டதொரு கோள் வடிவு கடத்தி பெற்றுள்ளது. கோளத்தின் மையத்திலிருந்து,  $15 \text{ cm}$  தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியில் உள்ள மின்புலத்தின் எண் மதிப்பு யாது ?  $\left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$
- $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
  - $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
  - $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
  - $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$


17. ஒரு மின்காந்த அலையினது செறிவுக்கு, அதன் மின்புல மற்றும் காந்தப்புலக் கூறுகள் அளிக்கும் பங்களிப்புகளின் விகிதமானது :  
(c=EM அலையினது வேகம்)
- $1 : c^2$
  - $c : 1$
  - $1 : 1$
  - $1 : c$
18. யங்கினது இரட்டைப் பிளவுச் சோதனையில், ஓரியல்பு மூலங்களுக்கிடையிலான இடை வெளி பாதியாக்கப்பட்டு, ஓரியல்பு மூலங்களிலிருந்து திரையினது தொலை இரட்டிப்பாக்கப் படுகிறது எனில், பட்டைவரி அகலம் :
- நான்கில் ஒரு பங்காகும்
  - இரட்டிப்பாகும்
  - பாதியாகும்
  - நான்கு மடங்காகும்
19. ஒரே பொருளாலான, கிடார் ஒன்றின் A மற்றும் B ஆகிய இரு நரம்புகள் சிறிதளவு சுருதியில் வேறுபடுகின்றன மற்றும் அவை 6 Hz, அதிர்வெண் கொண்ட விம்மல்களை ஏற்படுத்துகின்றன. B -யில் உள்ள இழுவிசை சிறிதளவு குறைக்கப்படும் போது, விம்மல் அதிர்வெண் 7 Hz ஆக அதிகரிக்கிறது. A -யினது அதிர்வெண், 530 Hz எனில், B -யினது தொடக்க அதிர்வெண் மதிப்பு என்பது :
- 537 Hz
  - 523 Hz
  - 524 Hz
  - 536 Hz
20. ஓர் p-n சந்தி டயோடினது இயக்கமில்லாப் பகுதியின் அகலம் அதிகரிப்பது என்பது இதனால் ஏற்படுகிறது :
- முன்னோக்கு மின்னோட்ட அதிகரிப்பு
  - முன்னோக்குச் சார்பு மட்டும்
  - பின்னோக்குச் சார்பு மட்டும்
  - முன்னோக்குச் சார்பு மற்றும் பின்னோக்குச் சார்பு ஆகிய இரண்டும்

21. நிலையாக பொருத்தப்பட்டுள்ள தாங்கி ஒன்றில், L நீளம் மற்றும் A, குறுக்குவெட்டு பரப்பு கொண்ட கம்பி ஒன்று தொங்கவிடப் பட்டுள்ளது. M எனும் நிறை, அதன் கட்டற்ற முனையிலிருந்து தொங்கவிடப்படும் போது, கம்பியின் நீளம், L<sub>1</sub> என்று மாறுகிறது எனில், யங்கின் குணகத்திற்கான கோவை என்பது :
- $$\frac{MgL}{A(L_1 - L)}$$
- $\frac{MgL_1}{AL}$
  - $\frac{Mg(L_1 - L)}{AL}$
  - $\frac{MgL}{AL_1}$
22. DNA -வில் உள்ள பிணைப்பு ஒன்றினை முறிக்க தேவையான ஆற்றல்,  $10^{-20} \text{ J}$  ஆகும். eV-யில் இதன் மதிப்பு, ஏற்குறைய :  
(1) 0.006  
(2) 6  
(3) 0.6  
(4) 0.06
23. பயன்தொடக்க அதிர்வெண்ணின் 1.5 மடங்கு அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி, ஒரு ஒளி உணர்வு நுட்ப பொருள்மீது விழுகிறது. அதிர்வெண் பாதியாகவும், செறிவு இரட்டிப்பாகவும் ஆக்கப்படும்போது, ஒளி மின்னோட்டம் என்னவாகும் ?  
(1) சுழியாகும்  
(2) இரட்டிப்பாகும்  
(3) நான்கு மடங்காகும்  
(4) நான்கில் ஒரு பங்காகும்
24. தகைவு என்பதன் பரிமாணங்கள் :  
(1)  $[ML^{-1}T^{-2}]$   
(2)  $[MLT^{-2}]$   
(3)  $[ML^2T^{-2}]$   
(4)  $[ML^0T^{-2}]$
25.  $3 \times 10^{-10} \text{ Vm}^{-1}$  மதிப்புடைய மின்புலத்தில்,  $7.5 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$  எனும் நகர்வு திசைவேக-முடைய ஒரு மின்னோட்டப்பட்ட துகள் பெறும் நகர்வு திறன்,  $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$  என்ற அலகில் :  
(1)  $2.25 \times 10^{-15}$   
(2)  $2.25 \times 10^{15}$   
(3)  $2.5 \times 10^6$   
(4)  $2.5 \times 10^{-6}$

26. ஒரு திருகு அளவி,  $0.01 \text{ mm}$  எனும் மீச்சிற்றளவினையும், மேலும் தனது வட்ட அளவுகோலில் 50 பிரிவுகளையும் பெற்றுள்ளது. அத்திருகு அளவியின், புரி எண்பது :
- $1.0 \text{ mm}$
  - $0.01 \text{ mm}$
  - $0.25 \text{ mm}$
  - $0.5 \text{ mm}$
27. (A எனும் முப்பட்டக்கோணம் கொண்ட) ஒரு குறுங்கோண முப்பட்டகத்தின் ஒரு பரப்பில், ஓர் ஒளிக்கதிரானது,  $i$  எனும் வீழ்கோணத்தில் விழுகிறது. மேலும் அது எதிர்ப்பக்க பரப்பு வழியாக செங்குத்தாக வெளியேறுகிறது. முப்பட்டக பொருளின் ஒளி விலகல் என்,  $\mu$ , எனில், வீழ் கோணம் ஏற்குறைய சமமாக இருப்பது :
- $\frac{\mu\text{A}}{2}$
  - $\frac{\text{A}}{2\mu}$
  - $\frac{2\text{A}}{\mu}$
  - $\mu\text{A}$
28. ஒரு  $40 \mu\text{F}$  மின்தேக்கி,  $200 \text{ V}$  மற்றும்  $50 \text{ Hz ac}$  மின் அளிப்பானோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சுற்றிலுள்ள மின்னோட்டத்தினது  $\text{rms}$  மதிப்பு ஏற்குறைய :
- $25.1 \text{ A}$
  - $1.7 \text{ A}$
  - $2.05 \text{ A}$
  - $2.5 \text{ A}$
29. டிரான்சிஸ்டரது செயல்பாட்டிற்கு, பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது ?
- அடிவாய் பகுதி மிக மெல்லியதாகவும், மிதமான மாசுமட்டும் அமைய வேண்டும்.
  - அடிவாய், உமிழ்வாய் மற்றும் ஏற்பி பகுதிகள் சமமான மாசுப்பொருள் அடர்த்திகளோடு அமைய வேண்டும்.
  - அடிவாய், உமிழ்வாய் மற்றும் ஏற்பி பகுதிகள் சமமான உருவளவினை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
  - உமிழ்வாய் சந்தி மற்றும் ஏற்பி சந்தி ஆகிய இரண்டும் முன்னோக்கு சார்பினை பெற்றிருக்கும்.

30. ஒரு பொருளது  $0.5 \text{ g}$ -ற்கான ஆற்றல் சமன் எண்பது :
- $0.5 \times 10^{13} \text{ J}$
  - $4.5 \times 10^{16} \text{ J}$
  - $4.5 \times 10^{13} \text{ J}$
  - $1.5 \times 10^{13} \text{ J}$
31. தனிச்சிறப்பு மிக்க இலக்கங்களை கருத்தில் கொள்ளுகையில்,  $9.99 \text{ m} - 0.0099 \text{ m}$  எண்பதன் மதிப்பு யாது ?
- $9.9 \text{ m}$
  - $9.9801 \text{ m}$
  - $9.98 \text{ m}$
  - $9.980 \text{ m}$
32. ஒரு நிறையில்லா கம்பியின் முனைகளில்  $4 \text{ kg}$  மற்றும்  $6 \text{ kg}$  நிறை கொண்ட ஒரு பொருட்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. கம்பி கடந்துசெல்லும் இழுவை (pulley), உராய்வற்று. (படத்தில் காண்க). புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தினை ( $g$ ) பொருந்த, ஒருங்கின்து முடுக்கம் எண்பது :
- 
- $g/10$
  - $g$
  - $g/2$
  - $g/5$
33. சம கொள்ளவு பெற்றுள்ள ஒரு உருளைகள் A மற்றும் B, ஒன்றோடொன்று ஓர் அடைப்பான் வழியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. A, திட்ட வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில், நல்லியல்பு வாயு ஒன்றினைக் கொண்டுள்ளது. B, முழுவதுமாக காலியாக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பு முழுவதும் வெப்பக்காப்பிடப் பட்டுள்ளது. அடைப்பான், விரைவாக திறக்கப் படுகிறது. இந்த நிகழ்வு, இந்த வகையைச் சார்ந்தது :
- மாறா அழுத்தம்
  - மாறா வெப்பநிலை
  - வெப்ப மாற்றீடற்றது
  - மாறா பருமம்

34. காட்டப்பட்டுள்ள வாதியல் மின்சுற்றிற்கான மெய் அட்டவணை என்பது :



	A	B	Y
(1)	0	0	1
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	0
(2)	A	B	Y
	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1
(3)	A	B	Y
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	1
(4)	A	B	Y
	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0


35. ஒரு விண்மீனிலிருந்து,  $600\text{ nm}$  அலைநீளம் கொண்ட ஒளி வருகிறது என அனுமானிக்க.  $2\text{ m}$  விட்டம் கொண்ட பொருளருகு வில்லையை கொண்ட தொலைநோக்கியினது பகுதிறன் வரம்பு என்பது :

- (1)  $6.00 \times 10^{-7}\text{ rad}$
- (2)  $3.66 \times 10^{-7}\text{ rad}$
- (3)  $1.83 \times 10^{-7}\text{ rad}$
- (4)  $7.32 \times 10^{-7}\text{ rad}$

36. காற்றினை ஊடகமாகப் பெற்றுள்ள ஒர் இணைத்தட்டு மின்தேக்கியினது, மின்தேக்குதிறன்,  $6\text{ }\mu\text{F}$  ஆகும். மின்கடத்தாப்பொருள் ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்துவதால், அதன் மின்தேக்குதிறன்,  $30\text{ }\mu\text{F}$  என்று ஆகிறது. ஊடகத்தின் அனுமதித்திறனானது :

- $$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$
- (1)  $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
  - (2)  $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
  - (3)  $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
  - (4)  $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

37. ஒரு மின்தடையினது நிறக்குறியீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



மஞ்சள் ஊதா பழுப்பு பொன்னிறம்

மின்தடை மற்றும் சகிப்புத்தன்மை ஆகிய-வற்றின் மதிப்புகள், முறையே :

- (1)  $470 \Omega, 5\%$
- (2)  $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (3)  $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- (4)  $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$

38.  $0.2\text{ m}^3$  பருமன் கொண்டதோரு குறிப்பிட்ட வெளிப்பகுதியில், எங்கும்,  $5\text{ V}$  மின்னழுத்தம் காணப்படுகிறது. இப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மின்புலமதிப்பானது :

- (1)  $5 \text{ N/C}$
- (2) சுழி
- (3)  $0.5 \text{ N/C}$
- (4)  $1 \text{ N/C}$

39. எதிர்க்குறி வெப்ப மின்தடை எண் கொண்ட திண்மங்கள் என்பன :

- (1) மின்காப்புப் பொருட்கள் மற்றும் குறை-கடத்திகள்
- (2) உலோகங்கள்
- (3) மின்காப்புப் பொருட்கள் மட்டும்
- (4) குறைகடத்திகள் மட்டும்





40.  $20\text{ W/cm}^2$  எனும் சராசரி பாய அடர்த்தி கொண்ட ஒளி,  $20\text{ cm}^2$  பரப்பளவு உடைய எதிரொளிப் பற்ற பரப்பின் மீது செங்குத்து வீழலில் விழுகிறது.  $1\text{ நிமிட}$  கால இடைவெளியில், பரப்பால் ஏற்கப்பட்ட ஆற்றல் என்பது :

- (1)  $48 \times 10^3 \text{ J}$
- (2)  $10 \times 10^3 \text{ J}$
- (3)  $12 \times 10^3 \text{ J}$
- (4)  $24 \times 10^3 \text{ J}$





41. ஒர் இடைமுகத்திம் ப்ரூஸ்டர் கோணம்,  $i_b$  அமையவேண்டிய மதிப்பு :

- (1)  $i_b = 90^\circ$
- (2)  $0^\circ < i_b < 30^\circ$
- (3)  $30^\circ < i_b < 45^\circ$
- (4)  $45^\circ < i_b < 90^\circ$

42. 50 cm நீளமும், 100 சுற்றுகளையும் உடையதொரு நீள்வரிச்சுருள்,  $2.5 \text{ A}$  மின்னோட்டத் தினை தாங்கிச் செல்கிறது. நீள் வரிச்சுருளின் மையத்தில் உள்ள காந்தப்புலம் என்பது : ( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ )
- $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$
  - $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
  - $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$
  - $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$
43. ஒரு தொடர் LCR மின்சுற்று, ஓர் ac மின்னமுத்த மூலத்தோடு இணைக்கப் பட்டுள்ளது. மின்சுற்றிலிருந்து, L விலக்கப்படும் போது, மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னமுத்தத் திற்கிடையிலான கட்டவேறுபாடு,  $\frac{\pi}{3}$  ஆகும். இதற்கு பதிலாக, C மின்சுற்றிலிருந்து விலக்கப்படின், மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னமுத்தத்திற்கிடையிலான கட்ட வேறுபாடு, மீண்டும்  $\frac{\pi}{3}$  என்றமைகிறது. மின்சுற்றினது திறன் காரணி என்பது :
- 1.0
  - சுழி
  - 0.5
  - 1.0
44. சீரிசை இயக்கத்திலுள்ள துகள் ஒன்றின் இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் முடுக்கம் ஆகியவற்றிற் கிடையிலான கட்ட வேறுபாடு என்பது :
- சுழி
  - $\pi \text{ rad}$
  - $\frac{3\pi}{2} \text{ rad}$
  - $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
45.  $2\hat{k}$  m என்ற ஆர் வெக்டர் கொண்ட துகள் ஒன்றின் மீது, மூலத்தைப் பொருத்த  $3\hat{j}$  N என்றதொரு விசை செயல்படும் போதுள்ள திருப்புவிசையைக் காண்க.
- $6\hat{k}$  N m
  - $6\hat{i}$  N m
  - $6\hat{j}$  N m
  - $-6\hat{i}$  N m

46. உர்ட்ஸ் வினையில் கீழ்கண்ட எந்த ஆல்கேன்-ஐ பெருமளவில் தயாரிக்க இயலாது ?
- n-ப்பிட்டேன்
  - n-ஹெக்சேன்
  - 2,3-டைமெத்தில் ப்பிட்டேன்
  - n-ஹெப்டேன்
47. கீழ்கண்ட வினையில் கார்பனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன ?
- $$\text{CH}_4(\text{g}) + 4\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CCl}_4(\text{l}) + 4\text{HCl}(\text{g})$$
- 0 இல் இருந்து -4
  - +4 இல் இருந்து +4
  - 0 இல் இருந்து +4
  - 4 இல் இருந்து +4
48. ஒரு ஆல்கீன் ஒச்சோனேற்றத்தின் போது மெத்தனல் -ஐ ஒரு வினை பொருளாகத் தருகின்றது. அதன் அமைப்பானது :
- 
  - 
  - 
  - 

49. யூரியா நீருடன் வினைபுரிந்து A -வை தருகின்றது, அது சிதைவடைந்து B -யை தரும். B -யை ஆழ்ந்த நீலம் நிறமுடைய  $Cu^{2+}$  (aq) கரைசலினுள் செலுத்தும் போது C -யை தருகின்றது. கீழ்கண்டவற்றுள் C-யின் வாய்பாடு என்ன?
- $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$
  - $CuSO_4$
  - $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
  - $Cu(OH)_2$
50. சரியாக பொருந்தாதவற்றை கண்டறியவும்.
- | பெயர்           | IUPAC அதிகார-<br>பூர்வமான பெயர் |
|-----------------|---------------------------------|
| (a) Unnilunium  | (i) மெண்டலீவியல்                |
| (b) Unniltrium  | (ii) லாரான்சியம்                |
| (c) Unnilhexium | (iii) ஸ்போர்ஜியம்               |
| (d) Unununniun  | (iv) டார்மஸ்டாட்-<br>டியம்      |
- (d), (iv)
  - (a), (i)
  - (b), (ii)
  - (c), (iii)
51. 2-புரோமோ பென்டேன் நீக்கவினையில் ஈடுபட்டு பென்ட-2-ன் உருவாகும் போது நிகழும் வினை எது?
- β-நீக்க வினை
  - செயிட்செவ் விதியை பின்பற்றுகிறது
  - ஹெட்ரஜன் ஹாலஜன் நீக்கவினை
  - நீர் நீக்க வினை
- (a), (b), (d)
  - (a), (b), (c)
  - (a), (c), (d)
  - (b), (c), (d)
52. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று அதிகப்பட்ச எண்ணிக்கையிலான அனுக்களை கொண்டுள்ளது?
- 1 g Li(s) [Li -யின் அணுநிறை = 7]
  - 1 g Ag(s) [Ag -யின் அணுநிறை = 108]
  - 1 g Mg(s) [Mg -யின் அணுநிறை = 24]
  - 1 g O<sub>2</sub>(g) [O -யின் அணுநிறை = 16]

53. கீழ்கண்டவற்றுள் சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- தேனிரும்பு பல்வேறு அமைப்புகளாக வார்ப்பு செய்யப்படுகிறது.
  - 4% கார்பன் உடைய மெல்லிரும்பு தூய்மையற்றது.
  - CO<sub>2</sub> வெளிவருவதால் கொப்பளக் காப்பரானது கொப்பளத்தேற்றத்தை கொண்டுள்ளது.
  - வான் -ஆர்க்கல் முறையில் நிக்கல் ஆவி அழுத்த தூய்மையாக்கல் செய்யப் படுகிறது.
54. ஒரு மூவினைய பிழுடைல் கார்பன் நேர் அயனி, ஒரு ஈரினைய பிழுடைல் கார்பன் நேர் அயனியைவிட அதிக நிலைப்புத்தன்மையை கொண்டிருப்பதற்கு கீழ்கண்டவற்றுள் எது, காரணமாகிறது?
- பினைப்பில்லா உடனிசைவு/குறை பினைப்பு
  - CH<sub>3</sub> தொகுதிகளின் -I விளைவு
  - CH<sub>3</sub> தொகுதிகளின் +R விளைவு
  - CH<sub>3</sub> தொகுதிகளின் -R விளைவு
55. அனிசோலை, HI உடன் பின்தல் வினைக்கு உட்படுத்தும் போது கிடைப்பது:
-  + C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH
  -  + CH<sub>3</sub>I
  -  + CH<sub>3</sub>OH
  -  + C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>I

56. ஒரு சிலின்டரில்  $N_2$  மற்றும் Ar வாயுக்கள் கொண்ட ஒரு கலவை உள்ளது. அதில் 7 g  $N_2$  மற்றும் 8 g Ar உள்ளது. சிலின்டரில் உள்ள வாயு கலைவயின் மொத்த அழுத்தம் 27 bar எனில்,  $N_2$ -வின் பகுதி அழுத்தம் :

[ $N = 14$ ,  $Ar = 40$  ( $g\ mol^{-1}$  -ல்) : அனுநிறைகளை பயன்படுத்துக]

- (1) 18 bar
- (2) 9 bar
- (3) 12 bar
- (4) 15 bar

57. கீழ்கண்ட மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பில் எது பூஜ்ய இருமுனை திருப்புத்திறனை கொண்டுள்ளது ?

- (1) போரான் ட்ரை புளூரெடு, பெரிலியம் டை புளூரெடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, 1,4-டை குளோரோ பென்சீன்
- (2) அம்மோனியா, பெரிலியம் டை புளூரெடு, நீர், 1,4-டை குளோரோ பென்சீன்
- (3) போரான் ட்ரை புளூரெடு, ஷஹ்ட்ரஜன் புளூரெடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, 1,3-டை குளோரோ பென்சீன்
- (4) நைட்ரஜன் ட்ரை புளூரெடு, பெரிலியம் டை புளூரெடு, நீர், 1,3-டை குளோரோ பென்சீன்

58. கீழ்கண்டவற்றை பொருத்துக.

**ஆக்சைடு**

- |               |       |             |
|---------------|-------|-------------|
| (a) CO        | (i)   | கார்        |
| (b) BaO       | (ii)  | நடுநிலை     |
| (c) $Al_2O_3$ | (iii) | அமில        |
| (d) $Cl_2O_7$ | (iv)  | ஈரியல்புள்ள |





**தன்மை**

- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1)        | (iv)       | (iii)      | (ii)       |
| (2)        | (i)        | (ii)       | (iii)      |
| (3)        | (ii)       | (i)        | (iv)       |
| (4)        | (iii)      | (iv)       | (i)        |

59. ஒரு முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலி  $4.606 \times 10^{-3} s^{-1}$  ஆகும். 2.0 g வினைபடு பொருள் 0.2 g ஆக குறைவதற்கு தேவைப் படும் நேரம் :

- (1) 1000 s
- (2) 100 s
- (3) 200 s
- (4) 500 s

60. கீழ்கண்ட அமீனில் எவை கார்பலமைன் சோதனையை தருகின்றது ?



61. கூழ்ம கரைசலின் எந்த பண்பினை நிர்ணயிப்பதற்கு ஜிட்டாதிறன் அளவீடு பயன்படுகின்றது ?

- (1) கூழ்மத்துகள்களின் உருவ அளவு
- (2) பாகுத் தன்மை
- (3) கரைதிறன்
- (4) கூழ்மத்துகள்களின் நிலைப்புத்தன்மை

62. ஒரு வினையின் வினைபடு பொருள்களின் செறிவு அதிகரிப்பதனால் கீழ்கண்ட எது மாறுபடும் ?

- (1) மோதல் அதிர்வெண்
- (2) கிளர்வுகொள் ஆற்றல்
- (3) வினை வெப்பம்
- (4) பயன் தொடக்க ஆற்றல்/குறைந்த பட்ச இயக்க ஆற்றல்

63. கீழ்கண்ட எந்த உலோக அயனிபல் நொதிகளை தூண்டி குளுகோசின் ஆக்லிஜனேற்றத்தில் பங்கேற்று, ATP -யை உற்பத்தி செய்து மற்றும்  $\text{Na}^-$ -வுடன் நரம்பு சைகை பரிமாற்றத்திற்கு காரணமாக அமைகிறது?
- பொட்டாசியம்
  - இரும்பு
  - காப்பர்
  - கால்சியம்
64. பிளாட்டினம் (Pt) மின் முனையை பயன்படுத்தி நீர்த்த சல்டூரிக் அமிலத்தை மின்னாற்ற பகுக்கும் போது, நேர்மின் முனையில் கிடைக்கும் விளைபொருள்:
- $\text{SO}_2$  வாயு
  - வைட்ரஜன் வாயு
  - ஆக்லிஜன் வாயு
  - $\text{H}_2\text{S}$  வாயு
65. கீழ்கண்டவற்றில் எந்த ஒன்று கார அமினோ அமிலம் ஆகும்?
- லைசின்
  - சிரென்
  - அலனென்
  - டெரோசின்
66. நீர்த்த  $\text{NaOH}$  முன்னிலையில் பென்சால்டிலூடு மற்றும் அசிட்டோபீனோன் இடையிலான வினை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது?
- குறுக்க ஆல்டால் குறுக்கம்
  - ஆல்டால் குறுக்கம்
  - கானிசரோ வினை
  - குறுக்க கானிசரோ வினை
67.  $\text{Cr}^{2+}$  அயனியின் கணக்கிடப்பட்ட சுழற்சி காந்ததிருப்புத்திறனானது:
- 2.84 BM
  - 3.87 BM
  - 4.90 BM
  - 5.92 BM

68. சுக்ரோசின் நீராற்பகுத்தல், கீழ்கண்ட வினையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- $$\text{சுக்ரோஸ்} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{குளுகோஸ்} + \text{ப்ரக்டோஸ்}$$
- 300 K -இல் சமநிலை மாற்றிலியானது ( $K$ )  $2 \times 10^{13}$  எனில், அதே வெப்பநிலையில்  $\Delta_r G^\ominus$  மதிப்பானது :
- $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
  - $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
  - $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
  - $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
69. ரெளவட் விதியிலிருந்து நேர்விலக்கம் காண்டிக்கும் கலவையானது :
- குளோரோ ஈத்தேன் + புரோமோ ஈத்தேன்
  - எத்தனால் + அசிட்டோன்
  - பென்சீன் + டொலுவீன்
  - அசிட்டோன் + குளோரோபார்ம்
70. சுக்ரோஸை நீரால் பகுத்தால் கிடைப்பது :
- $\alpha$ -D-ப்ரக்டோஸ் +  $\beta$ -D-ப்ரக்டோஸ்
  - $\beta$ -D-குளுகோஸ் +  $\alpha$ -D-ப்ரக்டோஸ்
  - $\alpha$ -D-குளுகோஸ் +  $\beta$ -D-குளுகோஸ்
  - $\alpha$ -D-குளுகோஸ் +  $\beta$ -D-ப்ரக்டோஸ்
71. தாள் / காகித வண்ணப்பிரிகை எதற்கான எடுத்துக்காட்டு?
- பத்தி வண்ணப்பிரிகை
  - பரப்புக் கவர்ச்சி வண்ணப்பிரிகை
  - பங்கீடு வண்ணப்பிரிகை
  - மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை
72. அணைவுச் சேர்மங்கள் உருவாவதில் ஈனிகளின் புல வலிமையின் சரியான ஏறு வரிசை கீழ்கண்டவற்றில் எது?
- $\text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{SCN}^- < \text{F}^-$
  - $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
  - $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
  - $\text{F}^- < \text{SCN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
73. வெப்பம் மாறா நிபந்தனையின் கீழ், ஒரு நல்லியல்பு வாயு வெற்றிட விரிவாக்கம் அடைவதற்குரிய சரியான தெரிவானது:
- $q > 0, \Delta T > 0$  மற்றும்  $w > 0$
  - $q = 0, \Delta T = 0$  மற்றும்  $w = 0$
  - $q = 0, \Delta T < 0$  மற்றும்  $w > 0$
  - $q < 0, \Delta T = 0$  மற்றும்  $w = 0$






74.  $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2\text{(g)}$  வினையில், சரியான விடையானது :

- $\Delta_r\text{H} < 0$  மற்றும்  $\Delta_r\text{S} < 0$
- $\Delta_r\text{H} > 0$  மற்றும்  $\Delta_r\text{S} > 0$
- $\Delta_r\text{H} > 0$  மற்றும்  $\Delta_r\text{S} < 0$
- $\Delta_r\text{H} < 0$  மற்றும்  $\Delta_r\text{S} > 0$

75. அசிட்டோன் மற்றும் மெத்தில் மெக்ஸியம் ஆகியவை வினைபுரிந்து பின் அதன் தொடர்ச்சியாக நீராற்படுத்தால் கிடைக்கும் வினைபொருள் :

- ஐசோபியூட்டைல் ஆல்கஹால்
- ஐசோபுரப்பைல் ஆல்கஹால்
- ஈரினைப் பியூட்டைல் ஆல்கஹால்
- மூவினைய பியூட்டைல் ஆல்கஹால்

76. கீழ்கண்ட வினைத் தொடரில் உருவாகும் சேர்மம் X -யை கண்டறியவும்.



77. உருகிய  $\text{CaCl}_2$  -வில் இருந்து 20 g கால்சியம் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவைப்படும் பாரடேக்களின் (F) எண்ணிக்கை :

- (Ca -ன் அணு நிறை =  $40\text{ g mol}^{-1}$ )
- 4
  - 1
  - 2
  - 3

78. கீழ்கண்டவற்றுள் நேர் அயனி அழுக்குநீக்கி எது ?

- சோடியம் டோடெக்கைல் பென்சீன் சல்போனேட்
- சோடியம் லாரெல் சல்பேட்
- சோடியம் ஸ்டேரேட்
- சீடைல்ட்ரைமெத்தில் அம்மோனியம் புரோமைடு

79. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று இயற்கை பலபடி?

- பாலி (ப்புட்டாடையீன்-அக்ரேலோ-நைட்ரைல்)
- சிஸ்-1,4- பாலிஜூசோபீரின்
- பாலி (ப்புட்டாடையீன்-ஸ்டைரீன்)
- பாலி ப்புட்டாடையீன்

80. கீழ்கண்ட சல்பரின் அமில ஆக்சைடுகளில் எவை  $-\text{O}-\text{O}-$  பினைப்பை கொண்டுள்ளது ?

- $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ , பெரோ சல்பூரிக் அமிலம்
- $\text{H}_2\text{SO}_3$ , சல்பூரஸ் அமிலம்
- $\text{H}_2\text{SO}_4$ , சல்பூரிக் அமிலம்
- $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ , பெர் ஆக்சோடை சல்பூரிக் அமிலம்

81. 0.1 M  $\text{NaOH}$  இல்  $\text{Ni(OH)}_2$  -வின் கரைதிறனை கண்டறியவும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள  $\text{Ni(OH)}_2$  -வின் அயனிப் பெருக்கமானது  $2 \times 10^{-15}$ .

- $1 \times 10^8\text{ M}$
- $2 \times 10^{-13}\text{ M}$
- $2 \times 10^{-8}\text{ M}$
- $1 \times 10^{-13}\text{ M}$

82. எந்த ஒரு மூலக்கூறு உருவாகாது என்பதனை கண்டறியவும்.

- $\text{O}_2$
- $\text{He}_2$
- $\text{Li}_2$
- $\text{C}_2$

83. பென்சீனின் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலியின் ( $K_f$ ) மதிப்பு  $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$ . மின்பகுளி அல்லாத கரைபொருளை கொண்ட 0.078 m மோலாலிட்டி பென்சீன் கரைசலின் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலி :
- (இரண்டு தசம புள்ளி வரை முழுமையாக்கவும்)
- 0.60 K
  - 0.20 K
  - 0.80 K
  - 0.40 K
84.  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{MgCl}_2$  மற்றும்  $\text{NaCl}$  கரைசலினுள்  $\text{HCl}$  செலுத்தப்படுகின்றது. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்தசேர்மம்/களில் ஒன்று படிகமாகும் ?
- $\text{NaCl}$ ,  $\text{MgCl}_2$  மற்றும்  $\text{CaCl}_2$
  - $\text{MgCl}_2$  மற்றும்  $\text{CaCl}_2$  இரண்டுமே
  - $\text{NaCl}$  மட்டும்
  - $\text{MgCl}_2$  மட்டும்
85.  $^{175}_{71}\text{Lu}$  உள்ள புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை முறையே :
- 175, 104 மற்றும் 71
  - 71, 104 மற்றும் 71
  - 104, 71 மற்றும் 71
  - 71, 71 மற்றும் 104
86. கீழ்கண்டவற்றில் கார்பன்மோனாக்சைடு குறித்து எது சரியற்றது ?
- முழுமையடையாத ஏரிதலினால் உற்பத்தியாகின்றது
  - அது கார்பாக்ஸி ஹீமோகுளோபினை உருவாக்கும்
  - அது இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் கடத்தும் திறனை குறைக்கின்றது.
  - கார்பாக்ஸி ஹீமோகுளோபின் (ஹீமோகுளோபின் CO உடன் இணைந்த அமைப்பு) ஆக்ஸி ஹீமோகுளோபினைக் காட்டிலும் குறைந்த நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது

87. கீழ்கண்டவற்றை பொருத்தி சரியான விடையை கண்டறியவும்.
- |   |   |
|---|---|
| (a) $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ | (i) $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ |
| (b) தற்காலிக கடின நீர்                    | (ii) ஒரு எலக்ட்ரான் குறை வைட்டரைடு                          |
| (c) $\text{B}_2\text{H}_6$                | (iii) தொகுப்பு வாயு   |
| (d) $\text{H}_2\text{O}_2$                | (iv) தளமற்ற அமைப்பு   |
- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1) (i)    | (iii)      | (ii)       | (iv)       |
| (2)        | (iii)      | (i)        | (iv)       |
| (3)        | (iii)      | (ii)       | (i)        |
| (4)        | (iii)      | (iv)       | (ii)       |
88. சரியற்ற கூற்றை கண்டறியவும்.
- $\text{CrO}_4^{2-}$  மற்றும்  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ -இல் குரோமியத் தின் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகள் ஒத்ததாக இருக்காது.
  - நீரில்  $\text{Fe}^{2+}(\text{d}^6)$  -யை காட்டிலும்  $\text{Cr}^{2+}(\text{d}^4)$  ஒரு வலிமை மிகு ஒடுக்கும் காரணியாகும்.
  - இடைநிலை உலோகங்களும் மற்றும் அதன் சேர்மங்களும் பல்வேறு ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றிருக்கும் திறன் வாய்ந்ததாலும் மற்றும் அணைவுகளை உருவாக்குவதாலும் அவை சிறந்த விணையூக்கி பண்பை பெற்றுள்ளன.
  - உலோகங்களின் படிக கூட்டில் சிறு அணுக்களான H, C அல்லது N உள்ளிருக்கப்பட்டு உருவாக்கப்படுவதே இடையூட்டுச் சேர்மங்களாகும்.
89. பொருள் மைய கனச்சதூர (bcc) அமைப்புடைய ஒரு தனிமத்தின் கூடுவினிமிபின் மதிப்பு 288 pm எனில், அதன் அணு ஆரமானது :
- |  |
|--|
| (1) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$ |
| (2) $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$ |
| (3) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$ |
| (4) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$ |

- 90.** கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து சரியான கூற்றுகளை கண்டறியவும்.
- ஐஸ்கீரீம் மற்றும் உறைந்த உணவிற்கு  $\text{CO}_2(\text{g})$  குளிருட்டியாக பயன்படுகிறது.
  - $\text{C}_{60}$  அமைப்பானது பன்னிரெண்டு ஆறு கார்பன் கொண்ட வளையத்தையும் மற்றும் இருபது ஐந்து கார்பன் கொண்ட வளையத்தையும் கொண்டது.
  - ZSM-5, ஜீயோலெட்டின் ஒரு வகை, ஆல்கஹால்களை பெட்ரோலாக மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது.
  - CO நிறமற்ற மற்றும் மணமற்ற வாயுவாகும்.
- (c) மற்றும் (d) மட்டும்
  - (a), (b) மற்றும் (c) மட்டும்
  - (a) மற்றும் (c) மட்டும்
  - (b) மற்றும் (c) மட்டும்
- 91.** தாவரங்களில் இன்றியமையாத மூலங்கள் மற்றும் அவற்றின் செயல்கள் குறித்த கீழ்கண்டவற்றை பொருத்துக.
- இரும்பு (i) ஓளிசார் நீர் பகுப்பு
  - துக்தநாகம் (ii) மகரந்தத்துகள் முளைத்தல்
  - போரான் (iii) குளோரோபில் உயிர்ம வழி உருவாக்கத்தில் தேவைப் படுவது
  - மாங்கனீசு (iv) IAA உயிர்மவழி உருவாக்கம்
- சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும்.**
- |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>(a)</b>              | <b>(b)</b>              | <b>(c)</b>              | <b>(d)</b>              |
| (1) (iv) (i) (ii) (iii) | (2) (ii) (i) (iv) (iii) | (3) (iv) (iii) (ii) (i) | (4) (iii) (iv) (ii) (i) |
- 92.** கீழ்கண்டவற்றுள் ஓர் இனத் தொகையுடன் தொடர்பில்லாதது எது?
- சிற்றினங்களின் உறவு முறை
  - பால் விகிதம்
  - பிறப்பு வீதம்
  - இறப்பு வீதம்

- 93.** கீழ்கண்ட எது காற்றற்ற சிலட்ஜ் டைஜிஸ்டரில் சேர்க்கப்பட்டு தொடர்ந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிகழ்த்தப்படுகிறது?
- செயல்படுத்தப்பட்ட சிலட்ஜ்
  - முதல் நிலை சிலட்ஜ்
  - மிதக்கும் டெப்ரிஸ்கன்
  - முதல் நிலை சுத்திகரிப்புக்குப்பின் உள்ள கழிவுநீர்
- 94.** அடி தண்டிலிருந்து தோன்றும் வேர்கள் :
- பக்கவாட்டு வேர்கள்
  - சல்லி வேர்கள்
  - முதல் நிலை வேர்கள்
  - தூண் வேர்கள்
- 95.** ஃபுளோரிடியன் தரசம் இதற்கு இணையான அமைப்பைக் கொண்டது.
- லாமினாரின் மற்றும் செல்லுலோஸ்
  - தரசம் மற்றும் செல்லுலோஸ்
  - அமைலோ பெக்டின் மற்றும் கிளை-கோஜன்
  - மான்னிடால் மற்றும் ஆல்ஜின்
- 96.** சினாப்டினிமல் தொகுப்பு எந்த நிலையில் கலைந்து கரையத் தொடங்குகிறது?
- லெப்டோன்
  - பாக்கின்
  - சைக்கோட்டென்
  - டிப்ளோட்டென்
- 97.** மனித செரிமான மண்டலம் குறித்த சரியான கூற்று எது?
- குடல் வால் டியோஷன்த்திலிருந்து தோன்றுகிறது
  - இலியம் சிறு குடலில் திறக்கிறது
  - உணவு பாதையின் உள் படலம் செரோசா என்பது
  - இலியம் என்பது மிகுந்த சுருங்கிய பகுதி
- 98.** புற்களின் இலை நுனியில் நீர் திரவ நிலையில் இரவிலும் அதிகாலையிலும் வடிவதற்கு காரணமான நிகழ்வு எது?
- பிளாஸ்மா சிதைவு
  - நீராவிப்போக்கு
  - வேர் அழுத்தம்
  - உள்ளீர்த்தல்

- 99.** சூலின் உடலம் பிழுனிகினில் இணைந்து காணப்படும் பகுதி :
- சலாசா
  - ஹைலம் (சூல் தழும்பு)
  - சூல் துளை
  - நியூசெல்லஸ் (சூல் திசு)
- 100.** ஒரு எதிரிடைப் பண்புக் கூறு தவிர்த்து ஏனையைவெல் ஒத்த எத்தனை ஜோடிப் பண்புகளை மெண்டல் தனித்த தூயவுழி பட்டாணித் தாவர வகைகளில் தேர்ந்தெடுத்தார் ?
- 8
  - 4
  - 2
  - 14
- 101.** தொகுதி கார்டேட்டா பற்றிய சரியான கூற்றுகள் யாது ?
- வால் நாணிகளில் முதுகுநாண் தலை முதல் வால் வரை வாழ்காலம் முழுவதும் காணப்படும்.
  - முதுகெலும்புகளில் முதுகு நாண் கருவளர்ச்சிக் காலத்தில் மட்டும் காணப்படும்.
  - மைய நரம்புத் தொகுதி முதுகுபுறத்தில் உள்ளீடற்றி நரம்பினை கொண்டது.
  - கார்டேட்டா மூன்று துணை தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது; அரை நாணிகள், மூன்று கேட்டா மற்றும் தலை நாணிகள்.
- (b) மற்றும் (c)
  - (d) மற்றும் (c)
  - (c) மற்றும் (a)
  - (a) மற்றும் (b)
- 102.** பயறுவகைத் தாவரங்களின் வேர் முண்டுகளில் நைட்ரோஜினேஸ் மூலமாக விணையூக்கப்பட்ட வேதி விணையின் விளைப் பொருள்கள் :
- அம்மோனியா மற்றும் ஹைட்ரஜன்
  - அம்மோனியா மட்டும்
  - நைட்ரேட் மட்டும்
  - அம்மோனியா மற்றும் ஆக்ஸிஜன்
- 103.** சிட்ரிக் அமில சூழ்சியின் ஒரு சூலின் போது தளப் பொருள் பாஸ்பாரிகரணம் நடைபெறுவதன் எண்ணிக்கை :
- மூன்று
  - பூஜ்ஞியம்
  - ஒன்று
  - இரண்டு
- 104.** கீழ்கண்டவற்றுள் பூமியின் எப்பகுதிகளில் அதிக அளவில் சிற்றினப் பன்மயம் காணப்படுகிறது ?
- அமோசான் காடுகள்
  - இந்தியாவின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை
  - மடகாஸ்கர்
  - இமய மலை
- 105.** EcoRI கண்டறியும் பாலின்டுரோமிக் வரிசை எது ?
- 5' - GGATCC - 3'
  - 3' - CCTAGG - 5'
  - 5' - GAATTC - 3'
  - 3' - CTTAAG - 5'
  - 5' - GGAACC - 3'
  - 3' - CCTTGG - 5'
  - 5' - CTTAAG - 3'
  - 3' - GAATTC - 5'
- 106.** கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.
- | <b>தொகுதி - I</b>       | <b>தொகுதி - II</b>                        |
|-------------------------|---|
| (a) மிதக்கும் விலா      | (i) இரண்டு மற்றும் ஏழாவது விலா எலும்புகள் |
| (b) ஆக்ரோமியான்         | (ii) வியூமரலின் தலை பகுதி                 |
| (c) ஸ்கேப்டுலா          | (iii) கிளாவிக்கிள்                        |
| (d) கிளீனாய்டு குழி     | (iv) ஸ்டெர்னத்-தோடு இணைந்திராது           |
| (a) (b) (c) (d)         |   |
| (1) (iv) (iii) (i) (ii) |   |
| (2) (ii) (iv) (i) (iii) |   |
| (3) (i) (iii) (ii) (iv) |   |
| (4) (iii) (ii) (iv) (i) |   |

- 107.** கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) ஈசினோ-பீ.பி.ல்கள்
  - (b) பேசோ.பீ.பி.ல்கள்
  - (c) நியூட்ரோ-பீ.பி.ல்கள்
  - (d) லிம்போ-சைட்டுகள்
- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1)        | (ii)       | (i)        | (iii)      |
| (2)        | (iii)      | (iv)       | (ii)       |
| (3)        | (iv)       | (i)        | (ii)       |
| (4)        | (i)        | (ii)       | (iv)       |

**தொகுதி - II**

- (i) தடைகாப்பு துலங்கல்
- (ii) செல் விழுங்குதல்
- (iii) ஹிஸ்டமினேஸ் அழிக்கும் நொதிகளை விடுவித்தல்
- (iv) ஹிஸ்டமின் கொண்ட துகள்களை விடுவித்தல்

- 108.** கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) Bt பருத்தி
  - (b) அடினேசன் டிஅமினேஸ் குறைபாடு
  - (c) ஆர்.என்.ஏ. இடையீடு
  - (d) பி.சி.ஆர்.
- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1)        | (i)        | (ii)       | (iv)       |
| (2)        | (iv)       | (i)        | (ii)       |
| (3)        | (iii)      | (ii)       | (i)        |
| (4)        | (ii)       | (iii)      | (iv)       |

**தொகுதி - II**

- (i) ஜீன் சிகிச்சை தொற்றை கண்டறிதல்
- (ii) செல் வகை தற்காப்பு
- (iii) ஹெச்.ஜி.வி தொற்றை கண்டறிதல்
- (iv) பேசில்லஸ் துரின்.ஜி.யன்சிஸ்

**(a)      (b)      (c)      (d)**

- |     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (i)   | (ii)  | (iii) |
| (2) | (iv)  | (i)   | (ii)  |
| (3) | (iii) | (ii)  | (i)   |
| (4) | (ii)  | (iii) | (iv)  |

- 109.** கிளைகோசெடிக் பிணைப்பு மற்றும் பெப்படைடு பிணைப்பு ஆகிய வற்றை அவற்றின் அமைப்பில் முறையே கொண்ட பொருத்துகளை கண்டறிக.

- (1) இனுலின், இன்கலின்
- (2) கைடின், கொலஸ்ட்ரால்
- (3) கிளிசரால், ட்ரிப்சின்
- (4) செல்லுலோஸ், லெசித்தின்

- 110.** முழுவதும் பால் வினை நோய்கள் அடங்கியது எது?

- (1) புற்றுநோய், எய்ட்ஸ், சி.பி.விலிஸ்
- (2) கொனோரியா, சி.பி.விலிஸ், ஜெனிட்டல் ஹெர்பிஸ்
- (3) கொனோரியா, மலேரியா, ஜெனிட்டல் ஹெர்பிஸ்
- (4) எய்ட்ஸ், மலேரியா, ஃபைலேரியா

- 111.** படியெடுத்தவில் டி.என்.ஏ. ஹெலிக்சை திறக்க உதவும் நொதி எது?

- (1) ஆர்.என்.ஏ. பாலிமரேஸ்
- (2) டி.என்.ஏ. ஸலகேஸ்
- (3) டி.என்.ஏ. ஹெலிக்கேஸ்
- (4) டி.என்.ஏ. பாலிமரேஸ்

- 112.** கீழ்கண்டவற்றுள் விராய்டுகள் குறித்த சரியானது எது?

- (1) அவை புரத உறையற்று தனித்த DNA கொண்டுள்ளவை
- (2) அவை புரத உறையுடன் RNA கொண்டுள்ளவை
- (3) அவை புரத உறையற்று தனித்த RNA கொண்டுள்ளவை
- (4) அவை புரத உறையுடன் DNA கொண்டுள்ளவை

- 113.** கீழ்கண்டவற்றைப் பொருத்துக.

- (a) வினையூக்கசெயல் (i) ரிசின் பாடுகளை தடுப்பவை
- (b) பெப்படைடுபிணைப் (ii) மெலோ-னெட் கூகளைக் கொண்டவை
- (c) பூஞ்சைகளில் செல்-சுவர் பொருள் (iii) கைட்டின் இரண்டாம் நிலை (iv) கொல்வளர்ச்சிதைப்பொருட்கள் லோஜென் கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1)        | (ii)       | (iii)      | (i)        |
| (2)        | (ii)       | (iv)       | (iii)      |
| (3)        | (iii)      | (i)        | (iv)       |
| (4)        | (iii)      | (iv)       | (i)        |

- 114.** எந்த தொழில் நுட்பத்தில் கருவற இயலாத பெண்களுக்கு மகப்பேறுக்காக கரு மாற்றம் செய்யப்படுகிறது ?
- GIFT மற்றும் ICSI
  - ZIFT மற்றும் IUT
  - GIFT மற்றும் ZIFT
  - ICSI மற்றும் ZIFT
- 115.** சில பகுப்புறும் செல்கள் செல் சுழற்சியில் இருந்து விடுபட்டு செயலற்ற வளர்வடக்க நிலைக்கு செல்கின்றன. இதற்கு அமைதி நிலை ( $G_0$ ) என அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்வு எதன் முழுவில் நடைபெறும் ?
- $G_2$  நிலை
  - M நிலை
  - $G_1$  நிலை
  - S நிலை
- 116.** உயிரியுடன் அது தொடர்பான உயிர்நுட்பத்தில் அதன் பயனைப் பொருத்துக.
- |                     |                                |                              |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| (a) பாசில்லஸ்       | (i) குளோனிங் துரின்ஜியன்சிஸ்   | (ii) குடத்தி                 |
| (b) தெர்மஸ்         | (ii) முதல் rDNA அக்குவாடிகஸ்   | (iii) மூலக்கூறை உருவாக்குதல் |
| (c) அக்ரோபா-க்ஸியம் | (iii) DNA                      | (iv) பாலிமரேஸ் இமிபேசியன்ஸ்  |
| (d) சால்மோனெல்லா    | (iv) Cry புரதங்கள் கைபிழுரியம் |                              |
- சரியான விடையை கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்வு செய்யவும்.**
- | (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (iii) | (iv)  | (i)   |
| (2) | (ii)  | (iv)  | (iii) |
| (3) | (iv)  | (iii) | (i)   |
| (4) | (iii) | (ii)  | (iv)  |
- 117.** ஸ்ட்ரோபைலஸ்கள் அல்லது கூம்புகள் இவற்றில் காணப்படுகின்றன :
- சக்குவிசிட்டம்
  - சால்வீனியா
  - டெரிஸ்
  - மார்கான்ஷியா

- 118.** இன்டர்்.பேஸ் நிலையின்  $G_1$  நிலை குறித்த சரியான கூற்று எது ?
- உட்கரு பிரிவு நடைபெறுகிறது
  - டி.என்.ஏ. உருவாக்கம் மற்றும் இரட்டிப் பாதல் நடைபெறுகிறது
  - செல் உள்ளறுப்புகள் அனைத்தும் மறு ஒருங்கமைதல் அடைகிறது
  - செல்லில் வளர்ச்சிதை மாற்ற செயல்கள் நடைபெற்று, செல் வளர்கிறது; ஆனால் டி.என்.ஏ. இரட்டிப்படையாது
- 119.** படிபெயர்த்தவின் முதல் நிலையாவது :
- எதிர் குறியீடினை கண்டறிதல்
  - ரைபோசோம் mRNA உடன் இணைதல்
  - DNA மூலக்கூறை கண்டறிதல்
  - tRNA -வின் அமைனோ அசைல் சேர்த்தல்
- 120.** கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.
- | தொகுதி - I  | தொகுதி - II             |
|---|-------------------------|
| (a) கூட்டமாக வாழும், அனைத்துண்ணும் தீங்குயிரி                       | (i) ஆஸ்டெ-ர்யாஸ்        |
| (b) நிறையுயிரி அரசமச்சீர் கொண்டவை இனவுயிரி இருபக்க சமச்சீர் கொண்டவை | (ii) தேள்               |
| (c) புத்தக நுரை யீரல்   | (iii) மேனா-பிளானா       |
| (d) உயிர் ஓளி   | (iv) லோகஸ்டா            |
| <b>(a) (b) (c) (d)</b>  |                         |
| (1) (ii) (i) (iii) (iv)   | <b>(a) (b) (c) (d)</b>  |
| (2) (i) (iv) (iii) (i)  | (1) (ii) (i) (iv)       |
| (3) (iv) (iii) (i) (ii)   | (2) (i) (iii) (ii) (iv) |
| (4) (iii) (ii) (iv) (i)   | (3) (iv) (i) (ii) (iii) |
|   | (4) (iii) (ii) (i) (iv) |
- 121.** என்டிரோகைனேஸ் என்ற நொதி எதன் மாற்றத்திற்கு உதவுகிறது ?
- பெப்சினோஜன் → பெப்சின்
  - புரதம் → பாலிப்பெப்டைடு
  - டிரிப்சினோஜன் → டிரிப்சின்
  - கெசினோஜன் → கெசீன்

122. நிகோடின், ஸ்டரிக்னென், மற்றும் கேஃபைன் போன்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிதைப் பொருட்கள் தாவரங்களால் இதற்காக உற்பத்தி செய்யப் படுகின்றன :

- (1) இனப்பெருக்கத்தின் மீதுள்ள செயற்பாடு
- (2) ஊட்டச் சத்துக் குறிய திறன்
- (3) வளர்ச்சி பிரதிபலிப்பு
- (4) பாதுகாப்புச் செயல்

123. கொடுக்கப்பட்ட நோய்கள் மற்றும் நோய்க் காரணிகளை பொருத்தி **சரியான** விடையை தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) டெஃபாய்டு
  - (b) நிமோனியா
  - (c) பைலாரியா
  - (d) மலேரியா
- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1) (iv)   | (i)        | (ii)       | (iii)      |
| (2) (i)    | (iii)      | (ii)       | (iv)       |
| (3) (iii)  | (iv)       | (i)        | (ii)       |
| (4) (ii)   | (i)        | (iii)      | (iv)       |

**தொகுதி - II**

- (i) ஊசெரிரியா
- (ii) பிளாஸ்மோடியம்
- (iii) சால்மோனெல்லா
- (iv) ஹீமோஃபில்லஸ்

124. கதிர் சிறுமலர்களில் காணப்படுகிறது :

- (1) அரைக்மட்ட சூலகப்பை
- (2) கீழ்மட்ட சூலகப்பை
- (3) மேல்மட்ட சூலகப்பை
- (4) வைப்போகைனஸ் சூலகப்பை

125. ஒரு இயல்பு ECG -யில் QRS கூட்டமைப்பு எதனைக்குறிக்கின்றது ?

- (1) வெண்டிரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க மீட்சி
- (2) ஆரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க மீட்சி
- (3) ஆரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க நீக்கம்
- (4) வெண்டிரிக்கிளின் மின்முனைப்பியக்க நீக்கம்

126. கரும்புப் பயிரின் மீது தெளிக்கும் போது தண்டின் நீளத்தை அதிகரித்து கரும்பின் விளைச்சலை அதிகரிக்கும் தாவர வளர்ச்சி ஊக்கியின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

- (1) அப்சிசிக் அமிலம்
- (2) செட்டோகைனின்
- (3) ஜிப்ரல்லின்
- (4) எத்திலீன்

127. மனிதர்கள் செயல்பாட்டால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் கீழ்க்கண்ட எவற்றில் பரிணாமமடைந்தன ?

- (a) காலப்கோஸ் தீவில் உள்ள டார்வின் சிட்டுக் குருவிகள்
  - (b) களைச் செடிகளில் களைகொல்லி எதிர்ப்பு
  - (c) யூகேரியோட்டுகளில் மருந்துப்-பொருளுக்கு எதிர்ப்பு
  - (d) மனிதன் உருவாக்கிய நாய்கள் போன்ற வீட்டு விலங்கின வகைகள்
- (1) (d) மட்டும்
  - (2) (a) மட்டும்
  - (3) (a) மற்றும் (c)
  - (4) (b), (c) மற்றும் (d)

128. பரிணாமம் குறித்த கருவியல் சான்றினை தவறேன நிரூபித்தவர் :

- (1) ஓபாரின்
- (2) கார்ல் எர்ன்ஸ்ட் வான் பேர்
- (3) ஆல்பிரட் வாலஸ்
- (4) சார்லஸ் டார்வின்

129. கீழ்க்கண்ட இணைகளில் ஒருசெல் அல்காக்களின் இணை எது ?

- (1) குளோரெல்லா மற்றும் ஸ்பெஞ்சினா
- (2) லாமினேரியா மற்றும் சர்காசம்
- (3) ஜெலிடியம் மற்றும் கிராசிலேரியா
- (4) அன்பீனா மற்றும் வால்வாக்ஸ்

130. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் உள்ளடக்கப் பொருட்கள் குறித்த எது **சரியானதல்ல** ?

- (1) அவை செட்டோபிளாசத்தில் இருப்புப் பொருளாக உள்ளவை.
- (2) எந்த சவ்வாலும் சூழப்படவில்லை.
- (3) உணவுத் துகள்களின் உள் விழுங்குதலில் ஈடுபடுகின்றன.
- (4) செட்டோபிளாசத்தில் தனித்து உள்ளவை.

131. நீர்த்த சிறுநீர் உருவாதலை தடுக்கும் காரணி எது ?

- (1) JG செல்கள் ரெனின் சுரத்தலை குறைக்கிறது
- (2) குறைவான ADH சுரக்கப்படுவதால் அதிக நீர் மீள உறிஞ்சப்படல்
- (3) ஆல்டோஸ்டிரோன் விளைவால் சிறு நீர் குழல்களில்  $\text{Na}^+$  மற்றும் நீர் மீள உறிஞ்சப்படுதல்
- (4) ஏட்ரியல் நாட்ரியூரட்டிக் காரணி இரத்த நாள சுருக்கியாக செயல்படுகிறது

**132. சரியாக பொருத்தியுள்ளது எது ?**

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| (1) தலாசிமியா   | - | X பிணைப்பு  |
| (2) ஹீமோஃபிலியா | - | Y பிணைப்பு  |
| (3) ஃபீனையில்   | - | உடல் குரோமோ<br>சோமில் உள்ள<br>ஒஸ்கிய பண்பு                          |
| (4) அரிவாள்     | - | உடல் குரோமோ<br>சோமில் உள்ள<br>ஒடுங்கிய<br>பண்பு, குரோ-<br>மோசோம்-11 |

**133. ஒரு சூழ்நிலை மண்டலத்தின் மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் மற்றும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித் திறன் ஆகியவை தொடர்புடைய கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானது எது ?**

- |  |
|--|
| (1) மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தித்திறன் ஆகியவற்றின் இடையே எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. |
| (2) நிகர முதல்நிலை உற்பத்தித்திறனை விட, மொத்த முதல்நிலை உற்பத்தித்திறனை எப்போதும் குறைவாக உள்ளது.                      |
| (3) மொத்த முதல்நிலை உற்பத்தித்திறனை எப்போதும் நிகர முதல்நிலை உற்பத்தித்திறனை விட அதிகமாக உள்ளது.                       |
| (4) மொத்த முதல்நிலை உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நிகர முதல்நிலை உற்பத்தித்திறன் ஆகியவை ஒன்றேயாகும்.                         |

**134. ஆக்சிஜன் கடத்தல் குறித்த தவறான கூற்று எது ?**

- |   |
|---|
| (1) நுண்ணறையில் குறை $p\text{CO}_2$ அக்சி ஹீமோகுளோபின் உருவாதலுக்கு உதவிகிறது.        |
| (2) ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினோடு இணைவது ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தத் தோடு தொடர்புடையது.       |
| (3) கார்பன் டை ஆக்சைடின் பகுதி அழுத்தம் ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினோடு இணைத்தலில் தலையிடும். |
| (4) நுண்ணறையில் உயர் $\text{H}^+$ அடர்வு ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் உருவாதலுக்கு உதவுகிறது.   |

**135. பிளாஸ்மோடியத்தின் தொற்று ஏற்படுத்தும் எந்த நிலை மனித உடலினுள் நுழைகிறது ?**

- |                            |
|----------------------------|
| (1) ஆண் காமிட்டோசைட்டுகள்  |
| (2) டுரோஃபோசைட்டுகள்       |
| (3) ஸ்போரோசைட்டுகள்        |
| (4) பெண் காமிட்டோசைட்டுகள் |

**136. சிறுநீரில் கீழ்கண்ட எந்த பொருள் காணப்பட்டால், டயாபிட்டிஸ் மெல்லிட்டஸிற்கு அறிகுறியாகும் ?**

- |  |
|--|
| (1) சிறுநீர் கற்கள் மற்றும் உயர் கிளைகோ-குரியா |
| (2) யுரேமியா மற்றும் கீட்டோனூரியா              |
| (3) யுரேமியா மற்றும் சிறுநீர் கற்கள்           |
| (4) கீட்டோனூரியா மற்றும் கிளைகோகுரியா          |

**137. ஒளி விணையின் போது எலெக்ட்ரான்கள் இவற்றிலிருநு கடத்தப்படுவதை பிளாஸ்டோ குயினோன் துணை புரிகிறது :**

- |  |
|--|
| (1) PS-I -விருந்து ATP சிந்தேஸ்                      |
| (2) PS-II -விலிருந்து Cytb <sub>6f</sub> கூட்டமைப்பு |
| (3) Cytb <sub>6f</sub> கூட்டமைப்பிலிருந்து PS-I      |
| (4) PS-I -விருந்து NADP <sup>+</sup>                 |

**138. கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.**

- | <b>தொகுதி - I</b>       | <b>தொகுதி - II</b>   |
|-------------------------|----------------------|
| (a) 6 - 15 இணைகள்       | (i) டிரைகான்         |
| செவுள்                  | பிளவுகள்             |
| (b) ஹெட்டிரோ-           | (ii) வட்ட வாய்கள்    |
| செர்கள் வால்            | துடுப்பு             |
| (c) காற்று பை           | (iii) கான்டிரிக்டீஸ் |
| (d) நஷ்க கொடுக்கு       | (iv) ஆஸ்ஷக்டீஸ்      |
| (a) (b) (c) (d)         |                      |
| (1) (i) (iv) (iii) (ii) |                      |
| (2) (ii) (iii) (iv) (i) |                      |
| (3) (iii) (iv) (i) (ii) |                      |
| (4) (iv) (ii) (iii) (i) |                      |

**139. பெண்குவின் மற்றும் டால்.ஃபினின், ஃபினிப்பர்கள். இதற்கு எடுத்துக்காட்டு :**

- |                                |
|--------------------------------|
| (1) இயற்கைத் தேர்வு            |
| (2) தழுவிப்பரவல்               |
| (3) குவி பரிணாமம்              |
| (4) தொழிற்சாலை மெலானின் ஆக்கம் |

- 140.** அண்டார்ஷிகா பகுதியில் பனிக்குருடு ஏற்படுவது எதனால் ?
- அகச்சிவப்பு கதிர்களால் விழித்திரை பாதிக்கப் படுவதால்
  - குறைந்த வெப்ப நிலையில் கண்ணில் உள்ள திரவங்கள் உறைவதால்
  - அதிக அளவிலான UV-B கதிர்வீச்சின் காரணமாக கருவிழி வீக்கமடைவதால்
  - பனிக்கட்டியிலிருந்து ஒளி அதிக அளவில் பிரதிபலிக்கப் படுவதால்
- 141.** அரை கீழ்மட்ட சூலகப்பை இதில் உள்ளது :
- பிளம்
  - கத்தரி
  - கடுகு
  - சூரியகாந்தி
- 142.** வளர்ச்சி நிலை அதிகமாக இருப்பது எப்போது ?
- உறக்க நிலை
  - அடுக்கேற்றப் பருவம்
  - ஓடுக்கப் பருவம்
  - முதிர்ந்து உதிர்தல்
- 143.** கீழ்கண்டவற்றுள் விதை உறக்கத்தை தடை செய்யும் பொருள் எதுவல்ல ?
- பாரா - அஸ்கார்பிக் அமிலம்
  - ஜிப்ரல்லிக் அமிலம்
  - அப்சிசிக் அமிலம்
  - பினாவிக் அமிலம்
- 144.** ஒளிகவாசத்தில் RuBisCo நொதியின் ஆக்ஸிலைனேற்ற நிகழ்வால் தோன்றுவது :
- 1 மூலக்கூறு 4-கார்பன் பொருள்  
1 மூலக்கூறு 2-கார்பன் பொருள்
  - 2 மூலக்கூறுகள் 3-கார்பன் பொருள்
  - 1 மூலக்கூறு 3-கார்பன் பொருள்
  - 1 மூலக்கூறு 6-கார்பன் பொருள்

- 145.** கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.

<b>தொகுதி - I</b>		<b>தொகுதி - II</b>	
(a)	கிளாஸ்டிரீடியம்	(i)	சைக்ளோஸ் போரின் -A
	பூட்டிலிக்கம்		பியூட்ரிக் அமிலம்
(b)	டிரைக்கோடெர்மா	(ii)	சிட்ரிக் அமிலம்
	பாலிஸ்போரம்		பார்சுரியஸ்
(c)	மேரானாஸ்கஸ்	(iii)	இரத்த கொலஸ்டிரால் குறைக்கும் காரணி
	பார்சுரியஸ்		
(d)	ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்	(iv)	
	ஒருக்கர்		

<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>
(1)	(iv)	(iii)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)
(3)	(ii)	(i)	(iv)
(4)	(i)	(ii)	(iii)

- 146.** ஆகாயத் தாமரை மற்றும் நீர் அல்லி ஆகியவற்றில் மகரந்தச் சேர்க்கை இவற்றின் மூலம் நடைபெறுகிறது.

- பூச்சிகள் மற்றும் நீர்
- பூச்சிகள் அல்லது காற்று
- நீர் ஓட்டங்கள் மட்டும்
- காற்று மற்றும் நீர்

- 147.** ராபர்ட் மே -இன் கருத்தின்படி புவியின் சிற்றினப் பன்மயம் சுமார் :

- 7 மில்லியன்
- 1.5 மில்லியன்
- 20 மில்லியன்
- 50 மில்லியன்

- 148.** வறையறு நொதிகள் குறித்து தவறான கூற்று எது?

- ஓட்டும் முனைகள் டி.என்.ஏ. லைகேஸ் மூலம் இணைக்கப்படுகிறது.
- ஓவ்வொரு வறையறு நொதியும் டி.என்.ஏ. -வின் முழு நீளத்தை ஆராய்கிறது.
- பாலின்ட்ரோமிக் பகுதிகளில் டி.என்.ஏ. இழைகளை அவை வெட்டுகிறது.
- மரபு பொறியியலில் அவை பயன் படுகிறது.

- 149.** கூழ்ம மின் ஆற்றலால் பகுப்பின் மூலம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட DNA துண்டங்களை இதன் உதவியுடன் பார்க்க முடியும் :
- அகச் சிவப்புக் கதிர்வீச்சில் எத்திடியம் புரோமைடு
  - பிரகாசமான நீல ஓளியில் அசிடோ-கார்மைன்
  - UV கதிர்வீச்சில் எத்திடியம் புரோமைடு
  - UV கதிர்வீச்சில் அசிடோகார்மைன்
- 150.** ஹிசார்டேல் என்ற புதிய வகை செம்மறி ஆடு பிக்கானரி ஈவுகள் மற்றும் மரினோ ராம்களை எவ்வகை கலப்பு மேற்கொண்டு உருவாக்கப் பட்டது ?
- உள் கலப்பு
  - வெளி கலப்பு
  - திடீர் மாற்ற கலப்பு
  - குறுக்கு கலப்பு
- 151.** உடற்குழியற்ற மற்றும் இருபக்க சமச்சீர் கொண்ட விலங்குகளின் தொகுதி எது ?
- அன்னலிடா
  - ங்னோஃபோரா
  - தட்டை புழுக்கள்
  - அஸ்கெல்மிந்தஸ்
- 152.** இரண்டு கார இணைகளுக்கிடையில் உள்ள தூரம்  $0.34 \text{ nm}$  மற்றும் இயல்பு பாலூட்ட செல்லின் மொத்த கார இணைகள்  $6.6 \times 10^9 \text{ bp}$  எனில், டி.என்.ஏ. -வின் நீளம் தோராயமாக எது ?
- 2.7 மீட்டர்கள்
  - 2.0 மீட்டர்கள்
  - 2.5 மீட்டர்கள்
  - 2.2 மீட்டர்கள்
- 153.** பார்ம்பரியத்திற்கான குரோமோசோம் கோட்ட பாட்டின் சோதனை சரிபார்ப்பு இவரால் நடத்தப் பட்டது :
- மார்கான்
  - மெண்டல்
  - சட்டன்
  - பொவேரி

- 154.** கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து **சரியான இணையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.**
- எக்ஸோநியூக்னி- -DNA -வில் குறிப் பேஸ்கள் பிட்ட இடங்களில் வெட்டுகின்றன
  - லைகேஸ்கள் - இரு DNA மூலக்கூறு-களை இணைக்கின்றன
  - பாலிமேரேஸ்கள் -DNA -வை துண்டங்களாக உடைக்கின்றன
  - நியூகிளியேஸ்கள்-DNA -ன் இரு இழை-களைப் பிரிக்கின்றன
- 155.** நோய் தடைக்காப்பு குறித்த தவறான கூற்று எது ?
- வளர் கரு தாயிடமிருந்து ஆன்டிபாடி-களை பெற்றுக் கொள்ளும். இது மந்தமான நோய்தடைக்காப்புக்கு எடுத்துக் காட்டு.
  - உயிர் அல்லது செயலிழந்த ஆன்டி-ஜென்கள் ஓம்புயிரியில் செலுத்தப் பட்டால் அவை ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கும். இது ஆற்றல் மிகு நோய் தடைகாப்பாகும்.
  - ஆன்டிபாடிகளை நேரடியாக செலுத்துதல் மந்தமான நோய் தடைகாப்பாகும்.
  - ஆற்றல் மிகு நோய் தடைகாப்பு உடனடியாகவும் முழு துலங்களை கொடுக்கும்.
- 156.** உட்சவாசம் நிகழ்வுகளில் **சரியானவை** எவை ?
- உதிர விதானம் சுருங்கல்
  - வெளி விலா எலும்பிடைத்தசைகள் சுருங்குதல்
  - நுரையீரல் கொள்ளளவு குறைதல்
  - நுரையீரலிடை அழுத்தம் அதிகரிக்தல்
  - (1) (d) மட்டும்
  - (2) (a) மற்றும் (b)
  - (3) (c) மற்றும் (d)
  - (4) (a), (b) மற்றும் (d)
- 157.** கீழ்கண்டவற்றுள் **தவறான கூற்று** எது ?
- மரபு பொறியியல் மூலம் ஈ-கோலையில் இன்சலின் உருவாக்கப்படுகிறது
  - மனிதனில் இன்சலின் ஒரு முன்-இன்ச-லினாக உருவாக்கப்படுகிறது
  - முன் இன்சலினில் ஒரு கூடுதல் பெப்படைடு, C-பெப்படைடு உள்ளது
  - செயல்படு இன்சலில், A மற்றும் B சங்கிலி வைத்ராஜன் பிணைப்புகளால் இணைந்திருக்கும்

**158.** புல் சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உணவூட்ட நிலைகளுடன் சரியான சிற்றின உதாரணங்களைப் பொருத்தவும்.

- (a) நான்காம் உணவூட்ட நிலை (i) காகம்
- (b) இரண்டாம் உணவூட்ட நிலை (ii) கழுகு
- (c) முதலாம் உணவூட்ட நிலை (iii) முயல்
- (d) மூன்றாம் உணவூட்ட நிலை (iv) புல்

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

**(a) (b) (c) (d)**

- (1) (i) (ii) (iii) (iv)
- (2) (ii) (iii) (iv) (i)
- (3) (iii) (ii) (i) (iv)
- (4) (iv) (iii) (ii) (i)

**159.** கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

**தொகுதி - I**

- (a) பிட்யூட்டரி (i) கிரேவிஸ் நோய் சுரப்பி
- (b) தெராய்டு சுரப்பி (ii) டெயாபிட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ்
- (c) அட்ரீனல் சுரப்பி (iii) டெயாபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்
- (d) கணையம் (iv) அட்டிசன் நோய்

**தொகுதி - II**

- (a) பிட்யூட்டரி (i) கிரேவிஸ் நோய் சுரப்பி
  - (b) தெராய்டு சுரப்பி (ii) டெயாபிட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ்
  - (c) அட்ரீனல் சுரப்பி (iii) டெயாபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்
  - (d) கணையம் (iv) அட்டிசன் நோய்
- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1) (ii)   | (i) (iv)   | (iii)      | (ii)       |
| (2) (iv)   | (iii)      | (i)        | (ii)       |
| (3) (iii)  | (ii)       | (i)        | (iv)       |
| (4) (iii)  | (i)        | (iv)       | (ii)       |

**160.** கரப்பான் பூச்சியின் தலையை நீக்கினால், அது சிறிது காலம் வாழும். எதனால்?

- (1) தலையில் 1/3 நரம்பு மண்டலம் உள்ளது. மீதமுள்ளவை உடலின் முதுகு பறத்தில் உள்ளது
- (2) கரப்பான் பூச்சியின் உணவு பாதை மேல் நரம்பனுத்திற்குள் வயிற்றின் கீழ் பகுதியில் அமைந்துள்ளது
- (3) கரப்பான் பூச்சியில் நரம்பு மண்டலம் காணப்படாது
- (4) தலையில் நரம்பு மண்டலத்தின் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமுள்ளது. மீதமுள்ளவை உடலின் வயிற்றுப் பகுதியில் உள்ளது

**161.** கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

**தொகுதி - I**

- (a) பிளாசன்டா (i) ஆண்டிராஜன்
- (b) சோனா (ii) மனித பெல்லுசிடா கோரியானிக் கொன்டோ-டுரோபின்
- (c) பல்போ (iii) அண்டத்தின் சுரப்பிகள் அடுக்கு
- (d) வெடிக் செல்கள் (iv) பீனிஸை வழவழப்பாக்குதல்

**தொகுதி - II**

- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1) (ii)   | (iii) (iv) | (i)        |            |
| (2) (iv)   | (iii)      | (i) (ii)   |            |
| (3) (i)    | (iv)       | (ii)       | (iii)      |
| (4) (iii)  | (ii)       | (iv) (i)   |            |

**162.** ABO இரத்த வகையை கட்டுப்படுத்தும் 'I' ஜீன் குறித்த தவறான கூற்று எது?

- (1) 'I' அலீல் எந்த சர்க்கரையையும் உருவாக்குவதில்லை.
- (2) ஜீன் 'I' மூன்று அலீல்கள் கொண்டுள்ளது.
- (3) ஒரு நபரிடத்தில் மூன்றில் இரண்டு அலீல்கள் மட்டும் காணப்படும்.
- (4) 'I<sup>A</sup>' மற்றும் 'I<sup>B</sup>' இரண்டும் இருந்தால், ஒரே வகையான சர்க்கரையை வெளிப்படுத்துகிறது.

**163.** கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது?

- (1) அடினன் தைமைனுடன் இணைவதில்லை.
- (2) அடினன் இரு H-பினைப்புகள் மூலம் தைமைன் உடன் இணைந்துள்ளது.
- (3) அடினன் ஒரு H-பினைப்பின் மூலம் தைமைன் உடன் இணைந்துள்ளது.
- (4) அடினன் மூன்று H-பினைப்புகளின் மூலம் தைமைன் உடன் இணைந்துள்ளது.

**164.** மெய்யுட்கரு செல்களில் கிளைகோ புரதங்கள் மற்றும் கிளைகோலிபிடுகள் உருவாகும் முக்கியமான இடம் எது?

- (1) பாலிசோம்கள்
- (2) எண்டோபிளாச் வலை
- (3) பெராக்சிசோம்கள்
- (4) கோல்கை உடலங்கள்

- 165.** விலங்குகளில் அதிக அளவு காணப்படும் புரதம் எது?
- இன்சலின்
  - ஹீமோக்ரோபின்
  - கொல்லாஜன்
  - லெக்டின்
- 166.** தாவரத்தின் பாகங்கள், ஒன்றின் உள் மற்றொன்று என இரு தலைமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது:
- மகரந்தப்பையின் உள்ளே மகரந்தத் துகள்கள்
  - இரண்டு ஆண் கேமீட்டுகள் உடைய முளைத்த மகரந்தத் துகள்கள்
  - கனியின் உள்ளே விதை
  - சூலின் உள்ளே சூலிப்பை
- (a) மற்றும் (d)
  - (a) மட்டும்
  - (a), (b) மற்றும் (c)
  - (c) மற்றும் (d)
- 167.** இரண்டாம் நிலை அண்ட செல்வில் குன்றல் பகுப்பு எந்த நிலையில் நிறைவடைகிறது?
- விந்தனு மற்றும் அண்ட செல் இணையும் நேரத்தில்
  - அண்ட வெளியாதலுக்கு முன்
  - புனர்ச்சி நடை பெறும் நேரத்தில்
  - கரு உருவான பிறகு
- 168.** ஒரு தாவரப் பகுதியின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் கீழ்க்கண்ட உள்ளமைப்பு பண்புகள் காணப்படுகின்றன:
- கற்றை உறையால் சூழப்பட்ட அதிக எண்ணிக்கையிலான வாஸ்குலார் கற்றைகள் சிதறிக் காணப்படும்.
  - பெரிய அளவிலான, தெறிவான பாரன் கைமாவாலான தளத் திசு.
  - வாஸ்குலார் கற்றைகள் ஒருங்கமைந்தவை மற்றும் மூடியவை.
  - புளோயம் பாரன்கைமா காணப்பட- வில்லை.
- தாவரத்தின் வகையினையும் அதன் பகுதியையும் கண்டறிக.
- இருவித்திலைத்தாவர வேர்
  - ஒருவித்திலைத்தாவரத் தண்டு
  - ஒருவித்திலைத்தாவர வேர்
  - இருவித்திலைத்தாவரத் தண்டு
- 169.** உணவு பாதையிலுள்ள கோப்பை வடிவ செல்கள் எவற்றிலிருந்து மாறியிருக்கிறது?
- கூட்டு எபிதீலிய செல்கள்
  - கட்டை வடிவ எபிதீலிய செல்கள்
  - தூண்வடிவ எபிதீலிய செல்கள்
  - காண்ட்ரோ சைட்டு
- 170.** கடத்தியில் இணைக்கப்பட்ட DNA -வின் படி எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் தொடர்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன :
- உணர்தல் தளம்
  - தெரிவுசெய்யக்கூடிய குறியீடு
  - Ori தளம்
  - பாலின்ட்ரோம் தொடர்
- 171.** கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு.
- | <b>தொகுதி - I</b>                      | <b>தொகுதி - II</b>                           |
|--|--|
| (a) கார்டை உறுப்பு                     | (i) நடு காது பகுதியை தொண்டை- யோடு இணைக்கிறது |
| (b) காக்ஸியா                           | (ii) லாபிரிந்தின் சுருண்ட பகுதி              |
| (c) ஷுஸ்டெசியன்                        | (iii) நீள்வட்ட குழல் பலகணியோடு இணைந்துள்ளது  |
| (d) ஸ்டேபிள்                           | (iv) பேசில்லார் சவ்வில் அமைந்துள்ளது         |
| <b>(a)      (b)      (c)      (d)</b>  |  |
| (1) (i)      (ii)      (iv)      (iii) |  |
| (2) (ii)      (iii)      (i)      (iv) |  |
| (3) (iii)      (i)      (iv)      (ii) |  |
| (4) (iv)      (ii)      (i)      (iii) |  |
- 172.** கொடுக்கப்பட்டவைகளுள் கார அமினோ அமிலம் எது?
- வாலைன்
  - தெரோசின்
  - குஞ்ச்டாமிக் அமிலம்
  - லைசின்

- 173.** குன்றல் பகுப்பு குறித்த கீழ்கண்டவற்றைப் பொருத்துக.  
 (a) சைகோஷன் (i) முடிவடைதல்  
 (b) பாக்கைஷன் (ii) கையாஸ்மாக்கள்  
 (c) டிப்ளோஷன் (iii) குறுக்கெதிர் மாற்றம்  
 (d) டையாகைனசிஸ் (iv) சினாப்சிஸ்  
 கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து **சரியான** விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.  
 (a) (b) (c) (d)  
 (1) (ii) (iv) (iii) (i)  
 (2) (iii) (iv) (i) (ii)  
 (3) (iv) (iii) (ii) (i)  
 (4) (i) (ii) (iv) (iii)
- 174.** S.L. மில்லர் தன் சோதனைகளில் மூடிய குடுவையில் இருந்து எவற்றைக் கலப்பதின் மூலம் அமினோஅமிலங்களைத் தோற்று-வித்தார் ?  
 (1)  $600^{\circ}\text{C}$  -ல்  $\text{CH}_3, \text{H}_2, \text{NH}_3$  மற்றும் நீராவி  
 (2)  $800^{\circ}\text{C}$  -ல்  $\text{CH}_4, \text{H}_2, \text{NH}_3$  மற்றும் நீராவி  
 (3)  $800^{\circ}\text{C}$  -ல்  $\text{CH}_3, \text{H}_2, \text{NH}_4$  மற்றும் நீராவி  
 (4)  $600^{\circ}\text{C}$  -ல்  $\text{CH}_4, \text{H}_2, \text{NH}_3$  மற்றும் நீராவி
- 175.** சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு.  
 (1) இன்சுலின் உயர் கிளைச்சியாவோடு தொடர்புடையது.  
 (2) குளுக்கோகார்டிகாய்டுகள் குளுக்கோ நியோ ஜெனிகிஸ்ஸை தூண்டுகிறது.  
 (3) குளுக்ககான் வைப்போ கிளைச்சியா வோடு தொடர்புடையது.  
 (4) இன்சுலின் கணைய செல்கள் மற்றும் அடிப்போசைட்டுகளுடன் செயல் படுகிறது.
- 176.** எதனைக் கட்டுப்படுத்த 1987-ல் மான்டரியல் பிரகடனம் கையொப்பமிடப்பட்டது ?  
 (1) மின்னணு கழிவுகளை அகற்றுதல்  
 (2) மரபு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்களை ஒரு நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டிற்கு கொண்டு செல்லுதல்  
 (3) ஓசோனை அழிக்கும் பொருட்களின் வெளியீடு  
 (4) பசுமை இல்ல வாயுக்களின் வெளியீடு

- 177.** புருஸ் விளிம்பு நுண் வில்லைகளை கொண்ட கன சதுர வடிவ எபிதீவியம் எங்கு காணப்படும் ?  
 (1) யூஸ்டேலியன் குழாய்  
 (2) குடலின் உட்படலம்  
 (3) உமிழ் நீர் சுரப்பியின் நாளங்கள்  
 (4) நெங்.ப்ரானின் அன்மை சுருள் நுண்குழல்கள்
- 178.** பேசில்லஸ் தூரின்ஜியன்சிஸ்ஸின் நஷ்ச ஜீனை உட்செலுத்தி உருவாக்கப்பட்ட Bt பஞ்ச வகை எதற்கு எதிர்ப்பு ?  
 (1) பூச்சி கொன்று திண்ணிகள்  
 (2) பூச்சி தீங்குயிரிகள்  
 (3) பூஞ்சை நோய்கள்  
 (4) தாவர நெமட்டோடுகள்
- 179.** கிராஃபியன் பாலிக்கிளிலிருந்து அண்ட செல் வெளியாதலுக்கு ஹார்மோனின் எந்த நிலை உதவுகிறது ?  
 (1) FSH -இன் குறை அடர்வு  
 (2) எஸ்டிரஜனின் உயர் அடர்வு  
 (3) புரோஜெஸ்டிரானின் உயர் அடர்வு  
 (4) LH -இன் குறை அடர்வு
- 180.** சரியற்ற கூற்றை கண்டறிக.  
 (1) வைரக் கட்டையானது டானின்கள், ரெசின்கள், எண்ணெய்கள் மற்றும் பல படிவதால் அடர்ந்த நிறத்தில் உள்ளது.  
 (2) வைரக் கட்டை நீரைக் கடத்துவதில்லை ஆனால் உறுதித் தன்மையை அளிக்கிறது.  
 (3) சாற்றுக் கட்டை நீர் மற்றும் தனிமங்களை வேரிலிருந்து இலைக்கு கடத்துவதில் பங்கேற்கிறது.  
 (4) சாற்றுக் கட்டையானது இரண்டாம் நிலை சைலத்தின் உட்பகுதி மற்றும் அது வெளிர் நிறத்தில் காணப்படும்.

**Space For Rough Work / இதர வேலைக்கான காலியிடம்**